مبادئ أساسية في الفيزياء الإحصائية

Essential Principles of Statistical Physics

تأليف

أ.د. إبراهيم محمود أحمد ناصر

أستاذ الفيزياء النظرية

جامعة الملك فهد للبترول والمعادن

مقدمة الكتاب

يمثل هذا الكتاب حصيلة بعض من محاضرات في الفيزياء الإحصائية ألقاها المؤلف على طلاب السنوات النهائية لمرحلة البكالوريوس وطلبة الماجستير في قسم الفيزياء بكلية العلوم في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن. حيث يدرس الطالب هذا المقرر بعد أن يُمهد له بمقدمة عن الديناميكا الحرارية والنظرية الحركية للغازات.

و يشتمل هذا الكتاب على أساسيات الفيزياء الإحصائية والتي تعتمد عليها معظم أبحاث الفيزياء الحديثة. وقد كُتبت المادة العلمية بإسهاب، وذلك بالاستعانة بالأمثلة التوضيحية، لكي يستفيد منها طلاب وطالبات السنوات النهائية، وأيضاً في مرحلة الماجستير، بأقسام الفيزياء, الرياضيات, الكيمياء بكليات التربية والعلوم والهندسة.

وقد قُسم الكتاب إلى أبواب عديدة صغيرة حتى يتسنى للطالب ولأستاذ المادة أن يختار ما هو متفق مع منهجه الدراسي. ففي الباب الأول استعرضنا طبيعة الديناميكا الحرارية وبعض التعريفات المهمة. وفي الباب الثاني أعطينا نظرة عامة وسريعة على قوانين الديناميكا الحرارية. أما أهمية نظرية الاحتمالات ومبادئ ميكانيكا الكم فقد تم شرحها في الباب الثالث. والباب الرابع يحتوي على تطبيق الديناميكا الحرارية الإحصائية على الحالات المجهرية البسيطة. وفي الباب الخامس قمنا باشتقاق التوزيع الكلاسيكي لماكسويل- بولتزمان ووضحنا تطبيقه على الغازات المثالية. أما بالنسبة لدالة تجميع المستويات وتطبيقاتها فتم استعراضها في الباب السادس. والباب السابع يحتوي على دالة توزيع السرعات لماكسويل- بولتزمان ومطابقتها مع النظرية الحركية للغازات. الباب الثامن والتاسع يحتويان على تطبيقات دالة التجميع للجزيئات ثنائية الذرات والمواد المغناطيسية، على الترتيب.

الإحصاءان الكميان، وهما إحصائي بوز- أينشتين وفيرمي- ديراك، تم اشتقاقهما بالتفصيل مع عرض لبعض تطبيقاتهما النظرية في الباب العاشر. وفي الباب الحادي عشر و الثاني عشر وضحنا بعض التطبيقات العملية لإحصاء بوز- أينشتين مثل: إشعاع الجسم الأسود تكثيف بوز- اينشتين وخواص غاز البوزون المثالي عند درجات الحرارة المختلفة، الحرارة النوعية للأجسام الصلبة (النموذج الكلاسيكي، نظرية اينشتين، نظرية دبباي). جسيمات فيرمي- ديراك المثالية فقد وضحنا خصائصها في الباب الثالث عشر مع شرح لظاهرة الانبعاث الالكتروني الحراري.

وفي جميع أبواب الكتاب حرصنا على وجود العديد من الأمثلة التوضيحية والواجبات المنزلية المذيلة بالحلول حتى يتسنى لأبنائنا الطلاب محاولة حلها وتقييم مدى تحصيله للمادة العلمية المقدمة في هذا الكتاب.

واختتمنا الكتاب بخمسة ملحقات يحتوي الأول منها على بعض التعريفات للدوال الرياضية المستخدمة. أما الملحق الثاني فإنه يُعطي للطالب خلفية مهمة بالنظريات الإحصائية البسيطة للتباديل والتوافيق ونظرية الاحتمالات. إما في الملحق الثالث فقد تم شرح معاملات لاجرانج غير المعينة. وأنهينا الملاحق بشرح مختصر للدوال الزائدية ونهاياتها، والمراجع التي استعملت وقائمة المصطلحات العلمية. بالطبع فإن هناك الكثير من التطبيقات المهمة، مثل تطبيقات الإحصاء الكمي على المواد فائقة التوصيل وأشباه الموصلات، والتي لن يتسع المكان هنا للحديث عنها.

وأود أن أشكر بامتنان الكثير من طلابي وزملائي وأصدقائي بالقسم على ملاحظاتهم واقتراحاتهم وأخص بالذكر أ.د. خليل الزق والطالب مهدي المغربي على جهودهم في تصحيح الهفوات اللغوية والأخطاء المطبعية. كما أوجه شكري الخاص لجامعة الملك فهد للبترول والمعادن ولمكتبتها الزاخرة بالكتب المفيدة.

وأنتظر من الأساتذة الأفاضل والطلبة الأعزاء النقد البناء لأسلوبي وأخطائي اللغوية أو العلمية، حتى يتسنى لي أخذها بالاعتبار في الطبعات المقبلة للكتاب، آملين بسماع أرائكم واقتراحاتكم على العنوان الإلكتروني imnasser@kfupm.edu.sa وسوف تنشر مراسلاتكم علي الموقع التالي:

http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/imnasser/

المؤلف

أ.د. إبراهيم محمود أحمد ناصر

الظهران 1246 – 1245

المحتويات

الباب الأول

طبيعة الديناميـــــكا الحرارية

االفصل	العنوان	الصفحة
I	تعريفات	3
II	المتغيرات الديناميكية الحرارية	6
III	العمليات والدورات بالديناميكا الحرارية	10
IV	الوحدات	13
V	درجة الحرارة والقانون الصفري	14

الباب الثاني

علاقات أساسية بالديناميكا الحرارية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	القانون الأول للديناميكا الحرارية	22
II	القانون الثاني للديناميكا الحرارية	24
III	دوال أخري للديناميكا الحرارية	27
	i طاقة هلمهولتز الحرة	27
	ii دالة جبس	28
IV	علاقات ماكسويل	28
V	القانون الثالث للديناميكا الحرارية	29
VI	ملخص لقوانين الديناميكا الحرارية	30

الباب الثالث

الديناميكا الحرارية الإحصائية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	نموذج العملة والتوزيع الأكثر احتمالاً	33
II	العالم المجهري وميكانيكا الكم	40
	i تكميم الشحنة	41
	ii المظهر الجسيمي للطاقة	41
	iii ازدواجية الجسيم والموجه	42
	iv مبدأ بور المتمم	42
	v مبدأ الشك (عدم اليقين)	42
	vi الفراغ الطوري	43
	vii تكميم الطاقة	46
III	كثافة المستويات	53
IV	ملحق (3.A) الجسيمات المتطابقة	56

الباب الرابع

الديناميكا الحرارية الإحصائية للحالات المجهرية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	الحالات المجهرية للنظام	65
II	أمثلة منوعة	76
III	تمارين عامة	78

الباب الخامس

الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان

الفصل	العنوان	الصفحة
I	فرضيات الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان	80
	i المستويات المنفردة (وحيدة الانتماء)	83
	ii المستويات متعددة الانتماء	84
II	علاقات هامة	86
	i حساب المعامل e^{α}	86
	ii تفاضلات مهمة	87
	iii حساب الطاقة المتوسطة	87
	iv حساب الضغط المتوسط	88
	v حساب الإنتروبي	88
	vi حساب المعامل β	89
	vii حساب طاقة هلمهولتز الحرة	90
III	تمارين عامة	91

الباب السادس

دالة تجميع المستويات وتطبيقاتها

الفصل	العنوان	الصفحة
I	دالة التجميع للمستويات المنفردة	94
II	دالة التجميع للمستويات المتصلة	99
III	تطبيقات دالة التجميع للغاز المثالي	100
	i حساب الضغط	101
	ii حساب الطاقة الداخلية	101
	iii حساب الحرارة النوعية	102
	iv حساب الإنتروبي	102
IV	أمثلة محلولة	103
V	تمارين عامة	111

الباب السابع

دالة توزيع السرعات لماكسويل- بولتزمان

الفصل	العنوان	الصفحة
I	التوزيع الإحصائي لسرعة الجزيئات	117
	i حساب السرعة المتوسطة للجزيئات (v_{cv})	118
	ii حساب متوسط مربع سرعة الجزيئات $(\overline{v^2})$	119
	iii حساب الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعات للجزيئات (v_{rms})	119
	iv حساب السرعة الأكثر احتمالاً للجزيئات (v_{mps})	120
	v مبدأ تساوي توزيع الطاقة	212
	vi توزيع السرعات باتجاه احد المحاور	122
	vii عدد الجزيئات في مدى سرعة معينة	124
II	تمارين عامة	126

الباب الثامن

دالة التجميع للجزيئات ثنائية الذرات

الفصل	العنوان	الصفحة
I	النمط الاهتزازي	130
II	النمط الدوراني	133
	i درجات الحرارة المنخفضة	135
	ii درجات الحرارة المرتفعة	136
III	تمارين عامة	140

الباب التاسع

إحصاء المواد المغناطيسية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	الوصف النوعي للتمغنط	144
II	الوصف الكمي للتمغنط	145
III	نظرية لانجفن للمغناطيسية	147
	i حساب الطاقة الداخلية	150
	ii حساب الحرارة النوعية	151
	iii حساب الإنتروبي	152
	iv حساب العزم المغناطيسي الكلي $\overline{M}$	153

الباب العاشر

الإحصاء الكمي

الفصل	العنوان	الصفحة
I	إحصاء فيرمي- ديراك	160
II	إحصاء بوز-اينشتين	163
III	أمثلة منوعة	166

الباب الحادي عشر

تطبيقات إحصاء بوز- أينشتين

الفصل	العنوان	الصفحة
I	إشعاع الجسم الأسود	176
II	تكثيف بوز - أينشتين	418
III	خواص غاز البوزون المثالي	189
	i حساب الطاقة الداخلية	190
	ii حساب الحرارة النوعية	190
	iii حساب الإنتروبي	191
	iv حساب دالة هلمهولتز	192
	v حساب الضغط	192

الباب الثاني عشر

الحرارة النوعية للأجسام الصلبة

الفصل	العنوان	الصفحة
I	النموذج التقليدي	194
II	نظرية أينشتين	196
III	نظرية ديباي	198
	i عند درجات الحرارة المرتفعة جداً	202
	ii عند درجات الحرارة المنخفضة جداً	203
IV	أمثلة عامة	206

الباب الثالث عشر

خصائص جسيمات فيرمي – ديراك المثالية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	دالة فيرمي	210
II	غاز ذو مستويات منفصلة تماماً	213
	i حساب الطاقة الداخلية	215
	ii حساب الإنتروبي	216
	iii حساب معادلة الحالة	216
	iv حساب المحمول	216
III	غاز ذو مستويات منفصلة جزئياً	216
	i حساب الحرارة النوعية	219
	ii حساب الإنتروبي	221
	iii حساب دالة هلمهولتز	221
	iv حساب الضغط	222
IV	تطبيقات إحصاء فيرمي – ديراك	223
	i الانبعاث الالكتروني الحراري	224

الملاحق

Appendices

الملحق	العنوان	الصفحة
A	بعض الدوال والصيغ الرياضية	230
	i صيغة استيرلنج	230
	ii مجموع المتوالية الهندسية	231
	iii دالة جاما	231
	iv دالة الخطأ	232
	v دالة زيتا	233
	vi تكامل سمرفيلد	233
	vii دالة دلتا لديراك	234
	viii جدول للتفاضلات البسيطة	235
	ix متطابقات رياضية عامة	236
	x تكاملات مهمة	237
B	التباديل والتوافيق والاحتمالات	239
	i التباديل	239
	ii التوافيق	243
	iii الاحتمالات	244
	iv توزيع ذي الحدين	245
C	معاملات لاجرانج الغير معينة	246
D	الدوال الزائدية	248

بعض الثوابت والرموز المهمة التي سوف نحتاجها كثيراً لذلك سنضعها هنا لأهميتها

الرمز	التعريف	قيمتة العددية
h	ثابت بلانك	6.626×10^{-34} J·s
$\hbar = h/2\pi$	ثابت بلانك المعدل	1.054×10^{-34} J·s
k_B	ثابت بولتزمان	1.38×10^{-23} J·K^{-1}
N_A	عدد أفوجادرو (عدد الجزيئات بالمول الواحد)	6.022×10^{23} mol^{-1}
$R = N_A k_B$	الثابت العام للغازات	8.314 J·K^{-1}·mol^{-1}
$\|e\|$	شحنة الإلكترون	1.602×10^{-19} C
m_e	كتلة الإلكترون الساكنة	9.109×10^{-31} kg,

الرمز	المعني	الرمز	المعني
V	الحجم	T	درجة الحرارة
P	الضغط	C_P	الحرارة النوعية تحت ضغط ثابت
Z	دالة التجميع	C_V	الحرارة النوعية تحت حجم ثابت
U	طاقة داخلية	H	المحتوى الحراري
S	الإنتروبى	Q	كمية الحرارة
W	الشغل	F	طاقة (أو دالة) هلمهولتز
G	طاقة (أو دالة) جبس	g_i	درجة الانتماء، التعددية

الباب الأول
طبيعة الديناميـــكا الحرارية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	تعريفات	3
II	المتغيرات الديناميكية الحرارية	6
III	العمليات والدورات بالديناميكا الحرارية	10
IV	الوحدات	13
V	درجة الحرارة والقانون الصفري	14
VI	تمارين عامة	15
VII	ملحق (1.A) التغير التفاضلي للحالة	17
VIII	ملحق (1.B) معادلات الحالة الغازية	19

الباب الأول

طبيعة الديناميكا الحرارية

Nature of Thermodynamics

وفي هذا الباب نستعرض بعض من التعريفات المهمة المتعلقة بدراسة منهج الديناميكا الحرارية والإحصائية، حيث تستخدم هذه التعريفات بكثرة خلال الأبواب القادمة. وقبل أن نسترسل في التعريفات دعونا نبدأ بسؤال مهم وهو: ما هو علم الديناميكا الحرارية؟ والجواب هو أن علم الديناميكا الحرارية يختص بدراسة الطاقة، وخاصةً الطاقة الانتقالية (energy-in-transit) على شكل حرارة (Heat, Q) أو شغل (Work, W). وهو علم استقرائي أي تجريبي (empirical)، بمعنى أن قوانينه مبنية على التجارب المعملية. لذلك فهو يعتمد على عدد قليل من الخواص العينية (Macroscopic properties) التي نستطيع أن نشاهدها ونلمسها، مثل درجة الحرارة (T)، والحجم (V)، والضغط (P)، والحرارة النوعية (C). هذه الكميات المنظورة، أي العينية، من السهل قياسها للنظام تحت المعاينة ولا تتطلب وضع فرضيات تفصيلية عن التركيب الداخلي (Internal structure)، أي المجهري (Microscopic)، للمادة. وتلعب *درجة الحرارة* (Temperature) وتأثيرها على المتغيرات العينية دوراً رئيسياً في الديناميكا الحرارية. ولإيجاد قيم تجريبية قياسية فإن علم الديناميكا الحرارية يدرس النظام عند حالات الاتزان (Equilibrium states) فقط ولا يهتم بكيفية أو زمن الوصول إلى هذه الحالة. ويمكن استخدام هذه الكميات المقاسه لتعيين قيم بعض الكميات غير القابلة للقياس مباشرة، مثل الإنتروبيا (S)، والطاقة الداخلية (U)، والمحتوى الحراري (H)،.... والتي سوف تناقش في الأبواب القادمة.

I – تعريفات

إن علم الديناميكا الحرارية يختص بدراسة *خواص الاتزان* (Equilibrium properties) *لنظام* (System) معين بحيث تكون *درجة الحرارة* هي المتغير الأساسي والمهم.

والنظام في علم الديناميكا الحرارية هو جزء من العالم المادي (الملموس) وهو الشئ الذي نتحدث عنه دائماً في دراستنا المعملية. فمن الممكن أن يكون النظام خزان للهواء، أو قطعة معدنية، أو مغناطيس وهكذا. ويجب ألا يتفاعل النظام كيميائيا مع الوعاء الذي يحتويه وإلا أصبح الوعاء من النظام أيضا. وبإمكان النظام أن يتبادل الطاقة (أو المادة) مع أنظمة أخرى والتي تكون *الوسط المحيط* (Surrounding, Environment) للنظام المعين. والنظام مع الوسط المحيط به يشكلان ما يسمى *كون النظام* (Universe).



أ- نظام مفتوح ب- نظام مغلق ت- نظام معزول

شكل (1) تصنيف الأنظمة

وتصنف الأنظمة إلى:

1- *نظام مفتوح* (Open system): هو النظام الذي يسمح بتبادل الطاقة والمادة مع الوسط المحيط به. انظر الشكل (1) أ، حيث يسمح الدورق بتبادل الطاقة والمادة مع الوسط المحيط به. وكمثال لذلك تَكون البلورات في المحاليل. والطاقة هنا تعني أي شكل من أشكال الطاقة المعروفة.

2- *نظام مغلق* (Closed system): هو النظام الذي لا يسمح بتبادل المادة ولكنه يتبادل الطاقة مع الوسط المحيط به. انظر الشكل (1) ب، حيث يسمح الدورق المغلق تماماً بتبادل الطاقة (بالتسخين أو التبريد) مع الوسط المحيط به، ولا يسمح بهروب أو دخول الغاز.

3- *نظام معزول* (Isolated system): هو النظام الذي لا يسمح بتبادل الطاقة أو الكتلة مع الوسط المحيط به، وهو معزول تماماً عن أي أنظمة أخرى. انظر الشكل (1) ت، حيث لا يسمح الدورق بتبادل الطاقة أو المادة مع الوسط المحيط به. مثال على ذلك الترمس، فهو تقريباً يحتفظ بالمادة والطاقة (الحرارة) لفترة طويلة.

وبدراستنا الإبتدائيه للديناميكا الحرارية سنفترض أن جميع الأنظمة تتكون من ذرات وجزيئات متعادلة كهربياً. بالإضافة إلى هذا فإن جميع القوي (كهربية أو مغناطيسية أو سطحية) ستكون مهملة.

في الأمثلة التالية صنّف الأنظمة التالية إمّا مفتوحة، مغلقة أو معزولة:

مثال1. كتلة من الغاز في وعاء ذو حواجز صلبة غير منفذة للمادة ومنفذة للحرارة.

الحل: (*نظام مغلق*).

مثال2. كتلة من الغاز في وعاء ذو حواجز صلبة غير منفذة للمادة أو الحرارة، مثل الترمس.

الحل: (*نظام معزول*).

مثال3. محلول سكري مغلف بغشاء منفذ للمادة فقط ومغمور في وعاء كبير من الماء

الحل: (*نظام مفتوح*).

بين النظام والوسط المحيط والذي يتم من خلاله تبادل الطاقة أو المادة يوجد حد فاصل يسمى *بحاجز (إطار) النظام* (System wall) وهناك أنواع عدة من الحواجز نذكر منها التالي:

1 *الحاجز الأديَباتيكي* (أو الكظمي) (Adiabatic wall) هو الحاجز الذي لا يسمح بأي تبادل حراري بين النظام والوسط المحيط به. والكلمة أديَباتيك مشتقه من الكلمة اليونانية (Adiabatos) وتعني عدم المرور.

ملحوظة: النظام المعزول هو نظام أدياباتيكي ولكن النظام ذو الحاجز الأديَباتيكي غير ملزم بأن يكون نظاما معزولاً. بالإمكان أيضاً حدوث التأثرات الميكانيكية من خلال الحاجز الأدياباتيكي. على سبيل المثال، يمكن إضافة أو إزالة المادة ويمكن للحجم أن يتغير و بالإمكان تطبيق مجال مغناطيسي، ..الخ.

2 *الحاجز الثنائي الحراري* (Diathermal wall): هو الحاجز الذي يسمح بتبادل الحرارة بحرية تامة، والكلمة مشتقه من الكلمة اليونانية (Diathermos) وتعني المرور الحراري.

وهناك حواجز أخرى موضحة بالشكل (2)، مثل الحاجز الثابت (rigid) والحاجز المرن أو المتحرك (flexible) والحاجز غير النفاذ (impermeable) والحاجز المسامي (porous).



شكل (2) بعض من الحواجز المهمة

II- المتغيرات الديناميكية الحرارية

يوجد بعض الكميات الفيزيائية التي تستخدم لوصف السلوك المنظور للمادة وتسمى *خواص* (Properties) (أو تسمي متغيرات ديناميكية حرارية أو إحداثيات ديناميكية حرارية)، وهي خواص ملحوظة للنظام وبالإمكان حسابها، وهي:

درجة الحرارة (T): تعبر على الجهد الحراري (Thermal potenial) - وهي تستخدم كمقياس للسخونة والبرودة للمادة. وبمعنى أعمق، هو مقياس لمتوسط طاقة الحركة التي تمتلكها جزيئات النظام.

الضغط (P): يعبر على الجهد الميكانيكي (Mechanical potenial) - وهي القوة العمودية لوحدة المساحات.

الحجم (V): يعبر على الإزاحة الميكانيكية (Mechanical displacement) - وهي كمية الفراغ التي تحتلها المادة.

الإنتروبي (S): تعبر على الإزاحة الحرارية (Thermal displacement) - وهي مقياس لعشوائية النظام (Disorder of the system).

الطاقة الداخلية (U): هي مجموع طاقتي الحركة والجهد لمكونات النظام (غالباً من الذرات والجزيئات).

وهناك أيضاً بعض الخواص الثانوية مثل:

المحتوى الحراري (H): هي مجموع الطاقة الداخلية وحاصل ضرب الحجم والضغط. رياضياً تكتب:

$$H = U + PV$$

الحرارة النوعية (C_p أو C_v): وهي الطاقة اللازمة لرفع درجة حرارة وحدة واحدة من المادة درجة واحدة تحت ظروف معينة. وتعرف الحرارة النوعية عند ضغط ثابت بالعلاقة:

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P$$

- الحرارة النوعية عند حجم ثابت بالعلاقة:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V$$

ملحوظة: تستخدم الكمية C_p بكثرة في حالة الموائع (Fluid) والمواد الصلبة (Solid) حيث أنهم غير قابلين للانضغاط (Incompressible).

- تنقسم الخواص إلى قسمين أساسيين وهما:

1- *خواص شاملة أو تجميعية* (Extensive)، تتناسب مع كتلة المادة، ومن أمثلتها الحجم: فكلما تضاعفت الكتلة تضاعف حجمها (باعتبار أن الكثافة ثابتة). ومنها أيضاً $(S, U, H, \cdots)$.

2- *خواص مركزة* (Intensive)، لا تعتمد على كتلة المادة. درجة الحرارة كمثال لا تتأثر بتغير الكتلة وكذلك الضغط والكثافة (ρ) يعتبران من الخواص المركزة.

ويمكن للصفة الشاملة أن تتحول إلى صفة مركزة وذلك بالقسمة على الكتلة، وعندها تسمى *الصفة النوعية*.

حالة النظام (State of a system): تعرف بأنها شرط محدد (معرّف) بمجموعة من الخواص مثل الضغط والحجم ودرجة الحرارة. في الغالب يمكن تعريف الحالة الديناميكية الحرارية لنظام أحادي المركبات من خلال متغيران مستقلان.

حالة الاتزان (Equilibrium state): هي الحالة التي تكون فيها خواص النظام – ككل– متناسقة ولا تتغير مع الزمن. والنظام يمكن أن يتكون من مركبين أو أكثر. على سبيل المثال، إذا بدأنا نظامنا بجسمين مختلفين، معزولين وبينهما حاجز كما بالشكل (3)، ومعرفين بالقيم (P_1,V_1,T_1,n_1) و (P_2,V_2,T_2,n_2)، فإن حالات الاتزان بين النظامين تتكون من:

1- اتزان حراري (Thermal equilibrium)، $\Delta T = T_1 - T_2 = 0$.

2- اتزان ميكانيكى (Mechanical equilibrium)، $\Delta P = P_1 - P_2 = 0$.

3- اتزان كيميائى (Chemical equilibrium)، $\Delta n = n_1 - n_2 = 0$.



شكل (3) حالة الاتزان بين نظامين 1، 2.

فإذا افترضنا أن الجسمين مختلفين في درجة الحرارة، مثلاً احدهما ساخن والأخر بارد، فحالة الاتزان الحراري بين الجسمين تعني أن الجسمين وصلا إلى نفس درجة الحرارة النهائية، أو بمعنى أخر: أن كمية الحرارة التي فقدت من الجسم الساخن تتساوي مع كمية الحرارة المكتسبة بواسطة الجسم البارد.

حالة عدم الاتزان (Non-equilibrium state): تخص النظام الذي به تدرج في الخواص، وصفاته تتغير مع الزمن (مثال على ذلك الغلاف الجوي والمحيطات).

متغيرات الحالة (State variables) هي خواص تصف حالة الاتزان، مثل الضغط والحجم ودرجة الحرارة.

متغيرات الحالة (State variables) هي خواص تصف حالة الاتزان، مثل الضغط والحجم ودرجة الحرارة.

معادلة الحالة (Equation of state) هي علاقة دالية بين متغيرات الحالة لنظام في حالة اتزان. مثال لذلك القانون العام للغازات المثالية:

$$PV = aT$$

حيث a هو ثابت سوف يعرف لاحقاً.

وفي منهجنا المبسط للفيزياء سوف نستخدم التعبير " تغيير الحالة " عامةً للدلالة على الانتقال من الحالة السائلة إلى الغازية، أو من الحالة الصلبة إلى السائلة..الخ. وبالديناميكا الحرارية فإن هذا التغيير يدل على ***تغير في الطور*** (Change of phase) أو ***تحول في الطور*** (Phase transformation).

إذا اعتبرنا أن المتغيرات الضغط والحجم ودرجة الحرارة هم من خصائص حالة النظام، فإن معادلة الحالة تأخذ الشكل:

$$f(P,V,T) = 0$$

هذه العلاقة تقلل عدد المتغيرات المستقلة للنظام من ثلاثة إلى اثنين. الدالة f تفترض أنها معطاة كجزء من مواصفات النظام. جرت العادة على وصف الحالة للنظام بواسطة نقطة في الفضاء ذو الثلاثة أبعاد P-V-T. ولهذا فإن معادلة الحالة تعرف سطح في هذا الفراغ وأي نقطة تقع على هذا السطح تمثل حالة اتزان. وتُعرف كل حالة في الديناميكا الحرارية تلقائياً بأنها حالة متزنة إلا إذا ذكر غير ذلك.

III- العمليات والدورات في الديناميكا الحرارية

(Thermodynamic Processes and Cycles)

العملية الديناميكية الحرارية (Thermodynamic process) هي ببساطة مجموعة من الأحداث المتتالية، ويعبر عنها بالتغير في حالة النظام بين حالتين ابتدائية ونهائية بدلالة المسار، كما بالشكل (4). ويعرف *المسار* $(path)$ بأنه تسلسل في حالات الاتزان التي يمر خلالها النظام.



isothermal, $dT = 0$

adiabatic, $dQ = 0$

isobaric, $dP = 0$

isochoric, $dV = 0$

isentropic, $dS = 0$

شكل (4) معظم العمليات الحرارية المُعرفة بين حالتين، ابتدائية 1 ونهائية 2.

وتنقسم العمليات إلى:

1- *عملية دائرية (مغلقة)* (Cyclic process): هي العملية التي تكون فيها الحالة الابتدائية والنهائية للنظام متطابقتان.

2- *عملية شبه ساكنة* (Quasi-static process): هي عملية تحدث ببطء، وعند كل لحظة يحيد النظام بكمية ضئيلة جدا عن حالة الاتزان.

1. *عملية انعكاسية* (Reversible process): هي العملية التي يمكن عكس اتجاهها مع إحداث تغيرات بكمية بسيطة لبعض خواصها. وهي عملية شبه ساكنة بمعنى أنه لا يوجد قوى تسبب فقد للطاقة كالاحتكاك مثلاً.
2. *عملية غير انعكاسية* (Irreversible process) وهي مرتبطة بالتغيرات الملموسة في الخواص نتيجة احتواء المسار على قوى تسبب فقد الطاقة. وفي العمليات غير الانعكاسية لا يعود النظام أو الوسط المحيط به إلى حالته الابتدائية. وبشكل عام جميع العمليات الطبيعية ما هي إلا عمليات غير انعكاسية.

ملحوظة: كل العمليات الانعكاسية هي شبه ساكنة، ولكن العمليات الشبه ساكنة ليس من الضروري أن تكون انعكاسية. كمثال على ذلك: التسرب البطيء للغاز من إطار العربة يعتبر عملية شبه ساكنة ولكنها غير انعكاسية. ونجد أن العملية الانعكاسية هي عملية مثالية (لا توجد في الطبيعة) وذلك لوجود الاحتكاك بشكل عام. وفي غالبية العمليات المرتبطة بالغازات المثالية نجد أن PV^{r} هي كمية ثابتة. تظل بعض الخواص للنظام ثابتة ولا تتغير.

1- **العملية ذات الضغط الثابت** $(\Delta P = P_f - P_i = 0, \quad r = 0)$: وتسمى *أيزوبارك* (Isobaric process).

2- **العملية ذات الحجم الثابت** $(\Delta V = V_f - V_i = 0, \quad r = \infty)$: وتسمى *أيزوكورك* (Isochoric) أو *أيزوفولماتك* (Isovolumetric)

3- **العملية ذات درجة حرارة ثابتة** $(\Delta T = T_f - T_i = 0, \quad r = 1)$: وتسمى *أيزوثيرمال* (Isothermal).

4- **العملية ذات إنتروبي ثابت** $(\Delta S = S_f - S_i = 0)$: وتسمى *أيزينتروبك* (Isentropic).

أمثلة: باستخدام المصطلحات المعرفة في هذا الفصل ميز العمليات التالية بأكمل صورة.

1. درجة حرارة غاز موضوع في اسطوانة لها مكبس خال من الاحتكاك تزداد ببطء مع ثبوت الضغط.

الحل: *(أيزوباريك وانعكاسية و شبه ساكنة)*

2. غاز موجود في اسطوانة ولها مكبس يتمدد ببطء "مع ثبوت درجة الحرارة" ، ويوجد احتكاك بين المكبس وجدران الاسطوانة.

الحل: *(أيزوثيرمال وغير انعكاسية و شبه ساكنة)*

3. غاز موضوع باسطوانة مع مكبس خالٍ من الاحتكاك ويُضغط بسرعة.

الحل: *(غير انعكاسية وأديباتيكي لو كان التغير سريعاً بحيث لا يسمح بالتبادل الحراري)*

4. قطعة معدنية ساخنة ترمى في ماء بارد (بفرض أن المعدن هو النظام بحيث لا يتمدد أو ينكمش).

الحل: *(غير انعكاسية وأيزوكورك)*

5. بندول مثبت خال من الاحتكاك يتأرجح للأمام والخلف.

الحل: *(انعكاسية وأيزوكورك وأيزوثيرمال وأيزوباريك)*

6. طلقة توقفت داخل الهدف.

الحل: *(غير انعكاسية وأديباتيكي)*

IV- الوحدات (Units)

سوف نستخدم النظام الدولي للوحدات (ويُرمز له بالرمز SI). إن هذا النظام مبني على الوحدات الأساسية للطول (Length) والكتلة (Mass) والزمن (Time) وهي المتر (m) ، الكيلوجرام (kg)، والثانية (s) على الترتيب. والجدول التالي يبين بعض من وحدات النظام SI المستخدمة في علم الديناميكا الحرارية.

الكمية	رمز الوحدة	الكمية	رمز الوحدة
الطول (L)	m	الكتلة (M)	kg
الزمن (t)	s	السرعة (v)	$m.s^{-1}$
التسارع ($a=\frac{dv}{dt}$)	$m.s^{-2}$	القوة ($F=ma$)	$N = kg.m.s^{-2}$
المساحة (A)	m^2	الضغط ($P=\frac{F}{A}$)	$Pa = N.m^{-2}$ (باسكال)
الحجم (V)	m^3		
الشغل (W) أو الطاقة (E) أو كمية الحرارة (Q)	J = N.m (جول)	القدرة ($=\frac{E}{t}$)	$W = J.s^{-1}$ (وات)
درجة الحرارة (T)	K (كلفن)	الحرارة النوعية	$J.kg^{-1}.K^{-1}$

الوحدات الأخرى شائعة الاستعمال للضغط هي:

1 bar = 10^5 Pa,
1 atmosphere (atm) = 1.01 x 10^5 Pa,
1 torr = 133.3 Pa.

V- درجة الحرارة والقانون الصفري للديناميكا الحرارية

تعتبر درجة الحرارة خاصية أكثر دقة، من الضغط، لتحديد خصائص النظام. فما هو تعريف درجة الحرارة؟ ببساطة هو مقياس السخونة أو البرودة للمادة، وبمعنى أعمق، هو مقياس لطاقة الحركة التي تمتلكها جزيئات *النظام*. ومنشأها هو ما يسمى بقانون الديناميكا الحرارية الصفري. وقد تم تعريف القانون الصفري بعد أن عُرف القانون الأول للديناميكا الحرارية، ولهذا سُمى بالقانون الصفري. هذا القانون (كما هي الحال لكل قوانين الفيزياء) مبني على التجارب، وهو يُعنى بخصائص الأنظمة التي هي في حالة توازن حراري، بمعنى أنظمة في حالة توازن متصلة مع بعضها بحواجز منفذة للحرارة و ينص القانون على أنهُ : " إذا وجد نظامين منفصلين، مثلاً A و B كما بالشكل (5)، كل منهما في حالة توازن مع نظام ثالث، مثلاً C، فالنظامين A و B في حالة توازن مع بعضهما البعض".



شكل (5) حالة اتزان بين ثلاث أنظمة مُختلفة

ويوجد عدة أنظمة تستخدم لقياس درجات الحرارة منها المقياس المئوي (°C) (حيث C ترمز إلى مقياس سيلسيوس الحراري) وأيضاً هناك وحدة قياس درجة الحرارة على المقياس المطلق وهى K ، وهي اختصار لكلمة كلفن (Kelvin) (ولا تستخدم معها علامة الدرجة °) والعلاقة بين المقياس المئوي و المقياس المطلق هي:

$$T\,(\mathrm{K}) - T\,(^{\circ}\mathrm{C}) = 273.15$$

هناك مقياسين آخرين للحرارة ألا وهما المقياس الفهرنهيتي المعتاد ومقياس رانكين. المقياس الفهرنهيتي مرتبط بالمقياس المئوي بالمعادلة:

$$T\,(^{\circ}\mathrm{F}) = \frac{9}{5}T\,(^{\circ}\mathrm{C}) + 32$$

على هذا المقياس نقطة تجمد الماء هي 32°F ونقطة الغليان 221°F. مقياس الرانكين مشتق من مقياس الفهرنهايت

$$T\,(\mathrm{R}) = T\,(^{\circ}\mathrm{F}) + 459.67$$

هذا المقياس يستخدم في الهندسة بكثرة، وهو لا يستخدم رمز "الدرجة ° ".

VI- تمارين عامة

1 - صنف الجمل التالية إما صح أو خطأ:

أ - النظام الأدياباتيكى يستطيع تبادل الحرارة مع الوسط المحيط.

ب - العملية الشبة ساكنة هي عملية انعكاسية.

ت- العملية الانعكاسية هي عملية شبة ساكنة.

2- استخدم معادلة فان- درفال لحساب كل من: $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T, \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V, \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$.

3- عند النقطة الحرجة "C" معادلة فان- درفال تأخذ الصورة $P_c = \frac{RT_c}{V_c - b} - \frac{a}{V_c^2}$.

باستخدام الشروط $\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_C = \left(\frac{\partial^2 P}{\partial V^2}\right)_C = 0$. اثبت أن

$$P_c = \frac{2}{27b^2},\quad V_c = 3b, T_c = \frac{8a}{27Rb},$$ و $P_c V_c = \frac{3}{8}RT_c$.

4- استخدم معادلة فان- درفال لإيجاد حجم غاز الإيثين عند درجة حرارة $T = 300\ \text{K}$ **وضغط** $P = 200\ \text{atm}$ **. استخدم**

$a = 0.55088\ \text{m}^3\text{Pa/mol}^2, b = 0.058199\times10^{-3}\ \text{m}^3/\text{mol}$.

5- ارسم معادلة الانضغاط Z **بدلالة الضغط مستخدماً معادلة فان- درفال عند درجات الحرارة** $T = 180, 190, 200, 250\ \text{K}$ **. مساعده: انظر الملحق** $(1.B)$ **واحسب أولاً** Z **بدلالة** P, V **ثم ارسم** Z **بدلالة** P **.**

6- افترض أن

$$\alpha = \frac{(V-a)}{TV}, \quad \kappa = c\frac{(V-a)}{PV}$$

اثبت أن معادلة الحالة هي $P^c(V-a) = AT$ **حيث أن** a, c, A **ثوابت.**

7- للغاز المثالي, اثبت أن $\kappa = \frac{1}{P}, \quad \beta = \frac{1}{T}$.

8- اثبت أن $dV = -\varepsilon_T \frac{dV}{V} + \varepsilon_T \beta dT$ **، حيث معامل المرونة** ε_T **يعرف بالعلاقة**

$\varepsilon_T = -V\left(\frac{\partial P}{\partial V}\right)_T$.

VII- ملحق (1.A) التغير التفاضلي للحالة

إذا تتبعنا نظام منفصل يتغير تغيراً بسيطاً بحيث يمر من حالة اتزان ابتدائية إلى حالة اتزان أخرى قريبة من الأولى، فإن إحداثيات النظام سوف تتغير تغيراً طفيفاً. بالتالي فإن التغير الطفيف في الخواص يجب أن يعرف بدلالة تفاضلات جزئية في الإحداثيات المستقلة. مثلاً: إذا افترضنا أن المتغير Z دالة في المتغيرين (X, Y) بحيث أن $Z = f(X, Y)$ ، فإننا نجد أن:

$$dZ = \underbrace{\left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y}_{M} dX + \underbrace{\left(\frac{\partial Z}{\partial Y}\right)_X}_{N} dY \qquad (1)$$

ومنها نشتق:

1- العلاقة العكسية

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z = \left(\frac{\partial Y}{\partial X}\right)_Z^{-1} \qquad (2)$$

2- العلاقة الدائرية (التسلسلية)

$$\left(\frac{\partial X}{\partial Y}\right)_Z \left(\frac{\partial Y}{\partial Z}\right)_X \left(\frac{\partial Z}{\partial X}\right)_Y = -1 \qquad (3)$$

التفاضل الكامل: هو التفاضل الذي لا يعتمد على المسار ويعتمد فقط على الحالتين، الابتدائية والنهائية للنظام, وبالتالي نستطيع إجراء التكامل على هذا المسار. ولاختبار التفاضل الكامل لدالة مجهولة فيجب أن نتأكد من تساوي العلاقة $\left(\frac{\partial N}{\partial X}\right)_Y = \left(\frac{\partial M}{\partial Y}\right)_X$.

مثال: للغاز المثالي، اثبت أن V هو تفاضل كامل

الحل: باستخدام القانون العام للغازات المثالية بالصورة $V = \frac{RT}{P}$ نجد أن:

$$dV = \underbrace{\frac{R}{P}}_{M} dT - \underbrace{\frac{RT}{P^2}}_{N} dP$$

ومنها نجد أن:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_P = -\frac{R}{P^2} \qquad (5)$$

مع ملاحظة أن: المتغير الذي يحقق خصائص التفاضل الكامل يسمى دالة الحالة، (مثال على ذلك U, P)

التفاضل غير الكامل: هو التفاضل الذي يعتمد على المسار. ولهذا فلن نستطيع إجراء التكامل حتى نحدد ونُعرف المسار من حالة اتزان إلى أخرى.

مثال: للغاز المثالى، اثبت أن $dW = PdV$ تفاضل غير كامل

الحل:

$$\left(\frac{\partial M}{\partial P}\right)_T = 0, \quad \left(\frac{\partial N}{\partial T}\right)_P = -\frac{R}{P}$$

ملاحظة: المتغير الذي لا يحقق التفاضل الكامل لا يسمى دالة الحالة وبالتالي لا نستطيع كتابتهُ كدالة لمتغيرين, (مثلاً $W \neq f(P,V)$)

معاملي التمدد والانضغاط: باستخدام الحجم كدالة في الضغط ودرجة الحرارة، $V \equiv f(T,P)$، نجد أن:

$$dV = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T dP$$
$$= \alpha V dT - \kappa V dP$$

حيث $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ هو معامل التمدد الحجمي (Coefficient of volume expansion) أو (Expansivity) ويمثل التغير الجزئي للحجم الناتج من تغير درجة الحرارة عند ثبوت الضغط. وعرفنا أيضاً $\kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial P}\right)_T$ بمعامل الانضغاط (Isothermal compresibility) ويمثل التغير الجزئي للحجم الناتج من تغير الضغط عند ثبوت درجة الحرارة وهو قيمة موجبة دائماً.

VIII– ملحق (1.B) معادلات الحالة الغازية

عندما نتعامل مع الغازات والسوائل فإننا نتعامل مع نظم هيروديناميكية. بمعنى أن هناك دائماً تغير في الحجم عند تغيير الضغط أو الحرارة. ولدراسة الغازات يجب أن نرسم العلاقة البيانية بين قيمة معامل الانضغاطية (Compressibility factor) $\mathcal{Z} = PV/RT$ مقابل (P). في حالة الغازات المثالية فإن $\mathcal{Z} = 1$ تحت جميع الضغوط ودرجات الحرارة. أما في حالة الغازات الحقيقية فإنها تحيد عن الواحد. عامةً بالإمكان التعبير عن معامل الانضغاطية بمعادلة الحالة الرياضية، وتسمي معادلة فيريال (Virial equation):

$$\mathcal{Z} = 1 + B_P(T)P + C_P(T)P^2 + \cdots \qquad (1)$$

$$= 1 + \frac{B_V(T)}{V} + \frac{C_P(T)}{V} + \cdots \qquad (2)$$

حيث أن $B_P(T), C_P(T), B_V(T), C_V(T),$ هي (Virial coefficients) أي معاملات فيريال. وسوف تدرس هذه المعادلة بالتفصيل فى الباب الخاص بالغازات الحقيقية.
معادلة أخري للحالة مشتقة من المعادلة (2)، وتسمي معادلة فان– ديرفال للغازات الحقيقية، تعطى بالعلاقة:

$$\left(P + \frac{an^2}{V^2}\right)(V - nb) = nRT \qquad (3)$$

حيث أن الضغط (P) والحجم (V) ودرجة الحرارة (T) و (n) عدد المولات، والثابت العالمي للغاز هو $R = 8.314\ \mathrm{J \cdot K^{-1} \cdot mole^{-1}}$. التعديلات (الثوابت) للضغط و الحجم وتمثل في القيم (a) و (b) يصبحان مهمان عند تعرضنا لدراسة الغازات الحقيقية لاحقاً.

أما بالنسبة للغازات المثالية فإن معادلة الحالة تعطى بالعلاقة:

$$PV = nRT = N_A k_B T \qquad (4)$$

$k_B = R/N_A$ هو ثابت بولتزمان. 1 كيلومول من الغاز يحتل حجماً مقداره $22.4\ \mathrm{m}^3$، ويحتوي على $6.02\times10^{23}\ \mathrm{molecules/mole}$. (والقيمة $N_A = 6.02\times10^{23}\ /\mathrm{mole}$ تسمى رقم أفوجادرو).

مثال : استخدم معادلة فان– درفال لحساب الضغط المؤثر على مول واحد من غاز الميثان والذي يملأ وعاءً حجمه 250 مل عند درجة الصفر المئوي. قارن النتيجة مع معادلة الغاز المثالي. (لغاز الميثان استخدم قيم الثوابت: $a = 0.23026\ \mathrm{m^3Pa/mol^2}$ و $b = 0.043067\times10^{-3}\ \mathrm{m^3/mol}$.

الحل: معادلة فان– درفال للضغط تأخذ الصورة $P = \frac{nRT}{V-nb} - \frac{an^2}{V^2}$. وباستخدام $n=1$ و $T = 273.15\ \mathrm{K}$ و $V = 250\ \mathrm{mL} = 0.25\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$ فسوف نجد أن $P = 7.29\times10^6\ \mathrm{Pa}$.

وللمقارنة بمعادلة الغاز المثالي للضغط والتي تأخذ الصورة $P = \frac{nRT}{V}$. و باستخدام $n=1$ و $T = 273.15\ \mathrm{K}$ و $V = 250\ \mathrm{mL} = 0.25\times10^{-3}\ \mathrm{m^3}$ سوف نجد أن $P = 9.08\times10^6\ \mathrm{Pa}$.

والقيمة المعملية هي $P = 7.4\times10^6\ \mathrm{Pa}$ وهى قريبة من قيمة معادلة فان–درفال.

الباب الثاني

علاقات أساسية بالديناميكا الحرارية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	القانون الأول للديناميكا الحرارية	22
II	القانون الثاني للديناميكا الحرارية	24
III	دوال أخري للديناميكا الحرارية	27
	i طاقة هلمهولتز الحرة F	27
	ii دالة جبس G	28
IV	علاقات ماكسويل	28
V	القانون الثالث للديناميكا الحرارية	29
VI	ملخص لقوانين الديناميكا الحرارية	30

الباب الثاني

علاقات أساسية بالديناميكا الحرارية

(Principle Relations of Thermodynamics)

الديناميكا الحرارية تعتبر واحدة من المواد العلمية القليلة التي نستطيع أن نتعامل معها بطريقتين مختلفتين ونصل إلي نفس النتائج. احد هذه الاتجاهات، كما تم توضيحه سابقاً بالباب الأول، هو أن نتعامل مع الظواهر الفيزيائية بطريقة رمزية، أو استقرائية. ومن هذا الاتجاه فإن السلوك العام للمواد يظهر باستخدامنا لرياضيات الجبر والحساب البسيطة. وبتدوين ألاف، بل وملايين، الملاحظات المعملية نستطيع أن نصل بطريقة عامة إلي قوانين مختصرة تصف لنا سلوك المواد، ألا وهي قوانين الديناميكا الحرارية الأربعة وتوابعها. وفي هذا الباب سوف نستعرض القوانين الأربعة الأساسية للديناميكا الحرارية وتوابعها.

I- القانون الأول للديناميكا الحرارية:

(First Law of Thermodynamics)

القانون الأول للديناميكا الحرارية ينص صراحةً على ثبوت كمية الطاقة الكلية لنظام معزول من خلال التعريف بأن "الطاقة الكلية لنظام معزول هي كمية ثابتة (محفوظة)". ويعتبر أيضاً أن الحرارة هي شكل من أشكال الطاقة. ولكي نجد صيغة رياضيه للقانون، دعونا نعرف بعض الكميات لنظام مغلق (يسمح بتبادل الطاقة فقط مع الوسط المحيط) كالتالي:

Q : كمية الحرارة وتُعتبر موجبة إذا انتقلت إلي النظام، وسالبة إذا انتقلت من النظام.

W : الشغل المبذول ويعتبر موجب إذا تم بواسطة النظام، وسالب إذا تم على النظام.

E : الطاقة الكلية وتعتبر موجبة إذا ذادت للنظام، وسالبة إذا قلت للنظام.

ورياضياً توضع بالصورة:

$$Q = W + E \tag{1}$$

ولكميات متناهية الصغر في التَغير نجد أن:

$$đQ = đW + dE \tag{2}$$

حيث (التفاضل $đ$) يستخدم للكميات التي تعتمد على المسار، وللتبسيط فقط سوف نستخدم الحرف d بدلاً من $đ$. الكمية E لا تعتمد على المسار وتتكون من جزئين: الجزء الأول عيني وناتج من طاقة الحركة للنظام ككل (E_k) وطاقته الوضعية (E_p) للنظام، والجزء الثاني مجهري، وناتج من الطاقة المختزنة لجزيئات النظام وإلكتروناته (حركية، اهتزازية، دورانية،...) لجزيئات النظام، وتسمي طاقة داخلية جزيئية (أو ببساطة طاقة داخلية ويرمز لها بالرمز U). ولهذا:

$$E = E_k + E_p + U \tag{3}$$

وفي حالة إهمال الحركة العينية للنظام، وأيضاً الجاذبية، فإن الطاقة الكلية تؤول إلي:

$$E = U \tag{4}$$

وباستخدام العلاقة $dW = PdV$ للشغل المبذول بواسطة النظام تحت ضغط ثابت، نصل إلي الشكل المعروف للقانون الأول وهو:

$$\begin{aligned} dQ &= dW + dU \\ &= PdV + dU \end{aligned} \tag{5}$$

وبالتالي فإن القانون ينص علي أن "*كمية الحرارة المنتقلة إلي النظام تستخدم لزيادة طاقته الداخلية وأيضاً لبذل الشغل بواسطة النظام لزيادة حجمه*".

ويستخدم القانون الأول لحساب بعض من الكميات المعملية مثل:

1- الحرارة النوعية تحت حجم ثابت والتي تعرف بالعلاقة:

$$C_v = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_v \tag{6}$$

2- الحرارة النوعية تحت ضغط ثابت والتي تعرف بالعلاقة:

$$C_P = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P \tag{7}$$

حيث H هي المحتوي الحراري "Enthalpy" وتعرف بالعلاقة:

$$H = U + PV \tag{8}$$

ومعني المحتوي الحراري يظهر من تفاضل H تحت ضغط ثابت حيث:

$$\begin{aligned} dH &= dU + PdV \\ &= dQ \end{aligned} \tag{9}$$

ومعناه أن "التغير في المحتوي الحراري تحت ضغط ثابت يتساوي بكمية الحرارة المكتسبة بواسطة النظام".

ملحوظة: كما ذكرنا سابقاً أن القانون الأول يعنى بشكل رئيسي بقانون حفظ الطاقة، ولهذا فهو من القوانين الثابتة والتي لا ولن تتغير. وبرغم من ذلك فإنه يوجد بعض القصور في هذا القانون فمثلاً:

1- لا يمكننا استخدامه في معرفة اتجاه ظاهرة فيزيائية. علي سبيل المثال، أننا نلاحظ دائماً حركة مياه الشلالات وهي تسقط من أعلي الشلال لأسفله، ولم نري أبداً أو نلاحظ أن المياه تصعد من أسفل الشلال لأعلاه بالرغم من علمنا أن الطاقة الكلية هي كمية محفوظة بأعلى الشلال وأسفله.

2- لا يمكننا استخدامه في معرفة إمكانية (أو زمن) حدوث تفاعل ما. مثال علي ذلك، إن القانون لا يفسر سبب انتقال الحرارة من الجسم الساخن إلى الجسم البارد فقط وليس العكس.

II- القانون الثاني للديناميكا الحرارية:

(Second Law of Thermodynamics)

هذا القانون مبنيا على نتائج الملاحظات العينية لما يجري بالنظم الحرارية، واتجاه حدوث الظواهر الفيزيائية فيها. ببساطة نلاحظ دائماً أن النظام المعزول يلتمس اتجاه معين نحو حالة الاتزان. هذا الاتجاه الطبيعي يظهر جلياً من استخدامنا للمثال التالي: اعتبر كميتان من غازان مختلفان محتويان بداخل وعاء يفصلهما حاجز، انظر الشكل (1) ت. عند إزالة الحاجز، كما بالشكل (1) ب، نجد أن الغازان يبدأن بالانتشار حتى يتوزعا بانتظام خلال الوعاء بأكمله، كما بالشكل (1) أ . وهذه العملية لها اتجاها واحدا فقط، وهو من الشكل ت إلي الشكل أ. العملية العكسية لهذا الانتشار، وهي انفصال الغازان وتجمعهما في منتصف الإناء مرة أخري بعد تشتتهما، لا تحدث أبداً.



شكل (1) اتجاه العمليات الفيزيائية

ومن هنا تظهر صيغ مختلفة للقانون الثاني، ولكنها تؤدي نفس الغرض. وسنكتفي هنا بالعبارات التاليه:

1- تعريف كلازيوس " لا يمكن أن تنتقل الحرارة ذاتياً من الجسم البارد إلى الجسم الساخن"

2- تعريف كلفن " لا يمكن أن تتحول الحرارة كليةً إلى شغل في أي عملية دائرية، ولكن الشغل يمكن أن يتحول كليةً إلى حرارة في العمليات التلقائية".

هذان التعريفان متكافئين ويمكن التحقق منهما من خلال الملاحظات لتجارب الديناميكا الحرارية التي لا تحصى.

وقد وجد كلازيوس من خلال ملاحظاته المعملية لأي عملية حقيقية لنظام متلامس حرارياً مع الوسط المحيط به عند درجة حرارة ، T، فإن الكمية:

$$dS = \frac{dQ}{T}$$

دائماً موجبة، أو قريبة جداً من الصفر للعمليات شبه المعكوسة. وحيث أنه من الطبيعي للعمليات الفيزيائية أن تتجه دائما نحو حالة الاتزان، فقد استنتج كلازيوس أن قيمة S سوف تتعاظم عند الوصول لحالة الإتزان. وقد سميت الكمية S ب "الإنتروبي"، ووجد أن الشرط المحقق لها لنظام معزول هو:

$$\Delta S \geq 0$$

ولتغير كبير نجد:

$$\Delta S \equiv \int_1^2 dS = \int_1^2 \frac{đQ}{T},$$

$$đQ = CdT,$$

دعونا نلخص ما سبق شرحه بطريقة أخري وهي كالتالي: من منظور الديناميكا الحرارية نجد أنه لأي عملية تلقائية، وعند الوصول لحالة الاتزان، فإن المجموع الكلي للإنتروبي يصل لقيمة عظمي ولا يتغير. وببساطة نجد أن "المجموع الكلي للإنتروبي (للنظام + الوسط المحيط به) يتجه للزيادة في أي عملية تلقائية". وهناك عدة طرق لزيادة الإنتروبي لنظام نذكر منها علي سبيل المثال: زيادة عدد جسيماته، إضافة طاقة، زيادة حجمه.

وخلال العمليات الانعكاسية فقط نجد أن التغير في الإنتروبي dS يرتبط بكمية الحرارة المنتقلة dQ إلي النظام ودرجة حرارته المطلقة T بالعلاقة:

$$dS = \frac{đQ}{T} \quad \Rightarrow \quad đQ = TdS$$

ولهذا فإن القانون الأول يؤول إلي:

$$dU = TdS - PdV$$

ومنه نحصل على العلاقات:

$$T = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_{N,V}, \qquad P = -\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_{N,S}, \qquad \frac{P}{T} = \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{N,E}$$

ومن منظور الديناميكا الإحصائية سوف نجد أن الإنتروبي يعرف بأنه "مقياس الحركة العشوائية لجسيمات النظام" ولذلك فإن جزيئات الغاز تكون عشوائيتها أكبر من عشوائيتها لسوائل نفس المادة، وأيضاً عشوائية جزيئات السوائل أكبر من عشوائية جزيئات الحالة الصلبة لنفس المادة، انظر شكل (2). وهذا ناتج من مدي ترتيب الجزيئات بالمادة. وسيتم استعراض هذا التعريف بالتفصيل بالباب الرابع لما له من أهمية قصوي بدراستنا الحالية.



شكل (2) مقياس العشوائية للجسيمات.

III- دوال أخري للديناميكا الحرارية:
(Thermodynamics Functions)

i- طاقة هلمهولتز الحرة F "Helmoholtz free energy"

تعرف دالة هلمهولتز بالعلاقة:

$$F = U - TS$$

وتفاضلها يعطي:

$$dF = dU - TdS - SdT$$
$$= -PdV - SdT$$

ونستنتج من المعادلة الأخيرة التالي:

1- التغير في طاقة هلمهولتز الحرة تحت درجة حرارة ثابتة تتساوي مع الشغل المبذول علي النظام،

2- في أي عملية قابلة للانعكاس نجد أن $dF = 0$ عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة،

3- بالإمكان تعريف الإنتروبي بالمعادلة

$$S = \left(\frac{dF}{dT}\right)_V$$

ii- دالة جبس G "Gibb's function"

تعرف بالعلاقة:

$$G = F + PV$$

وتفاضلها يعطي:

$$dG = VdP - SdT$$

ونلاحظ هنا أن التغير في دالة جبس تتساوي بالصفر عند ثبوت الضغط ودرجة الحرارة مثل ما يحدث في حالات التبخر والإنصهار والتسامي.

IV- علاقات ماكسويل: (Maxwell's relations)

دوال الديناميكا الحرارية السابقة هي دوال مستقلة ولا تعتمد على المسار الذي تم بواسطته التغيير. بالتالي فإننا نستطيع أن نطبق شرط التفاضل التام على المعادلات التالية (انظر الملحق (1.A)):

$$\begin{aligned} dU &= -PdV + TdS, \\ dH &= VdP + TdS, \\ dF &= -PdV - SdT, \\ dG &= VdP - SdT \end{aligned}$$

ونجد منه العلاقات التالية:

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S &= -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V, \\ \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P &= \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S, \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_V &= -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P, \\ \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V &= \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T \end{aligned}$$

وتسمى هذه العلاقات بعلاقات ماكسويل

ولنظام متعدد المركبات (العناصر) نجد أن الدوال تأخذ الشكل التالي:

$$\begin{aligned} dU &= -PdV + TdS + \sum \mu_i dn_i, \\ dH &= VdP + TdS + \sum \mu_i dn_i, \\ dF &= -PdV - SdT + \sum \mu_i dn_i, \\ dG &= VdP - SdT + \sum \mu_i dn_i \end{aligned}$$

حيث μ_i هو الجهد الكيميائي

$$\mu_i = \left(\frac{\partial U}{\partial n_i}\right)_{S,V} = \left(\frac{\partial H}{\partial n_i}\right)_{S,P} = \left(\frac{\partial F}{\partial n_i}\right)_{T,V} = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i}\right)_{T,P}$$

هذه المعادلات توضح أن الجهد الكيميائي هي كمية تصف كيفية تغير جهود الديناميكا الحرارية عندما يضاف بعض الجسيمات إلى النظام المعني بالدراسة. وهذا التعريف له أهميته الخاصة عندما نتعرض إلى الاتزان الكيميائي بين حالتين من حالات المادة، مثلاً α و β، فنجد أن شرط الاتزان الكيميائي بين الحالتين هو أن تأثير حركة الجسيمات من α إلى β يتساوي مع تأثير حركة الجسيمات من β إلى α ورياضياً تكتب:

$$\mu_\alpha = \mu_\beta$$

V- القانون الثالث للديناميكا الحرارية:

(Third Law of Thermodynamics)

يحكم القانون الثالث للديناميكا الحرارية تصرف النظم المتزنة عندما تقترب درجة حرارتها من الصفر المطلق. وسوف نذكر نص أحد القوانين وهو: " جميع التفاعلات في النظام، السوائل والأجسام الصلبة، والتي هي في حالة اتزان تحدث بدون تغير في الإنتروبي عند اقتراب النظام من الصفر المطلق".

وبالرغم من أن القانون وضع للسوائل والأجسام الصلبة فإنه يفترض أيضا تطبيقه علي الغازات، إذا وجدت عند هذه الدرجة. ولا مكان هنا لعرض النصوص الأخرى للقانون وتبعاتهم.

VI– ملخص لقوانين الديناميكا الحرارية

FORMULA SHEET FOR STATISITICAL THERMODYNAMICS			
Thermodynamic potential	Independent variables	Reciprocity relations	Maxwell relations
Internal energy U	S,V $dU = TdS - PdV$	$T=\left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V, -P=\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S$	$\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_V$ $=\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S}$
Enthalpy $H=U+PV$	S,P $dH = TdS + VdP$	$T=\left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P, V=\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S$	$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_P$ $=\frac{\partial^2 H}{\partial P \partial S}$
Helmcholtz function $F=U-TS$	T,V $dF = -SdT - PdV$	$S=-\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, -P=\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T$	$\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V$ $=\frac{\partial^2 F}{\partial V \partial T}$
Gibbs function $G = U - TS + PV$ $= H - TS$ $= F + PV$	T,P $dG = -SdT + VdP$	$S=-\left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P, V=\left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T$	$\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P$ $=\frac{\partial^2 G}{\partial P \partial T}$
First Td equation	$Tds = C_V dT + T\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V dV$	$Tds = C_V dT + T\frac{\beta}{\kappa} dV$	$S = S(V,T)$
Second Td equation	$Tds = C_P dT - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P dP$	$Tds = C_P dT - T\beta dP$	$S = S(P,T)$
Third Td equation	$Tds = C_V\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_V dP + C_P\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_P dV$		$S = S(V,P)$
S, V are constant.	$dS = dV = 0$	$dU \le 0$	Minimum U
S, P are constant.	$dS = dP = 0$	$dH \le 0$	Minimum H
T, V are constant.	$dT = dV = 0$	$dF \le 0$	Minimum F
T, P are constant.	$dT = dP = 0$	$dG \le 0$	Minimum G
Adiabatic	$dQ = dU + PdV = 0$	$dS \ge 0$	Minimum S

الباب الثالث

الديناميكا الحرارية الإحصائية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	نموذج العملة والتوزيع الأكثر احتمالاً	33
II	العالم المجهري وميكانيكا الكم	40
	i تكميم الشحنة	41
	ii المظهر الجسيمي للطاقة	41
	iii ازدواجية الجسيم والموجه	42
	iv مبدأ بور المتمم	42
	v مبدأ الشك (عدم اليقين)	42
	vi الفراغ الطوري	43
	vii تكميم الطاقة	46
III	كثافة المستويات	53
IV	ملحق (3.A) الجسيمات المتطابقة	56

الباب الثالث

الديناميكا الحرارية الإحصائية
(Statistical thermodynamics)

سوف نستعرض في هذا الباب بعض الأساسيات المهمة التي بنيت عليها الفيزياء الإحصائية، ألا وهما ميكانيكا الكم ونظرية الاحتمالات. فنحن نعلم أن قوانين نيوتن في الميكانيكا الكلاسيكية لاقت استحساناً وقبولا منقطع النظير عندما توقعت السلوك العيني لأنظمة الميكانيكا الحرارية. ولكن عندما تم تطبيقها على الأجسام المجهرية وُجد أنها تعطي إجابات غريبة وغير منطقية للظواهر المعملية المحسوبة. فعلى سبيل المثال لم تستطع قوانين نيوتن في الإجابة على السؤال: لماذا تؤول الحرارة النوعية للمواد للصفر عندما تؤول درجة الحرارة المطلقة للصفر؟ هذا القصور في الميكانيكا الكلاسيكية لم يُحل إلا بافتراض بلانك وهو أن طاقة الجسيمات يجب أن تكون مكممة (منفصلة discrete). وتبعاً لهذا الفرض ظهرت أساسيات ميكانيكا الكم، والتي سوف نتعرض لها باختصار في هذا الباب.

ونقف هنا لنسأل: لماذا نلجأ إلى القوانين الإحصائية؟ والإجابة تأتي من أن النظام المجهري يتكون من أعداد فلكية من الجسيمات. ولو طبقنا قوانين نيوتن علي كل جسيم في النظام فسوف نحل لعدد لانهائي من المعادلات المطلوب حلها والتي تحتاج لعقود كي يتم حلها بواسطة الكمبيوتر. وحتى لو استطعنا إيجاد حل لهم بعد هذه الفترة فسوف نجد أن النظام قد تغير. ولهذا سوف نلجأ إلى القوانين الإحصائية حيث تمكننا من أن نتعامل مع أعداد لانهائية من الجسيمات المميزة وغير المميزة.

وقد بدأ استخدام الطرق الإحصائية قبل ظهور أساسيات ميكانيكا الكم بأعوام وذلك نظراً لأن النظريات الذرية أصبحت حجر الأساس في مجالات عدة مثل التفاعلات الكيميائية. ونظراً لصغر الذرات والجزيئات فقد اقترح علماء عديدين، مثل ماكسويل وبولتزمان، استخدام الطرق الإحصائية لتفهم العلاقة بين سلوك الذرات والطاقة. وبالرغم من المعارضة الشديدة لهذا الاتجاه في بداية الأمر ولكن لوحظ أن هذه الطريقة استطاعت أن تستنتج وتتوقع الخواص

الحرارية كما تتوقعها الطرق الاستقرائية. وهذا الاتجاه ما يسمي بالفيزياء الإحصائية أو الإحصاء الديناميكي الحراري.

سوف نلاحظ هنا أن الهدف الأساسي للإحصاء الديناميكي الحراري هو تقديم نظرية جسيمية من نتائجها نستطيع تفسير خواص الاتزان للنظام العيني. ولكن أساس هذه النظرية مبني علي نظرية ميكانيكا الكم. ولحسن الحظ فإنها نظرية مُرضية يمكن تطويرها باستخدام المبادئ البسيطة لمستويات الطاقة وقوى التفاعل الداخلية بين الجزيئات. والفكرة الرئيسية هنا هو البحث عن دالة تعبر عن الكثافة الاحتمالية (Probability density function) ليتم تطبيقها على تجمعات كبيرة من الجسيمات المتطابقة. وسوف نتعامل مع النظام الديناميكي الحراري على أنه كمية من المادة عدد جسيماتها هائل (N)، يقارب عدد أفوجادرو، مستويات كمية متغيرة وله الخواص العينية المميزة. والفرض الأساسي المبني عليه الإحصاء الديناميكي الحراري هو:

"أن جميع المستويات المجهرية لمجموعة معزولة لها احتمالات متساوية"

والان نحن بحاجة إلى بعض المصطلحات الجديدة. لذلك سوف نستخدم المصطلح مجموعة (Assemply) للتعبير عن عدد (N) الذي له نفس الصفات، مثل الجزيئات، الذرات، الإلكترونات، الفوتونات، الفونونات، ألخ. ويستخدم المصطلح نظام كمرادف للمصطلح مجموعة. والحالة العينية للنظام (Macrostate of a system, or Configration) نعرف هنا لتحديد ترتيب معين لعدد الجسيمات في كل منسوب طاقة للنظام. دعونا نستعرض بعض الأمثلة ومنها سوف نعرف بعض المصطلحات الأخرى مع الأمثلة التوضيحية.

أ – نموذج العملة والتوزيع الأكثر احتمالاً
(Coin model and the most probable distribution)

نبدأ هنا بتجربة بسيطة سوف نستخلص منها بعض المصطلحات الإحصائية والتي ستخدمنا في دراسة الفيزياء الإحصائية. نبدأ بتجربة رمي عملة معدنية وحيدة بالهواء. وعند سقوط العملة علي الأرض بحرية، نعلم مسبقاً أننا سوف نحصل على الحدث صورة لأعلى، ونرمز لها

بالحرف H، أو الحدث كتابة لأعلى، ونرمز لها بالحرف T. والاحتمال هو 50% لأي من الحدثين وهذا ناتج من أن:

فرض احتمال الحصول على الحدث صورة لأعلى هو $P(H)$

فرض احتمال الحصول على الحدث كتابة لأعلى هو $P(T)$

ونعلم أن $$P(T)+P(H)=1$$

ولذلك فإن $$P(T)=P(H)=\frac{1}{2}$$

بالطبع فإن هذه النتيجة لا تتأتي بإجراء التجربة لعدد محدود من المرات، بمعني رمي القطعة الواحدة لعدد محدود من المرات أو رمي عدد محدود من العملات مرةً واحدةً. لذلك فسوف نقوم بدراسة رمي عدد من العملات، ونستخلص منها بعض النتائج والمصطلحات المهمة.

دعونا ندرس نتائج رمي أربع عملات، متطابقة ولكن مميزة (ويمكن التمييز مثلا عن طريق التاريخ أو اللون)، مع استخدامنا للرموز التالية:

الرمز	المعنى
k	تعبر عن ترقيم الحالات العينية
N_{1k}	العدد الكلي لحالات الحصول على الحدث صورة (H) بالمستوى العيني k
N_{2k}	العدد الكلي لحالات الحصول على الحدث كتابة (T) بالمستوى العيني k
ω_k	احتمالية الديناميكا الحرارية ≡ عدد الحالات المجهرية للمستوى العيني k
$\Omega=\sum_{k=1}\omega_k$	العدد الكلي للحالات المجهرية
$p_k=\frac{\omega_k}{\Omega}$	الاحتمالية الحقيقية

من التعريفات السابقة نستطيع تكوين الجدول التالي. مع ملاحظة أن عدد الحالات العينية خمسة وهي $k=1,2,3,4,5$ والحالات العينية هي الحالات المحتملة ولا تتطلب تحديداً لأي من العملات، أما الحالات المجهرية فتتطلب تحديد رقم العملة.

	الحالات العينية		الحالات المجهرية					
k	N_{1k}	N_{2k}	العمله 1	العمله 2	العمله 3	العمله 4	ω_k	$p_k=\frac{\omega_k}{\Omega}$
1	4	0	H	H	H	H	1	1/16
2	3	1	H	H	H	T	4	4/16
			H	H	T	H		
			H	T	H	H		
			T	H	H	H		
3	2	2	H	H	T	T	6	6/16
			T	T	H	H		
			H	T	H	T		
			T	H	T	H		
			H	T	T	H		
			T	H	H	T		
4	1	3	H	T	T	T	4	4/16
			T	H	T	T		
			T	T	H	T		
			T	T	T	H		
5	0	4	T	T	T	T	1	1/16

ومن الجدول نجد أن:

$$\Omega=\sum_{k=1}^{5}\omega_k=1+4+6+4+1=16. \qquad (1)$$

ولحساب المتوسط (معدل) الحصول على الحدث N_j نستخدم المعادلة:

$$\overline{N_j}=\frac{\sum_k N_{jk}\omega_k}{\Omega}=\sum_k N_{jk}\frac{\omega_k}{\Omega}=\sum_k N_{jk}P_k \qquad (2)$$

لنجد أن متوسط الحصول علي الحدث صورة H هو:

$$\overline{N_1}=\frac{1}{16}\left[(4\times1)+(3\times4)+(2\times6)+(1\times4)+(0\times1)\right]=2$$

واجب منزلي: احسب متوسط الحصول علي الحدث كتابة T واثبت أن $\overline{N_2}=2$ كما هو متوقع. بالتالي فإن $\overline{N_1}+\overline{N_2}=4$.

الشكل (1) يحاكي عدد الحالات المجهرية، المعرفة بالجدول (1)، كدالة في عدد الصور العلوية الناتجة، N_1، مع ملاحظة القيمة العظمى للحالات المجهرية عندما $N_1=N_2=N/2=2$.



شكل (1) احتمالية الديناميكا الحرارية كدالة لعدد الصور العلوية في تجربة ال [illegible] لعدد 4 عملات.

وحتى تصبح النتائج [illegible] عليها، يجب أن نتعامل مع عدد لانهائي من العملات. ونسأل: هل توجد طريقة [illegible] ω_k بدون أن نلجأ إلى جدولة النتائج المتوقعة؟ والإجابة نعم حيث نستطيع [illegible] (الأثر الملحق C) نجد أنه لعدد من العملات المميزة N فإن عدد الطرق لاختيار عدد من الصور N_1 وعدد من الكتابة $(N-N_1)$ تعطى بالعلاقة:

$$\omega_k=\binom{N}{N_1}=\frac{N!}{N_1!(N-N_1)!} \qquad (4)$$

ومن الجدول السابق نجد أن أعلى معدل لعدد الحالات المجهرية للتوزيع، $\omega_k=\text{maximum}$، تحدث عندما $N_1=N_2=N/2$ وسوف ندعوها $\widetilde{\omega}$ وتسمى التوزيع الأكثر احتمالاً.

واجب منزلي: تحقق من ω_k بالجدول السابق باستخدام المعادلة (4).

باستخدام المعادلة (4)، مع مساعدة آله حاسبة، نستطيع أن نحسب ونرسم توزيع احتمالية الديناميكا الحرارية كدالة لعدد الصور لعدد أكبر من العملات. شكل (2) يظهر الاحتمالية لعدد 8 من العملات، وفيه نجد أن $\widetilde{\omega}=70$ عندما $N_1=N_2=4$.



شكل (2) احتمالية الديناميكا الحرارية كدالة لعدد الصور العلوية لعدد 8 من العملات.

وقبل أن نسترسل في زيادة عدد العملات واستخلاص نتائج التجربة، دعونا نتعامل مع المثال التالي.

مثال: احسب $\widetilde{\omega}$ للقيم $N=4,8,1000$.

الحل: باستخدام المعادلة (4):

$$\widetilde{\omega}=\binom{N}{\frac{N}{2}}=\frac{N!}{\left(\frac{N}{2}\right)!\left(\frac{N}{2}\right)!}$$

وباستخدام آلة حاسبة عادية نستطيع تكوين الجدول التالي:

N	$N_1=N/2$	$\widetilde{\omega}$
4	2	$\frac{4!}{2!2!}=6$
8	4	$\frac{8!}{4!4!}=70$
1000	500	$\frac{1000!}{500!500!}\overset{?}{=}10^{300}$

ولكن بالطبع لن نستطيع حساب !500 باستخدام أي آله حاسبة ولكن نستطيع حسابها باستخدام تقريب استرلنج (Stirling's approximation)، انظر الملحق A، بالشكل:

$$\ln(N!) = N\ln(N) - N$$

فكيف نستخدم هذا التقريب لحساب قيمة $\widetilde{\omega} = \dfrac{1000!}{(500!)\times(500!)}$ ؟

الطريقة هي أن نأخذ لوغاريتم الطرفين فنجد أن:

$$\ln(\widetilde{\omega}) = \ln(1000!) - 2\ln(500!)$$

باستخدام تقريب استرلنج نجد أن:

$$\ln(\widetilde{\omega}) = 1000\times\ln(1000) - \cancel{1000} - 2[500\times\ln(500) - \cancel{500}]$$

$$= 1000\ln\left(\frac{1000}{500}\right) = 693,$$

$$\ln_{10}(\widetilde{\omega}) = (\ln_{10} e)\ln(\widetilde{\omega}) = 0.4343\times 693$$

$$= 300,$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\widetilde{\omega} = 10^{300}}$$

من المثال السابق نستطيع أن نرسم الشكل (3) لعدد 1000 من العملات لنجد أن القمة المطابقة لحدوث عدد الوجوه الأكثر احتمالاً تزداد حدتها، وتصبح كدالة دلتا لديراك كما بالملحق A، كلما زاد عدد القطع المعدنية من 4 عملات إلى عدد 1000. وحيث أننا نتعامل مع أعداد مقاربة لعدد أفوجادرو، فإننا نتوقع أن نحصل علي توزيع مركز تماماً حول النقطة الأكثر احتمالاً.



شكل (3) احتمالية الديناميكا الحرارية كدالة لعدد الصور العلوية لعدد 1000 من العملات.

واجب منزلي: في حالة إلقاء 1000 عملة مميزة وحصولنا علي النتيجة 400 صورة لأعلى و 600 كتابة لأعلى، اثبت أن احتمالية الديناميكا الحرارية هي 10^{291}.

والان دعونا نستخلص بعض النتائج المهمة من التجربة السابقة وذلك عند رسم ω كدالة في عدد الصور الناتجة "N_1" وهي كالتالي:

1- ω تأخذ قيمة عظمى، $\widetilde{\omega}$، عندما $N_1 = N/2$.

2- مع زيادة N نجد أن $\widetilde{\omega}$ تأخذ أرقاماً فلكية.

3- بداية ونهاية المنحنى دائماً تبدأ بالقيمة $\omega = 1$.

4- الحدث، أن عدد العملات ذات الصور العليا تتساوي مع عدد العملات ذات الكتابة لأعلى، أي بنسبة 50-50، نتيجة تعتبر متوقعة وذلك مع زيادة عدد العملات N.

5- من المنحنى نجد أن منطقة النظامية، حيث $|\omega - \widetilde{\omega}| >> 0$، تقل احتمالية تواجدها مع زيادة عدد العملات N.

6- من النتائج السابقة، ومن المنحني مع الزيادة الكبيرة للعدد N، نستطيع أن نستنتج أن المجموع الكلي للحالات المجهرية يتساوي تقريباً مع $\widetilde{\omega}$،

$$\Omega = \sum \omega_k \approx \widetilde{\omega}$$

7- المنحنى أيضاً يعطينا طريقة بسيطة لحساب $\widetilde{\omega}$، كيف؟ نحن نعلم أن الميل عند قمة المنحني مساوي للصفر. ولإيجاد قيمة $\omega(N_1)$، نحسب تفاضل الدالة بالنسبة إلى N_1 ونضع النتيجة مساوية للصفر. بهذا نستطيع أن نحسب N_1 عند $\omega = \widetilde{\omega}$ وبالتالي نستطيع حساب N_2. والنتيجة بهذه الطريقة تعطي أعلى احتمالية للحالة العينية.

واجب منزلي: اعتبر تجربة إلقاء عدد N من العملات المميزة وحصولنا علي النتيجة N_1 صورة و $N_2 = N - N_1$ كتابة.

أ- في حالة N كبيرة جداً، بحيث نستطيع استخدام تقريب استيرلنج، اثبت أن القيمة العظمى للقيمة $\ln\omega$ تحدث عندما $N_1 = \frac{N}{2}$.

ب- اثبت أن $\widetilde{\omega} \approx e^{N\ln 2}$.

لمسائل الديناميكا الحرارية، فإن ما نسعى إليه هو توزيع إحصائي لعدد الجسيمات بكل مستوى طاقة n. ومهمتنا هنا أن نوجد الدالة $\omega(N_1, N_2, \cdots, N_j, \cdots, N_n)$، بالطبع مع بعض الشروط أو القيود، ومساواة تفاضلها بالصفر. ومن الخطوة السابقة نحصل علي فئة خاصة من الأعداد $\{N_j\}$، تمثل أعلى احتمالية للحالة العينية. وأعلى احتمالية للحالة العينية تعبر عن حالة الاتزان للمجموعة. وهذه هي المسألة الأساسية التي نبحث عنها في الديناميكا الحرارية الإحصائية- ألا وهي إيجاد حالة الاتزان للنظام.

وقبل أن نختم هذا الجزء نود أن ننوه على أن نموذج العملة افترض أن العملات جميعها متطابقة ولكنها مميزة (بتاريخ، أو لون .....). إن نموذج العملة هذا يشبه في الديناميكا الحرارية الجسيمات بشبكة البلورة، حيث أن أماكنهم تميزهم. ولكن هذا لا ينطبق على جسيمات أو جزيئات الغاز، حيث أنهم متشابهين ولكن غير مميزين، وبالتالي فإن عدد الحالات المجهرية سوف تصبح أقل. وسوف نقوم بدراسة هذه الحالة بالأبواب القادمة.

II- العالم المجهري وميكانيكا الكم
(Quantum mechanics and the microscopic world)

العالم المجهري هو عالم ملئ بالألغاز. وقد تم التعرف على الكثير من خواصه وصفاته من خلال التجارب المعملية. ولشرح خواصه فهو يحتاج منا الكثير من المعلومات التفصيلية والمرتبطة بأفرع كثيرة في الفيزياء. لكننا هنا، ولمحاولة الإيضاح، سوف نستعيد، وباختصار،

معلوماتنا الأساسية عن واحد من أهم فروع الفيزياء ألا وهو ميكانيكا الكم. من خلال مناقشتنا لهذا الفرع سوف تتضح بعض من خواص العالم المجهري.

i- **تكميم الشحنة:** تعتبر شحنة الإليكترون ($|e| = 1.6\times10^{-19}$ C) هي أقل شحنة يمكن أن تقاس. والشحنة على أي مستوى عيني ما هو إلا أعداد صحيحة من شحنة الإليكترون.

ii- **المظهر ألجسيمي للطاقة:** افترض العالم بلانك أن الإشعاع، ذو التردد ν، يمكنه أن يتبادل الطاقة مع المادة بوحدات صحيحة من القيمة $h\nu$، حيث h هو ثابت بلانك. وبأسلوب أخر، أن الإشعاع ذو التردد ν يتصرف كأنه جسيم، يدعي فوتون، وله الطاقة:

$$E = h\nu \qquad (1)$$

وكمية حركته الخطية هي:

$$p = \frac{E}{c} \qquad (2)$$

حيث c هي سرعة الضوء.

دعونا أيضاً أن نستخدم التردد الزاوي للإشعاع ω بالصورة:

$$\omega = 2\pi\nu = 2\pi\frac{c}{\lambda} = kc \qquad (3)$$

حيث k هو العدد ألموجي. وباستخدام المعادلات (1) و(2) و(3) لحذف c نجد:

$$E = \hbar\omega \qquad (4)$$

و

$$p = \hbar k \qquad (5)$$

حيث $\hbar = \frac{h}{2\pi}$.

بالتالي فإن المعادلتان (4) و(5) تربطان بين الخواص الجسيمية (E, p) وخواصه الموجية المرتبطة به (ω, k).

iii– **ازدواجية الجسيم والموجه:** كما نعلم أن الطبيعة تعشق التماثل، لذلك إذا أصبح للإشعاع طبيعة جسيميه، فإن الجسيم أيضاً سوف يصبح له طبيعة موجيه. وقد توقع دي- برولى أن المعادلتان (4) و(5) يطبقان أيضاً علي جسيمات المادة، مثل الإلكترون. وتصبح حركة الجسيم مصاحبه لها موجه بالشكل:

$$\psi \approx e^{-i\omega t - kx} \qquad (6)$$

حيث $\omega = E/\hbar$ و $k = p/\hbar$. وقد تم التأكد من الصفات الموجية للجسيمات من خلال تجارب العلماء دافيسون- جيرمر وأيضاً تومسون. وقد اقترح دي- برولى أن الجسيم الذي يتحرك بسرعة v يمكن التعامل معه كموجة ترددها هو $\nu = \frac{mc^2}{h}$ وطولها الموجي:

$$\lambda = \frac{h}{p} = \frac{h}{m\mathrm{v}} \qquad (7)$$

iv– مبدأ بور التتمم: ينص هذا المبدأ على أن *سلوك الطاقة الكهرومغناطيسية الإزدواجي هو* نتمم *لبعضه البعض*" وهذا معناه ببساطة أن أي قياسات معملية تستخدم الطاقة الكهرومغناطيسية بالإضافة إلى تفسيرها بنموذج واحد فقط لا غير وهو أن الطاقة الكهرومغناطيسية إما جسيمات أو موجات ولكن الاثنين معاً. هذا المبدأ أيضاً أدي إلى فهم ازدواجية الجسيم والموجة. فعندما تظهر أدلة الصفة والتجربة المعملية فإن الصفة الأخرى تتعتم. كمثال على ذلك، إذا أظهرت الصفة الموجية لإلكترون، كالحيود مثلاً، فلن تظهر صفته الجسيمية، ولكن إذا انحرف إلكترون في مساره، نظراً لتواجد مجال كهربي خارجي كمثال، فإن الصفة الموجية [illegible]

v– مبدأ الشك (عدم اليقين): في الميكانيكا الكلاسيكية تم افتراض أن المكان (ولنقل x) وكمية الحركة الخطية المرافقة لها (ولنقل p_x) يمكن تحديدهما بدقة متناهية في آن واحد. ولكن وجد هيزنبرج أن ذلك غير ممكن في ميكانيكا الكم عند التعامل مع الجسيمات المجهرية، ولا دخل لكفاءة أجهزة القياس في هذه الفرضية. وقد اشتق بعض المتباينات ومنها:

$$\Delta x \Delta p_x \geq h \qquad (8)$$

وتبين هذه المعادلة قاعدة عدم التحديد لهيزنبرج، وتنص على أنه *"من المستحيل قياس كميتين مترافقتين قانونا (مثل x و p_x) بدقة متناهية في آنٍ واحد"*. بمعنى آخر أنه كلما ازداد التحديد (الدقة) في قياس موضع الجسيم (مثلاً Δx تكون كمية صغيرة) كلما ازداد عدم التحديد (عدم الدقة) في قياس كمية الحركة الخطية المرافقة (Δp_x تكون كمية كبيرة) وحاصل ضربهما يعطى بالمعادلة (8). إن أهمية هذا المبدأ ظهرت آثارة الإيجابية في بعض المسائل المهمة ومنها إثبات عدم احتمالية وجود الإلكترون بالنواة.

vi– **الفراغ الطوري** (Phase space): إذا افترضنا جسيم يتحرك في اتجاه واحد، دعونا نعتبره في اتجاه المحور x، فإن الحالة الحركية له عند أي زمن تتحدد بموقعة x وسرعته v_x. ومن الملائم هنا أن نستبدل سرعة الجسيم v_x بكمية حركته الخطية $p_x = m\,\mathrm{v}_x$. ومع تعيين الزمن فإن الجسيم سوف يرسم مساراً في المستوى $(\mathrm{x}-p_x)$. حالة الجسيم في هذا المستوى تسمي طور (Phase)، وأي نقطة علي المسار تسمي نقطة طوريه (Phase point)، والمسار يسمي مسار طوري، والمستوى المفترض، ذو المحورين، يسمي فراغ طوري. وهذه التعريفات سوف توضح بالمثال التالي.

مثال: عين المسار الطوري للمتذبذب الخطي.

الحل: لنفترض أن كتلة المتذبذب هي m وثابت القوة هو k. من هنا نجد أن الطاقة الكلية للجسيم المتذبذب "E" تعطي بالعلاقة:

$$E = \frac{1}{2}m\,\mathrm{v}_x^2 + \frac{1}{2}kx^2 = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2}kx^2$$

لذلك

$$\frac{p_x^2}{2mE} + \frac{x^2}{2E/k} = 1 \qquad (9)$$

وحيث أن E هي قيمة ثابتة، فإن القيم $2mE$ و $2E/k$ هم أيضاً قيم ثابتة. ومن هنا نجد أن المحل الهندسي المعبر عن نقط ألطور للمتذبذب يمثل بمسار بيضاوي (Ellipse) في فضاء الطور $(\mathrm{x}-p_x)$ كما بالشكل (4)، حيث القيمة $\sqrt{2E/k}$ تمثل نصف المحور الأكبر

(Semi-major axis) و القيمة $\sqrt{2mE}$ تمثل نصف المحور الأصغر (Semi-minor axis).



شكل (4) المسار الطوري للمتذبذب الخطي

والشكل (4) يوضح أن أي نقطة علي المسار البيضاوي يمثل الطور عند نفس الزمن. وبتأرجح المتذبذب جيئةً وذهاباً بصفة دورية، نجد أن نفس المكان وكمية الحركة تتكرر بصفة دورية أيضاً. بالتالي نقاط الطور التي توصف بالمسار البيضاوي تتكرر بصفة دورية وتكون مسار مغلق (Closed path)، ولكن هذه المسارات لا تتقاطع.

ولنا هنا سؤال: لماذا نقترح هذا الفراغ التجريدي؟ السبب يرجع هنا لأننا سوف نقوم بحساب عدد المستويات المجهرية، وهذه مرتبطة بحجم المستويات المجهرية والتي تتبع مبدأ الشك لهيزنبرج.لذلك دعونا نتكلم عن حركة جسيم في الفراغ والتي تتطلب الآن ثلاثة إحداثيات مكانية (x,y,z) بالإضافة إلى ثلاثة إحداثيات أخري لكمية الحركة الخطية وهي (p_x,p_y,p_z). مع وجود العلاقات المماثلة في اتجاهي (y,z) وهما:

$$\left.\begin{aligned}\Delta y\,\Delta p_y &\geq h\\ \Delta z\,\Delta p_z &\geq h\end{aligned}\right\} \qquad (10)$$

وبضم المعادلات (8) و (10) واستخدام علامة = بدلاً من ≥، نجد أن:

$$\Delta x\,\Delta y\,\Delta z\,\Delta p_x\Delta p_y\Delta p_z = h^3 \qquad (11)$$

فعلى ماذا تدل المعادلة (11) فيزيائياً؟ تدل علي أنه إذا أردنا تحديد المكان وكمية الحركة الخطية لأي جسيم، فإن أفضل تحديد هو أن تكون الإحداثيات محتوية من خلال إحداثيات ستة لصندوق كمي أو مستوى كمي بحجم h^3.



شكل (5) شكل الفراغ الطوري

ولتوضيح ذلك، دعونا هنا للتبسيط أن نفترض أن الجسيم يتحرك بإتجاة المحور -X. وسوف نفترض أيضاً أن الجسيم يتحرك بين النقطتين ذو الإحداثيات $x \equiv (0,x_o)$ و $p_x \equiv (0,p_o)$، كما بالشكل (5). ولفراغ ثنائي الأبعاد فإن عدد المستويات المسموح بها للجسيم تحسب من العلاقة:

$$n = \frac{\text{total area}}{\Delta x\,\Delta p_x} = \frac{x_o p_o}{h} \qquad (12)$$

ولفراغ سداسي الأبعاد، نجد أن:

$$n = \frac{\text{total 6-dimesional volume}}{\Delta x\,\Delta y\,\Delta z\,\Delta p_x\Delta p_y\Delta p_z} = \frac{V_r V_p}{h^3} \qquad (13)$$

حيث V_r هو الحجم في الفراغ الكارتيزي، V_p هو الحجم في فراغ كمية الحركة. وعدد المستويات الكمية المسموح بها للجسيم لعنصر الحجم في فراغ سداسي الأبعاد هو:

$$n = \frac{dx\,dy\,dz\,dp_x\,dp_y\,dp_z}{h^3} = \frac{d^3r\,d^3p}{h^3} \qquad (14)$$

ومن هنا نستطيع القول: أن عدد المستويات المسموح بها للجسيم خلال مسافة معينة، بأي إحداثيات طوريه، تتناسب مع هذه المسافة. بمعني أنه إذا كانت q هي الإحداثيات ألطوريه فإن

$$n \propto q$$

مثال: احسب عدد المستويات الكمية المسموح بها للحالات التالية:

1- جسيم يتحرك في بعد واحد ويحتوي في مسافة طولها 10^5 m ولـه كميـة الحركـة الخطية بين القيمتين 10^{-28} kg s^{-1} و -10^{-28} kg s^{-1} .

2- بروتون بداخل النواة (نصف قطرها 10^{-14} m) وكمية حركته الخطية لا تزيد عن 10^{-22} kg s^{-1}.

الحل:

1- من المعادلة (12) نجد أن:

$$n=\frac{x_o p_o}{h}=\frac{(10^5\ \text{m})(2\times10^{-28}\ \text{kg s}^{-1})}{(6.626\times10^{-34}\ \text{J s}^{-1})}=3000$$

2- من المعادلة (13) نجد أن:

$$n=\frac{V_r V_p}{h^3}=\frac{\left(\frac{4}{3}\pi^2(10^{-14}\ \text{m})^3\right)\left(\frac{4}{3}\pi^2(10^{-22}\ \text{kg s}^{-1})^3\right)}{(6.626\times10^{-34}\ \text{J s}^{-1})^3}=600$$

vii- تكميم الطاقة: عالم ميكانيكا الكم هو عالم يتصف بأن مستويات الطاقة للنظام تكون منفصلة وليست متصلة، ماعدا الجسيمات الحرة فطاقتها تأخذ شكل الطيف المستمر. هذه الصفة الكمية ناتجة من وجود الجسيمات بوعاء ذو حجم ثابت. وفي ميكانيكا الكم سوف نتعامل مع منسوب للطاقة (Energy level) وكل منسوب له واحد أو أكثر من المدارات (Orbits)، وكل مدار له عدد من مستويات الطاقة (Quantum states) توصف بدالة موجيه ψ. هذه الدالة الموجية تعرف بإحداثيات مكانية وزمنية، مع تعريف الاحتمالية بأنها كمية ثابتة لا تعتمد على الزمن. إذا كان لمنسوب الطاقة الواحد أكثر من مستوى للطاقة فإن هذه المستويات تسمي مستويات منتمية (Degenerate states). مستوى الطاقة المرتبط بأقل منسوب يسمي المستوى الأرضي (Ground state) والمستويات المرتبط بطاقات أعلي تسمي مستويات مثارة (Excited states). ومنسوب الطاقة نستطيع تشبيهها بأرفف المكتبة ذات الارتفاعات المختلفة ومستويات الطاقة ما هي إلا الصناديق التي توضع علي كل رف. ولكل منسوب

طاقة ε_i، سوف نحدده بالطاقة ε_i، ونحدد عدد مستوياته المختلفة والتي تنتمي للطاقة ε_i بالرمز g_i (و g_i سوف تسمي درجة الانتماء).

ومثال توضيحي دعونا نسترجع المسألة الرئيسية في ميكانيكا الكم ألا وهي دراسة حركة جسيم في مجال جهد يوصف بالتالي (انظر شكل 6):

$$V(x)=\begin{cases}0, & 0\le x\le L\\ \infty, & \text{otherwise}\end{cases} \qquad (1)$$

وهذا المثال ينطبق عمليا علي حركة إليكترون حر بداخل قطعة معدنية، لها طاقة توتر سطحي تفوق الطاقة الحركية للإليكترون، وبالتالي فإن الإليكترون يتحرك داخل المعدن ولا يتمكن مـن الهروب منه، إلا بإعطائه طاقة خارجية. ولحل هذه المسألة نلاحظ مـن شـكل (6) أن حركـة الجسيم حرة ولكنها مقيدة في المدى $0\le x\le L$ حيث أن الجهد $V=\infty$ خارج هذا المدى هو المسئول عن انعكاس الجسيم من الحائط



شكل(6) جسيم داخل صندوق (ذو بعدين)

والطريقة المثلى لحل هذه النوعية من المسائل هو اتباع التالى:

أولاً: كتابة معادلة شرودنجر في المنطقة التي يمكن أن يتواجد فيها الجسيم. من الشكل (6) نجد أن الجسيم يتواجد في المنطقة (I) فقط، ولذلك فإن معادلة شرودنجر تأخذ الصورة:

$$\left.\begin{aligned}-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2\psi_I}{dx^2}=E\psi_I \Rightarrow\\ \frac{d^2\psi_I}{dx^2}=-k^2\psi_I,\end{aligned}\right\} \qquad (2)$$

حيث $k^2=\frac{2mE}{\hbar^2}$ و m هو كتلة الجسيم و E هي الطاقة الكلية. المنطقتان $(II),(III)$ غير مسموح للجسيم بالانتقال أو بالتواجد فيهما نتيجة الجهد $V=\infty$ بالتالي فإن دالة الموجة تتلاشى عند $x=0$ و $x=L$، بمعنى أن:

$$\psi_{II}(x=0)=\psi_{III}(x=a)=0 .$$

ثانياً: نقترح حلاً للمعادلة (المعادلات) المعطاة في الفقرة الأولى. نلاحظ هنا أن المعادلة (2) تمثل معادلة حركة توافقية بسيطة وحلها إما:

$$\psi_I(x)=A\sin(kx)+B\cos(kx) \qquad (3)$$

أو

$$\psi_I(x)=a\,e^{ikx}+b\,e^{-ikx} \qquad (4)$$

حيث $i=\sqrt{-1}$ و a,b,A,B ثوابت عيارية و تعين بواسطة الشروط الحدودية أو الشروط العيارية.

ثالثاً: اختر أحد الحلول ولتكن (3)

رابعاً: استخدم الشروط الحدودية للتخلص من الثوابت العيارية الغير منطقية. مثلاً

$$\psi_I(0)=0 \quad\Rightarrow\quad B=0 \qquad (5)$$

وتصبح الدالة المميزة هي:

$$\psi_I(x)=A\sin(kx) \qquad (6)$$

خامساً: هنا نبدأ في حساب الثوابت A,k

أ- لحساب الثابت A استخدم شرط العيارية كالتالي:

$$\left.\begin{aligned}&\because \int_0^L|\psi_I|^2\,dx=1\\ &\therefore A^2\int_0^L\sin^2(kx)dx=1\end{aligned}\right\}\Rightarrow A=\sqrt{2/L} \qquad (7)$$

ب- لحساب الثابت k استخدم الشرط الحدي الثاني، بمعنى:

$$\left.\begin{aligned}&\because \psi_I(L)=0\\ &\therefore A\sin(kL)=0\end{aligned}\right\}\Rightarrow k_n=\frac{n\pi}{L},\qquad n=1,2,3,\cdots \qquad (8)$$

حيث n يعرف بأنه العدد الكمي. وتصبح الدالة المميزة على الصورة:

$$\psi_I(x)=\sqrt{\frac{2}{L}}\sin(\frac{n\pi}{L}x),\qquad n=1,2,3,\cdots \qquad (9)$$

ملاحظات:

1- بمعلومية k_n نستطيع أن نحسب الطاقة الكلية E_n وهي:

$$E_n=\frac{p^2}{2m}=\frac{(\hbar k_n)^2}{2m}=\frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}n^2=E_o n^2,\qquad n=1,2,3,\cdots \qquad (10)$$

وهي قيم مكماة (ليست متصلة).

2- القيمة $n=0$ أهملت لأنها تعطى حلاً صفرياً للطاقة ومعناه أن الجسيم لا يتحرك وأيضاً $\psi_I(x)=0$ (وهو حل غير فيزيائي لأننا نعرف أن الجسيم موجود ولهُ طاقة حركة).

3- القيم السالبة تعطى نمطاً متماثلاً للقيم الموجبة.

4- المسافة بين مستويات الطاقة تزداد مع زيادة n. (انظر الشكل $7-a$)

5- قيم الطاقة تتناسب مع n^2.

6- عند حساب متوسط الإزاحة $< x >$ نجد أن:

$$\langle x \rangle = \int_0^L x\,|\psi_1|^2\,dx = \frac{2}{L}\int_0^L x\,\sin^2(k_n x)dx = \frac{2}{L}\left(\frac{L^2}{4}\right) = \frac{L}{2} \qquad (11)$$

ويفسر هذا فيزيائياً بأن كثافة الاحتمال (و أيضاً الدالة) متماثلتان حول مركز الصندوق، عند $\frac{L}{2}$، ولهذا فإن احتمالية وجود الجسيم في النصف الأيمن يكون مساوياً لاحتمالية وجودة في النصف الأيسر. (انظر الشكل $7-b$)



(a)



(b)

شكل (7) لجهد الشكل (6) a- الطاقات المسموح بها b- الدوال المسموح بها

7- متوسط كمية الحركة الخطية $\langle \hat{p} \rangle$ تحسب كالتالي:

$$\langle \hat{p} \rangle = \int_0^L \psi_1^* \hat{p}\,\psi_1\,dx = \frac{2}{L}\int_0^L \sin(k_n x)\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\sin(k_n x)\right)dx = 0 \qquad (12)$$

ويفسر هذا فيزيائياً بأن كمية الحركة الخطية المتوسطة $\langle p \rangle = 0$ لا تعنى أن الجسيمات لا تتحرك ولكن تعنى أن عدد الأجسام التي تتحرك للشمال يكون مساوياً لعدد الأجسام التي تتحرك لليمين. وتذكر أن كمية الحركة الخطية هي كمية متجهة وليست قياسية.

من السهل أن نعمم هذا الحل على جسيم يتحرك بداخل صندوق ذو ثلاثة أبعاد (L_x, L_y, L_z)، ومنها نجد أن الطاقة:

(13)

$$\varepsilon_j = \frac{\hbar^2\pi^2}{2m}\left(\frac{n_x^2}{L_x^2}+\frac{n_y^2}{L_y^2}+\frac{n_z^2}{L_z^2}\right), \qquad (n_x, n_y, n_z) = 1,2,3,\cdots$$

حيث تم تعريف أي مستوى طاقة بواسطة الأعداد الكمية (n_x, n_y, n_z). أذا وضعنا الأطوال $L_x = L_y = L_z = L$، فإن

$$\varepsilon_j = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}\left(n_x^2+n_y^2+n_z^2\right) = \frac{\hbar^2\pi^2}{2mL^2}n_j^2 \qquad (14)$$

حيث n_j هو العدد الكمي الكلي (Total quantum number) لمنسوب الطاقة ε_j. بالتالي فإن منسوب الطاقة يعتمد فقط على قيمة n_j^2 العددية ولا يعتمد علي القيمة العددية لكل من (n_x, n_y, n_z) على حده. ومن المعادلة (14) نستطيع أن نُعرف درجة الانتماء (أو التعددية) "g_j" بأنها عدد الدوال التي لها نفس الطاقة. هذا الانتماء ناتج من تماثل أطوال المكعب ويزول تماماً بتغير أطوال الصندوق. والجدول التالي يصف درجات الانتماء الخاصة بالمكعب.

Level	المستوى	(n_x, n_y, n_z)	n_j^2	g_j
$j=1$	المستوى الأرضي	$(1,1,1)$	3	1
$j=2$	المستوى المثار الأول	$(1,1,2),(1,2,1),(2,1,1)$	6	3
$j=3$	المستوى المثار الثاني	$(1,2,2),(2,2,1),(2,1,2)$	9	3
$j=4$	المستوى المثار الثالث	$(2,2,2)$	12	1
$j=5$	المستوى المثار الرابع	$(1,2,3),(3,2,1),(2,3,1)$ $(1,3,2),(2,1,3),(3,1,2)$	14	1

نعلم أن حجم المكعب هو $V = L^3$، ومنه $L^2 = V^{2/3}$، بالتالي

$$\varepsilon_j = n_j^2 \frac{\pi^2\hbar^2}{2m} V^{-2/3} \qquad (15)$$

هذه النتيجة تطبق علي أي وعاء له أبعاد اكبر من طول دي- برولي الموجي وهو $\lambda = \frac{2\pi\hbar}{p}$. وكما هو ملاحظ من المعادلة (15) وشكل (8) فإنه مع زيادة حجم الوعاء نجد أن طاقة المنسوب j تقل وتتزاحم.



شكل(8) تأثير تغير حجم الصندوق علي القيم المميزة لطاقة الجسيم بداخله.

مثال: لحجم $10^{-3}\ \mathrm{m}^3$ من غاز الهيليوم عند درجة حرارة الغرفة، احسب n_j. مع العلم أن كتلة ذرة الهيليوم هي $m_{He} = 6.65\times10^{-27}\ \mathrm{kg}$

الحل: عند درجة حرارة الغرفة نجد أن متوسط طاقة الحركة لذرات غاز الهيليوم عند استخدام القانون الأول والناتج من نظرية توزيع الطاقة بالتساوي علي درجات الحرية نحصل على:

$$\varepsilon_j = \frac{3}{2}k_B T = \frac{3}{2}\left(1.38\times10^{-23}\right)(293)$$

$$= 6.06\times10^{-21}\ \mathrm{J} \approx 3.0\times10^{-2}\ \mathrm{eV}$$

ومن القانون الثاني $\varepsilon_j = n_j^2 \frac{\pi^2\hbar^2}{2m} V^{-2/3}$ نجد أن:

$$\frac{\pi^2\hbar^2}{2m} V^{-2/3} = \frac{\pi^2(1.054\times10^{-34})^2}{2(6.65\times10^{-27})}(10^{-3}\ \mathrm{m}^3)^{-2/3}$$

$$= 8.24\times10^{-40}\ \mathrm{J} \approx 5\times10^{-21}\ \mathrm{eV}.$$

ولذلك

$$n_j = \left(\frac{3.0\times10^{-2}}{5\times10^{-21}}\right)^{1/2} \approx 10^9$$

وهذا يعني أن الغالبية العظمى من جزيئات الغاز عند درجة حرارة الغرفة تستقر بالمستويات المثارة العليا وذات الطاقة المرتفعة. وعند القيم العليا للعدد الكمي n_j نجد أن مستويات الطاقة متقاربة جداً بحيث انه لو تغير n_j بمقدار الوحدة $\left(\Delta n_j = 1\right)$ فإن التغير بالطاقة $\left(\Delta\varepsilon_j\right)$ يكون صغيراً جداً. ومن هنا نستطيع أن نتعامل مع الطيف المنفصل للطاقة على أنة طيف مستمر، ومنه نستطيع أن نستبدل التجميع $(\sum)$ على المستويات بالتكامل $(\int)$. وهذا هو موضوع الفصل التالي.

III- كثافة المستويات (Density of states)

تحت الشرط: أن الأعداد الكمية n_j كبيرة ومستويات الطاقة ε_j قريبة من بعضها جداً. نستطيع أن نتعامل مع الأعداد n و الطاقات ε علي أنها تكون دوال متصلة وليست كميات من القيم المنفصلة. ونحن هنا اهتمامنا سوف ينصب على إيجاد كثافة المستويات $g(\varepsilon)$ لما لها من أهمية لحساب التوزيع الإحصائي بالأبواب التالية.

ولحساب كثافة المستويات دعونا نفترض، كما بالشكل (7)، أن الأعداد $\left(n_x, n_y, n_z\right)$ يمكن تمثيلها بإحداثيات متعامدة. لذلك فإننا نستطيع أن نعرف الكمية $n^2 = n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$ بأنها تمثل عدد النقاط ذو الإحداثيات الصحيحة والموجبة، حيث $\left(n_x, n_y, n_z\right)$ هي أعداد صحيحة موجبة، وتقع علي سطح كرة نصف قطرها n وتصاحب مستويات من الطاقة مختلفة تعطي بالمعادلة



شكل (7) قشرة ذو سُمك dn لجزء مقداره $\frac{1}{8}$ لكرة نصف قطرها n للإحداثيات الصحيحة والموجبة (n_x, n_y, n_z).

$$\varepsilon = \frac{\pi^2 \hbar^2}{2mV^{2/3}} n^2 \qquad (1)$$

ولإيجاد عدد المستويات $n(\varepsilon)$ التي تتراوح طاقاتها من الصفر إلى ε، يجب أن نوجد الحجم المساوي لحجم $\frac{1}{8}$ من الحجم الكلي للكرة. لذلك نجد أن:

$$n(\varepsilon) = \frac{1}{8}\left(\frac{4}{3}\pi n^3\right) = \frac{\pi}{6} V \left(\frac{8m}{h^2}\right)^{3/2} \varepsilon^{3/2}, \qquad (2)$$

وعدد المستويات المحصورة بين قيمتي الطاقة ε و $\varepsilon + d\varepsilon$ تأتي من تفاضل المعادلة الأخيرة، لتصبح:

$$dn(\varepsilon) = \frac{4\pi V \left(2m^3\right)^{1/2}}{h^3} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon. \qquad (3)$$

وسوف نتعامل مع كثافة المستويات وهي:

$$g(\varepsilon) = \frac{dN(\varepsilon)}{d\varepsilon} = 4\pi V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \varepsilon^{1/2} = G_s V \varepsilon^{1/2} \qquad (4)$$

والتي تمثل عدد المستويات لوحدة الطاقة والتي لها نفس الطاقة ε، حيث عرفنا الثابت $G_s = 4\pi\left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}$.

المعادلة (4) ليست هي النتيجة المرجوة. فهذه المعادلة تأخذ في الاعتبار الحركة الانتقالية فقط للجسيم. ولكن في ميكانيكا الكم توجد للجسيم حركة مغزلية ذاتية " S"، وهذه يجب أن تأخذ في الاعتبار بضرب المعادلة الأخيرة بقيمة التعددية $g_s = (2S+1)$. و g_s ترمز أيضاً لبعض المعاملات الأخرى والتي يجب أن تأخذ في الاعتبار، مثل الاستقطاب في الموجات الكهرومغناطيسية والمرنة، وسوف نتكلم عنها في مكانها الخاص.

ومن المفيد أحيانا أن نعبر عن $g(\varepsilon)$، بالمعادلة (4)، بدلالة كمية الحركة الخطية $p = \sqrt{2m\varepsilon}$ بحيث:

$$g(p) = g(\varepsilon)\frac{d\varepsilon}{dp} = \frac{4\pi V}{h^3} p^2 \qquad (5)$$

وتعرف $g(p)$ بأنها عدد المستويات لوحدة كمية الحركة الخطية المحصورة بين قيمتي كمية الحركة الخطية p و $p+dp$ والتي لها نفس كمية الحركة الخطية.

وبدلالة التردد $\nu = \frac{c}{\lambda} = \frac{hc}{p}$ نستطيع أن نحسب:

$$g(\nu) = g(p)\frac{dp}{d\nu} = \frac{4\pi V}{c^3} \nu^2 \qquad (6)$$

وتعرف $g(\nu)$ بأنها عدد المستويات لوحدة التردد المحصورة بين قيمتي التردد ν و $\nu + d\nu$ والتي لها نفس التردد.

IV- ملحق (3.A) الجسيمات المتطابقة والغير مميزة

(Identical and Indistinguishable Particles)

سوف نتعرض هنا للأنظمة الفيزيائية التي تحتوي علي جسيمين متطابقين أو أكثر. والجسيمات المتطابقة تعني هنا الجسيمات التي تمتلك نفس الخواص الفيزيائية (كتلة، شحنة، ...) وبالتالي فنحن لا نستطيع أن نميز بينهم بواسطة أي قياسات معملية، أو حتي ترقيمهم، كما يحدث في الفيزياء الكلاسيكية. إن مبدأ عدم التمييز (Priciple of indistinguishability) يخص جميع الجسيمات غير العينية (المجهرية) مثل الإلكترون والبروتون والنيترون والفوتون.

لتوضيح الصورة، دعونا نأخذ نظام يتكون من جسيمين منفصلين (مثلاً إلكترونان)، وسنفترض أنهما يأخذان الترقيم (1) و(2)، بصندوق أحادي الأبعاد بطول L، مع إهمال الحركة المغزلية. الهملتونيان لهذا النظام يعرف كالتالي:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m}\left[\nabla^2(1)+\nabla^2(2)\right] \qquad (1)$$

من الواضح أن الهاملتونيان متماثل للجسيمين، بمعني أننا لو بدلنا الترقيم (1) و (2) فإن الهملتونيان لن يتغير. ونعلم أن معادلة شرودنجر:

$$\hat{H}\psi = E\psi$$

بالإمكان حلها بفصل المتغيرات للجسيمين لنحصل علي الدوال المميزة:

$$\psi_a(1) = A\sin\frac{n_a\pi x}{L} \qquad (2)$$

$$\psi_b(2) = A\sin\frac{n_b\pi x}{L} \qquad (3)$$

وسوف نفترض أن أحد الجسيمين بالمستوى a والأخر بالمستوى b. والحل المقبول رياضياً للجسيمين يوضع بالشكل:

$$\psi = \psi_a(1)\psi_b(2) \qquad (4)$$

ولسأل أنفسنا! هل الدالة ψ مقبولة فيزيائياً؟ والإجابة بالطبع لا! لأننا افترضنا مسبقاً أننا قد ميزنا الجسيمين وتأكدنا أن الجسيم الأول بالمستوى الأول a، والجسيم الثاني بالمستوى

الثاني b. ونحن نعلم تماماً أن هذا الافتراض غير صحيح ولا نستطيع تأكيده والتحقق منه عملياً. عملياً نستطيع أن نؤكد فقط أن هناك جسيم بالمستوى الأول وجسيم أخر بالمستوى الثاني، ولا أكثر من ذلك، كما بالشكل التالي.



يوجد هنا طريقة مباشرة لتكوين دالة موجية، تأخذ في الاعتبار قصورنا على عدم التمييز (Indistinguishability) بين الجسيمات، وخطواتها كالتالي:

1- بالأخذ في الاعتبار أن الهملتونيان (1) متماثل للجسيمين، بالتالي فإن الدالة:

$$\psi = \psi_b(1)\psi_a(2) \qquad (5)$$

هي أيضاً تحقق الهملتونيان $\hat{H}$.

2- أي تجميع خطي للدوال (4) و(5) سوف يحقق أيضاً الهملتونيان (1). علي سبيل المثال يوجد تجمعين مهمين وهما:

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(1)\psi_b(2)+\psi_b(1)\psi_a(2)\right] \qquad (6)$$

$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(1)\psi_b(2)-\psi_b(1)\psi_a(2)\right] \qquad (7)$$

لو بدلنا الترقيم (1) و (2) بالدالة ψ_+ نجد أنها لاتتغير، بمعني أن:

$$\hat{P}(1,2)\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\left[\psi_a(2)\psi_b(1)+\psi_b(2)\psi_a(1)\right] = \psi_+ \qquad (8)$$

وقد استخدمنا بالمعادلة (6) المؤثر التبادلي $\hat{P}(1,2)$ الخاص بتبديل الترقيم (1) و (2). لذلك يقال عن الدالة ψ_+ بأنها تجميع خطي متماثل (symmetrical linear combination). لو أبدلنا الترقيم (1) و (2) بالدالة ψ_- بالمعادلة (7) نجد أنها تتغير في الإشارة، بمعني أن:

$$\hat{P}(1,2)\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}[\psi_a(2)\psi_b(1) - \psi_b(2)\psi_a(1)] = -\psi_- \qquad (9)$$

لذلك يقال عن المعادلة (7) بأنها تجميع خطي (Linear combination) مضاد التماثل (Antisymmetrical). المعادلتان (6) و (7) تدلان على حقيقة مؤكدة وهي أنه يوجد جسيم بالمستوى a وجسيم بالمستوى b. وبالرغم من هذه الحقيقة المؤكدة فإننا لا نستطيع التكهن من يوجد بالمستوى a، أو بالمستوى b، هل هو الجسيم (1)؟ أم الجسيم (2)؟ يتضح من هذا المثال أن مبدأ عدم التمييز أرغمنا على أن تصبح الدالة الكلية للجسيمات المتعددة إما متماثلة أو مضادة للتماثل. وحيث أن معظم الدوال ليست بالمتماثلة ولا بالمضادة للتماثل، كما سنري لاحقاً، لذلك فإن مبدأ عدم التمييز سوف يضع القيود علي شكل الدوال المستخدمة.

صفة التماثل هنا تعكس خاصية مهمة جداً وهي أن طاقة النظام المصاحب للدالة ψ_+ لايمكن أن يكون كطاقة النظام المصاحب للدالة ψ_-، فكيف يحدث هذا؟ نلاحظ أنه في حالة تقارب (تلاصق) الجسيم (1) و الجسيم (2)، فإن الحدان المكونان للدالة ψ_- يكونان متساويان (تقريباً)، وبالتالي فإن الدالة ψ_- تصبح صغيرة جداً أو تؤول للصفر. ولهذا فإن الدالة ψ_- تصف حالة لا يمكن أن يكون فيها الجسيمان متقاربان، ونتيجةً لهذا، فإنه يوجد طاقة تنافر (صغيرة في المتوسط) بين الجسيمين. العكس هنا مع الدالة المتماثلة ψ_+، حيث لا تستبعد احتمالية وجود الجسيمين قريبين جدا من بعضهما البعض، لوقت محدد. نتيجةً لذلك، فإن طاقة التنافر للدالة ψ_- تصبح أكبر من طاقة تنافر الدالة ψ_+. هذا بالطبع ينطبق علي الحركة المغزلية للجسيمات.

ومن الملاحظات العملية لأطياف الذرات والجزيئات تم استنباط مبدأ باولي للاستبعاد (Pauli exclusion principle) والذي ينص ببساطة على أنه:
"لا يمكن أن تتشابه الأعداد الكمية الأربعة (n,l,s,m_s) لإلكترونين أو أكثر في ذرة واحدة".
والأعداد الكمية المعرفة هنا هي:

1- العدد الكمي الرئيسي (n): وهو الذي يحدد المنسوب الذي يوجد به الإلكترون في الذرة وأيضاً يحدد طاقة المستوى وبُعدهُ عن النواة.

2- العدد الكمي المداري (l): ومنه نحدد قيم المدارات الفرعية في المنسوب الأساسي (n). l تأخذ القيم من 0 إلى $n-1$.

3- العدد الكمي المداري المغناطيسي (m_l): ويحدد اتجاهات المدارات في الفراغ للعدد الكمي المداري (l) وعدد اتجاهات m_l يحدد بالعلاقة $m_l = 2l+1$

4- العدد الكمي المغزلي المغناطيسي (m_s):ويحدد اتجاهات المدارات في الفراغ للعدد الكمي المغزلي (s) وعدد اتجاهات m_s يحدد بالعلاقة $m_s = 2s+1$

وهناك أعداد كمية أخري سوف نذكرها بمكانها.

وقد تم وضع مبدأ باولي للاستبعاد بصورة أخري وهي:

1- الدالة الكلية (بما فيها الدالة المغزلية) يجب أن تكون مضادة التماثل عند تبديل إحداثيات أي زوج من جسيمات فيرمي (الفيرميون Fermions). وجسيمات الفيرميون هي التي لها عدد مغزلي "s" يتكون من أنصاف أعداد صحيحة فردية للقيمة $\hbar$، مثل الإلكترون والبروتون والنيوترون.

2- الدالة الكلية (بما فيها الدالة المغزلية) يجب أن تكون متماثلة عند تبديل إحداثيات أي زوج من جسيمات بوز-اينشتاين (بوزون Bosons). وجسيمات البوزون هي التي لها عدد مغزلي "s" يتكون من أعداد صحيحة للقيمة $\hbar$، مثل الفوتون والديوترون، وجسيمات α.

ولقد لعبت خواص التماثل للدالة الكلية دوراً أساسياً لتطوير ميكانيكا الكم الإحصائية. وسوف نناقش هذه الخواص بشيء من التفصيل لاحقاً.

مثال: استعرض جميع الدوال الكلية الممكنة للمستوى الأرضي لذرة الهليوم.

الحل: نعلم أن المستوى الأرضي لذرة الهليوم يتكون من إلكترونين بالمدار 1s، ولذلك فإن الدوال الأربعة الممكنة للمستوى الأرضي لذرة الهليوم هم:

$$\psi_1 = \psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\alpha(1)\alpha(2)$$
$$\psi_2 = \psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\alpha(1)\beta(2)$$
$$\psi_3 = \psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\beta(1)\alpha(2)$$
$$\psi_4 = \psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\beta(1)\beta(2)$$

هذه الدوال الأربعة هي الحل الصحيح لمعادلة شرودنجر:

$$\left(-\frac{1}{2}\left[\nabla^2(1)+\nabla^2(2)\right]-\frac{2}{r_1}-\frac{2}{r_2}\right)\psi_o = E_o\psi_o$$

ولكن لا توجد أي منهم تحقق مبدأ باولي للاستبعاد. وبالإمكان التحقق من ذلك باستخدام المؤثر التبادلي $\hat{P}(1,2)$ لنجد:

$$\hat{P}(1,2)\psi_1 = \psi_{1s}(2)\psi_{1s}(1)\alpha(2)\alpha(1) = \psi_1$$
$$\hat{P}(1,2)\psi_2 = \psi_3$$
$$\hat{P}(1,2)\psi_3 = \psi_2$$
$$\hat{P}(1,2)\psi_4 = \psi_4$$

ولنحافظ علي مبدأ عدم التمييز للإلكترونين، يجب أن نأخذ التجميع الخطي لكل من الدالتين ψ_3 و ψ_2. وأنسب التجمعات هي:

$$\psi_+ = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\left[\alpha(1)\beta(2)+\beta(1)\alpha(2)\right]$$
$$\psi_- = \frac{1}{\sqrt{2}}\psi_{1s}(1)\psi_{1s}(2)\left[\alpha(1)\beta(2)-\beta(1)\alpha(2)\right]$$

ومنهم نجد أن:

$$\hat{P}(1,2)\psi_+ = +\psi_+$$
$$\hat{P}(1,2)\psi_- = -\psi_-$$

ولذا فإن الدالة المطلوبة والتي تحقق مبدأ باولي للاستبعاد هي ψ_-.

باستطاعتنا أن نضع الدالة ψ_- في صورة محدد من الدرجة الثانية، 2، يقال عنه "محدد سلاتر" نسبه إلى العالِم سلاتر، حيث العدد 2 يرمز إلى عدد الجسيمات بالنظام، وبأخذ الصورة:

$$\psi(1,2) \quad \frac{1}{\sqrt{2!}}\begin{vmatrix}\psi_{1s}(1)\alpha(1) & \psi_{1s}(1)\beta(1)\\ \psi_{1s}(2)\alpha(2) & \psi_{1s}(2)\beta(2)\end{vmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2!}}\begin{vmatrix}\psi_{1s}^{\alpha}(1) & \psi_{1s}^{\beta}(1)\\ \psi_{1s}^{\alpha}(2) & \psi_{1s}^{\beta}(2)\end{vmatrix} \qquad \textbf{(10)}$$

لاحظ هنا أنه في حالة وجود إلكترونين نهم نفس الأعداد الكمية فإن المحدد يأخذ الشكل:

$$\psi(1,2) = \frac{1}{\sqrt{2!}}\begin{vmatrix}\psi_{1s}^{\alpha}(1) & \psi_{1s}^{\alpha}(1)\\ \psi_{1s}^{\alpha}(2) & \psi_{1s}^{\alpha}(2)\end{vmatrix} = 0$$

ولهذا انعدم المحدد نظراً لوجود صفين (أو عمودين) متطابقان. بالتالي فإن هذا المستوى سوف يستبعد، وهي تحقق مبدأ باولي للاستبعاد.

وعامةً فإن محدد سلاتر للدالة ψ_- من درجة N ، حيث N هو عدد الجسيمات بالنظام، يكتب بالصورة:

$$\psi(1,2,\cdots,N) = \frac{1}{\sqrt{N!}}\begin{vmatrix}\psi_a(1) & \psi_b(1) & \psi_c(1) & \cdots\\ \psi_a(2) & \psi_b(2) & \psi_c(2) & \cdots\\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots\\ \psi_a(N-1) & \psi_b(N-1) & \psi_c(N-1) & \cdots\\ \psi_a(N) & \psi_b(N) & \psi_c(N) & \cdots\end{vmatrix} \qquad \textbf{(10)}$$

حيث أن للمحدد الخواص التالية:

1- بتبديل أي زوج من الجسيمات يغير المحدد صفة التماثل، لأن قيمة المحدد تتغير إشارته بتبديل أي صفين (أو أي عمودين).

2- عند تطابق صفين (أو عمودين)، تنعدم قيمة المحدد.

وللاختصار يكتب المحدد بالشكل $\frac{1}{\sqrt{N!}}\det\left|\psi_1(1)\psi_2(2)\cdots\psi_N(N)\right|$ أو بالشكل $\left\|\psi_1(1)\psi_2(2)\cdots\psi_N(N)\right\|$.

واجب منزلي: تحقق من أن مفكوك محدد سلاتر لثلاثة الكترونات بذرة الليثيوم "Li" يعطي بالشكل:

$$\psi(1,2,3) = \frac{1}{\sqrt{3!}}\begin{vmatrix}\psi_{1s}(1)\alpha(1) & \psi_{1s}(1)\beta(1) & \psi_{2s}(1)\alpha(1)\\ \psi_{1s}(2)\alpha(2) & \psi_{1s}(2)\beta(2) & \psi_{2s}(2)\alpha(2)\\ \psi_{1s}(3)\alpha(3) & \psi_{1s}(3)\beta(3) & \psi_{2s}(3)\alpha(3)\end{vmatrix}$$

$$\Psi(1,2,3)=\frac{1}{\sqrt{3!}}[\psi_1(1)\psi_2(2)\psi_3(3)+\psi_1(2)\psi_2(3)\psi_3(1)+\psi_1(3)\psi_2(1)\psi_3(2)$$
$$-\psi_1(1)\psi_2(3)\psi_3(2)-\psi_1(2)\psi_2(1)\psi_3(3)-\psi_1(3)\psi_2(2)\psi_3(1)]$$

واجب منزلي: التفاعل بين إلكتروني ذرة الهليوم يعطي بالمؤثر:

$$\hat{H}_{12}=\frac{e^2}{r_{12}}=\frac{e^2}{|r_2-r_1|}$$

باستخدام الدالة $\psi_\pm=\psi_a(1)\psi_b(2)\pm\psi_a(2)\psi_b(1)$ **اثبت أن:**

$$\int\psi_\pm^*\,\hat{H}_{12}\psi_\pm d\tau_1 d\tau_2=C\pm K$$

حيث

$$C=\int\int|\psi_a^*(1)|^2\frac{e^2}{r_{12}}|\psi_b^*(2)|^2\,d\tau_1 d\tau_2$$

هو تكامل كولم (ويسمى أيضاً التكامل المباشر Direct integral)، ويمثل طاقة التفاعل بين إلكتروني ذرة الهليوم وذلك بفرض أنهم موزعون بكثافة كهربية تعطي بالعلاقات:

$$\rho_1=-e\psi_{1s}^*(r_1)\psi_{1s}(r_1)=-e|\psi_{1s}(r_1)|^2,$$
$$\rho_2=-e\psi_{1s}^*(r_2)\psi_{1s}(r_2)=-e|\psi_{1s}(r_2)|^2$$

و

$$K=\int\int\psi_a^*(1)\psi_b(1)\frac{e^2}{r_{12}}\psi_b^*(2)\psi_a(2)d\tau_1 d\tau_2$$

يعرف بأنه التكامل التبادلي (Exchange integral)، ويمثل طاقة التفاعل بين إلكتروني ذرة الهليوم وذلك بفرض أنهم موزعون بكثافة كهربية تعطي بالعلاقات:

$$\rho_1=-e\psi_a^*(1)\psi_b(1),$$
$$\rho_2=-e\psi_b^*(2)\psi_a(2)$$

وهو قيمة موجبة. هذا التكامل ناشئ من حسابات ميكانيكا الكم ولا يوجد له أي تفسير كلاسيكي، وهو ناتج من تطابق الإلكترونات. حساب قيم كل من C و K تعتبر من المسائل الرياضية الصعبة نتيجة وجود الحد $\frac{1}{|r_2-r_1|}$ بالتكامل، وبوجوده لا نستطيع فصل المتغيرات.

الباب الرابع
الديناميكا الحرارية الإحصائية للحالات المجهرية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	الحالات المجهرية للنظام	65
II	أمثلة منوعة	76
III	تمارين عامة	78

الباب الرابع

الديناميكا الحرارية الإحصائية للحالات المجهرية

Statistical Thermodynamics of Microstates

في هذا الباب نستعرض تعريفاً للإنتروبي الإحصائية وذلك باستخدام تعريف الحالات المجهرية . ومن ثم نعرض حساب الإنتروبي لأنظمة بسيطة تحتوي على عدد بسيط من الجسيمات ومستويات الطاقة. وسوف نستعرض التبريرات لهذا التعريف.

كنا قد تعرضنا بالباب الثاني لتعريف الإنتروبي على أنه مقياس لدرجة عشوائية النظام. وذكرنا أن عشوائية جزيئات الغاز تكون أكبر من عشوائيتها في الحالة السائلة (لنفس المادة)، وأيضاً عشوائية جزيئات الحالة السائلة أكبر من عشوائية جزيئات الحالة الصلبة لنفس المادة. وهذا بالطبع ناتج من مدي ترتيب الجزيئات بالمادة.

ونود أن ننوه هنا أن الشرح السابق شرح كيفي (نوعي) وليس كمي أو مقداري، بمعني أنه لم ينتج عن طريق الحسابات الرياضية أو المعادلات المشتقة. بالتالي فنحن نأمل في إيجاد نموذج رياضي (أو معادلة رياضية) يعتد به لتفسير الإنتروبي بطريقة يسهل التعامل معها ويمكن تطبيقها في الدراسات المختلفة.

ولقد كان العالم بولتزمان هو أول من اقترح الربط بين مبدأ الإنتروبي "S" وبين عدد الحالات المجهرية الكلية للنظام "Ω" بالصورة الرسمية:

$$S = k_B \ln \Omega, \qquad (1)$$

حيث k_B هو ثابت بولتزمان وأن S و Ω يعتبران من خواص الحالة للنظام (راجع تعريفات الباب الأول). فما هو تعريف الحالات المجهرية للنظام؟ هذا ما سوف نوضحه في الفصل التالي. ولكن قبل توضيحه لنا هنا ملاحظتان:

1- المعادلة (1) افتراضية (Hypothetical) ولا يوجد لها اشتقاق نظري، وبالتالي سوف نفترض أنها حقيقية. ودرجة صحتها سوف تعتمد على نتائجها ومقارنتها بالقيم المعملية الملحوظة.

2- تم تعريف ثابت بولتزمان k_B لأول مرة من خلال هذه المعادلة.

أ - الحالات المجهرية للنظام (Microstates of a system)

قبل أن نبدأ بتعريف معنى الحالة المجهرية للنظام دعونا نوضح أولاً ماذا تعني كلمة *حالة النظام* : *حالة النظام تعرف تحديداً بأنها كيفية ملأ مستويات الطاقة لهذا النظام* لتوضيح الصورة، دعونا نعتبر نظاماً بسيطاً، كما بالشكل (1)، يتكون من ثلاثة مستويات للطاقة، $\varepsilon_i, i = 0,1,2$ ، وجسيمين مميزين. في هذا النظام، دعونا نعرف حالة النظام بالأرقام $(1,1,0)$ وهذه الأرقام من اليسار لليمين تدل على أنه يوجد جسيم بالمستوى الأول (ε_0) وجسيم بالمستوى الثاني (ε_1)، والمستوى الثالث (ε_2) فارغاً. وفي حالة أنه تم إثارة أحد الجسيمين نحصل على حالات النظام بالأرقام $(1,0,1)$ أو $(0,1,1)$.



شكل (1): نظام بسيط يتكون من ثلاث مستويات للطاقة وجسيمين مميزين

والآن نحن بصدد تعريف الحالة المجهرية لحالة النظام $(1,1,0)$، وكما هو مبين في الشكل (2)، يتكون من حالتين مجهريتين، وهما الحالات المحتملة الناتجة من تبديل الجسيمين بالمستوى الأول والثاني لهذا النظام.

شكل (2): الحالتان المجهريتان المحتملتان لحالة النظام $(1,1,0)$

ونستطيع الآن تحديد التعريف الرسمي للحالة المجهرية كما يلي: "الحالة المجهرية هي ترتيب الجسيمات المميزة خلال حالة معرفة (معطاة) للنظام" بالتالي فإن عدد الحالات المجهرية، Ω، هي عدد الطرق الواضحة لترتيب فئة من الجسيمات المميزة لتحقيق حالة عينية معينة.

مثال: ماهو عدد الحالات المجهرية لحالة النظام $(2,1,0)$ الذي يتكون من ثلاثة مستويات للطاقة وثلاثة جسيمات مميزة؟

الحل: المطلوب هنا أن نقوم بوضع جسيمين بالمستوى الأول وجسيم واحد بالمستوى الثاني وترك المستوى الثالث فارغاً. وبتبديل الأجسام الثلاثة على مستويات الطاقة الأولي والثانية فقط، كما بالشكل (3)، نجد أننا سوف نحصل على ثلاثة حالات مجهريه فقط. هذا مع إهمال ترتيب الجسيمات بكل مستوى.



شكل (3) : الحالات المجهرية المحتملة لحالة النظام $(2,1,0)$.

مما سبق شرحه سوف نسترجع أحد النظريات الإحصائية المهمة ألا وهي:

نظرية: مع وجود الشرط $N = \sum_i n_i$ فإن عدد الطرق لتوزيع عدد N من الجسيمات المميزة على عدد j من المستويات بحيث يوضع n_1 من الجسيمات في المستوى الأول، و n_2 من الجسيمات في المستوى الثاني، وهكذا حتى نصل إلى وضع n_j من الجسيمات في المستوى الأخير j هو:

$$\omega\{n_i\} = \frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_j!} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{j} n_i!} \qquad (2)$$

الإثبات:

نبدأ أولاً بالمستوى الأول، فنجد أن عدد الطرق لاختيار n_1 من N ووضعهم في المستوى هو

$$\omega_1 = \binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!}$$

وبالمستوى الثاني، نجد أن عدد الطرق لاختيار n_2 من $(N-n_1)$ ووضعهم في المستوى هو

$$\omega_2 = \binom{N-n_1}{n_2} = \frac{(N-n_1)!}{n_2!(N-n_1-n_2)!}$$

وبالمستوى الثالث، نجد أن عدد الطرق لاختيار n_3 من $(N-n_1-n_2)$ ووضعهم في المستوى هو

$$\omega_3 = \binom{N-n_1-n_2}{n_3} = \frac{(N-n_1-n_2)!}{n_3!(N-n_1-n_2-n_3)!}$$

ونظل على نفس النمط حتي نصل للمستوى الأخير. وحيث أن هذه الاختيارات عمليات منفصلة فإن العدد الكلي يصبح:

$$\omega\{n_i\} = \omega_1 \times \omega_2 \times \omega_3 \times \cdots \times \omega_j = \frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_j!} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{j} n_i!}$$

حيث الرمز $\prod$ يدل على مضروب الأعداد، بمعني أن $\prod_{i=1}^{r} n_i! = n_1! \times n_2! \cdots\cdots \times n_r!$.

وهذا هو المطلوب.

ملاحظة مهمة: في دراستنا تعرف القيمة ω_i، والتي تعبر عن عدد الطرق المجهرية المختلفة لحالة عينية معينة بأنها "احتمالية الديناميكا الحرارية (Thermodynamic Probability)"

أو الثقل الإحصائي (Statistical weight). وتأخذ ω_i القيم من صفر إلى قيم فلكية، ولذلك فهي تختلف عن الاحتمالية الحقيقية p_i والتي تعرف بالعلاقة:

$$p_i = \frac{\omega_i}{\sum_{i=1}^{j} \omega_i}, \qquad 0 \le p_i \le 1 \qquad (3)$$

ومجموعها الكلي يعطي:

$$\sum_{i=1}^{j} p_i = \sum_{i=1}^{j} \frac{\omega_i}{\sum_{i=1}^{j} \omega_i} = \frac{\sum_{i=1}^{j} \omega_i}{\sum_{i=1}^{j} \omega_i} = 1$$

مثال: ماهو عدد الحالات المجهرية لحالة النظام $(4,3,2,1,0)$؟

الحل: من الحالة $(4,3,2,1,0)$ نجد أن عدد المستويات هي خمسة، وعدد الجسيمات "N" تحسب من الترتيب المعطي وهو:

$$N = \sum_{n_i=1}^{5} n_i = 4+3+2+1+0 = 10$$

وباستخدام القانون الإحصائي نجد أن عدد الحالات المجهرية لهذه الحالة هي:

$$\omega\{n_i\} = \frac{N!}{n_1!n_2!n_3!n_4!n_5!} = \frac{10!}{4!3!2!1!0!} = 12600$$

مثال: احسب الإنتروبي للمثال السابق.

الحل: باستخدام القانون:

$$S = k_B \ln\Omega$$
$$= \left(1.38\times10^{-23}\,\mathrm{Jk^{-1}}\right)\times\ln(12600) = 1.30\times10^{-22}\ \mathrm{Jk^{-1}}$$

تعليق: بالطبع فإن قيمة الإنتروبي هنا صغيرة جداً. ولكن إذا ضربنا هذا الرقم بعدد أفوجادرو، وهو عدد الجسيمات بالمول الواحد، وقسمناه على عدد الجسيمات بالمثال وهو "$N = 10$" فإننا سنحصل على الإنتروبي لكل مول من الجسيمات وهو $7.8\ \mathrm{Jk^{-1}mol^{-1}}$.

- الآن قبل أن نبدأ بمثال أخر دعونا نتحقق من بعض خواص الإنتروبي الإحصائية:

1. الخاصية الأولي تنص على أن:

$$\lim_{T\to 0} S = 0$$

ونعلم إنه عند درجات الحرارة المنخفضة، والتي تقترب من درجة الصفر المطلق، $T \to 0$، نجد أن جميع الجسيمات تتجمع بالمستوى الأرضي (أدني مستوي). وحينما تصبح الجسيمات بمستوى وحيد، فإن عدد الحالات المجهرية Ω تصبح 1، بالتالي فإن:

$$\lim_{T\to 0} S = k_B \ln\Omega = k_B \ln 1 = 0$$

وهذا يوضح أن التعريف الإحصائي متوافق مع القانون الثالث للديناميكا الحرارية.

2. الخاصية التجميعية للإنتروبي (Extensive "Additive" property)، وتعني أنه إذا تضاعف حجم النظام فإن الإنتروبي أيضاً تتضاعف بنفس القيمة. ولدراسة هذه الصفة دعونا أن نضاعف حالة النظام البسيطة $(1,1,0)$ والتي تتكون من ثلاثة مستويات وجسمين مميزين. وسوف نكتفي باستعمال مستويين فقط حيث أن المستوى الثالث فارغ.



وبمضاعفة حجم النظام فإننا نضاعف أيضاً عدد الجسيمات والمستويات، فنحصل على نسختين متطابقتين من الجسيمات ومن المستويات. مع ملاحظة أننا سوف نتعامل مع

كل نسخة على حدة، ولن نسمح بتبادل الجسيمات بين النسخ المختلفة. وكما يتضح من الشكل فأننا حصلنا على أربعة حالات مجهريه. بالتالي:

فإنه لجسيمين نجد أن الإنتروبي:

$$S = k_B \ln 2$$

ولأربعة جسيمات نجد أن الإنتروبي:

$$S = k_B \ln 4 = k_B \ln 2^2 = 2k_B \ln 2$$

ولعدد N من النسخ نجد:

$$S = k_B \ln 2^N = Nk_B \ln 2$$

من هذا المثال تتضح صفة التضاعف للحالات المجهرية وصفة التجميع للإنتروبي، بمعني:

$$\Omega_{total} = \Omega_1 \times \Omega_2$$
$$S_{total} = S_1 + S_2,$$

مثال: ادرس نظام بسيط، كما بالشكل، يتكون من ثلاثة جسيمات "$N = 3$" مميزة وأربعة مستويات للطاقة تعطي بالعلاقة:

$$\varepsilon_i = i\ \varepsilon \text{ Joule}, \qquad i = 0,1,2,3$$

مع اعتبار أن الطاقة الكلية U تتساوي مع القيمة 3ε Joule.

المستوى	الطاقة
3	$\varepsilon_3 = 3\varepsilon$
2	$\varepsilon_2 = 2\varepsilon$
1	$\varepsilon_1 = 1\varepsilon$
0	$\varepsilon_o = 0$

الحل: نستطيع أن نميز بين الجسيمات الثلاثة بإعطائهم الرموز A, B, C مع الأخذ في الاعتبار الشروط (القيود) التالية:

$$\sum_{i=0}^{3} n_i = 3, \qquad U = \sum_{i=0}^{3} n_i \varepsilon_n = 3\varepsilon,$$

وباستخدام الرموز التالية:

k تعبر عن ترقيم الحالات العينية، n_i عدد الجسيمات بالمستوى i، Ω_k احتمالية الديناميكا الحرارية، p_k الاحتمالية الحقيقية، نستطيع تكوين الجدول (1):

جدول (1) توزيع الحالات التي تحقق شروط المثال السابق

	الحالات العينية				الحالات المجهرية						
k	n_o	n_1	n_2	n_3	n_o	n_1	n_2	n_3	U	$\omega_k\{n_i\}$	p_k
1	**2**	**0**	**0**	**1**	AB	0	0	C	3ε	3	0.1
					AC	0	0	B			
					BC	0	0	A			
2	**1**	**1**	**1**	**0**	A	B	C	0	3ε	6	0.6
					B	C	A	0			
					C	A	B	0			
					A	C	B	0			
					B	A	C	0			
					C	B	A	0			
3	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	ABC	**0**	**0**	3ε	1	0.1

ومن الجدول نجد أن عدد الحالات العينية هي ثلاثة $k = 1,2,3$، وعدد الحالات المجهرية هي:

$$\Omega = \sum_k \omega_k \{n_i\} = 10.$$

ويوجد بالجدول الحالة العينية $(1,1,1,0)$، انظر الترقيم العيني $k = 2$، ولها أعلي عدد من الحالات المجهرية وهي $\omega_2 = 6$ ولهذا فإن الحالة $(1,1,1,0)$ تسمي أعلي احتمالية عينية (Most probable macrostate).

ولنا هنا وقفة لنستخلص بعض النتائج من جدول (1) وهي:

1- بالرغم من بساطة الأعداد (الجسيمات والمستويات) فإن الحالة $(1,1,1,0)$، والتي تتميز بأعلى عشوائية ممكنة، لها أعلي احتمالية عينية.

2- نظراً للقيود المعطاة بالمثال فإنه يوجد أيضاً العديد من الطاقات التي لم ندرسها، وتبدأ من الطاقة 0ε للحالة $(3,0,0,0)$ وتنتهي بالطاقة 9ε للحالة $(0,0,0,3)$. هذه الحالات تعتبر من الحالات النظامية (غير العشوائية) ولذا نجد أن لها اقل حاله مجهريه وهي الواحد.

3- لعدد كبير جداً من الجسيمات في هذا النظام سوف نجد أن الحالة $(1,1,1,0)$ سوف يظهر لها أكبر عدد من الحالات المجهرية وتكون حالة الاتزان للنظام.

4- سوف يستخدم الرمز $\tilde{n}$ للتعبير عن فئة الأعداد للحالة ذات أعلي احتمالية عينية، ولمثالنا هنا نجد أن $\tilde{n} \equiv \{1,1,1,0\}$.

وقد رأينا سابقاً بالديناميكا الحرارية أن النظام يميل دائما إلى حالة الاتزان وبالتالي فإن الإنتروبي تزداد. وعند الاتزان تماماً تأخذ الإنتروبي قيمه عظمى. وبالاستقراء نجد أن نموذج بولتزمان الإحصائي يقترح علينا أن النظام يتغير تلقائياً من حالات ذات احتمالية عينية منخفضة إلى حالات ذات احتمالية عينية مرتفعة (أعداد كبيرة من الحالات المجهرية). من هنا نستطيع أن نؤكد أن القانون الثاني للديناميكا الحرارية هو نتيجة منطقية لنظرية الاحتمالات. "ولذا فإن العالم يتغير كما نراه لأنه يبحث عن حالة أعلي احتمالية! وهي حالة الاتزان! أو الحالة العشوائية! وسوف نستعرض مثال أخر لنوضح إجابة السؤال: ما هي الحالة المفضلة للنظام؟

مثال: نظام بسيط يتكون من ست جسيمات "$N=6$" ومستويات تعطي بالعلاقة:

$$\varepsilon_i = i \times 10^{-20} \text{ Joule}, \qquad i = 0,1,2,3,4$$

إذا استطعنا ترتيب الجسيمات بحيث أن المجموع الكلي للطاقة "U" يساوي 4×10^{-20} J. احسب عدد الحالات المجهرية التي تحقق هذه الشروط.

الحل: لحل هذا المثال يجب أن نحدد مستويات الطاقة ونحدد عدد تباديل الجسيمات الستة بحيث تتحقق الشروط المعطاة كما بالجدول (2). ومن الجدول نجد أن عدد الحالات العينية هي خمسة حالات فقط.

جدول (2) جميع الحالات العينية التي تحقق شروط المثال السابق

الطاقة (10^{-20} Joule)	الحالات العينية				
4	●				
3		●			
2			●●	●	
1		●		●●	●●●●
0	●●●●●	●●●●	●●●●	●●●	●●
E_{total} (10^{-20} J)	4	1+3	2×2	1+1+2	1+1+1+1
k	1	2	3	4	5

دعونا ننظر بتمعن إلى نتيجة المثال السابق. بالرغم من أننا حصلنا على خمسة توزيعات عينية مختلفة لها نفس عدد الجسيمات ولها أيضاً نفس الطاقة E_{total} (10^{-20} J)، ولكننا نود أن نعرف: ما هو عدد الحالات المجهرية لكل حالة عينية؟ من معلوماتنا السابقة للديناميكا الحرارية فنحن نتوقع أن أي نظام يتجه للتقليل (minimize) من طاقة هلمهولتز الحرة، ولذا يجب أن نتأكد من هذه المعلومة، وسوف نحتفظ بالحجم ثابتاً حتى لا تتغير مستويات الطاقة بتغير الحجم.

مثال: للنظام السابق، عين عدد الحالات المجهرية لكل توزيع واوجد التوزيع الذي يقلل من طاقة هلمهولتز الحرة "$F = U - TS$" عند درجة حرارة الغرفة (298.15 K).

الحل: باستخدام حل المثال السابق والقانون:

$$\omega_k = \frac{6!}{n_0!n_1!n_2!n_3!n_4!}$$

نستطيع تكوين الجدول (3):

جدول (3) الكميات الفيزيائية التي تحقق شروط المثال

k	$\{n_0,n_1,n_2,n_3,n_4\}$	ω_k	$S(10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}})$	$U(10^{-20}\ \mathrm{J})$	$F(10^{-20}\ \mathrm{J})$
1	$\{5,0,0,0,1\}$	**6**	**2.47**	**4.00**	**3.26**
2	$\{4,1,0,1,0\}$	**30**	**4.70**	**4.00**	**2.60**
3	$\{4,0,2,0,0\}$	**15**	**3.74**	**4.00**	**2.89**
4	$\{3,2,1,0,0\}$	**60**	**5.65**	**4.00**	**2.32**
5	$\{2,4,0,0,0\}$	**15**	**3.74**	**4.00**	**2.89**

ويتضح من الجدول (3) أن الحالة العينية "$k=4$" والتي لها أعلى عدد من الحالات المجهرية، ولها أيضاً أعلي قيمة للإنتروبي S وأقل قيمة لطاقة هلمهولتز F.

تعليق مهم: لعدد بسيط من الجسيمات نجد أنه من السهل استخدام الطريقة الموضحة في المثال السابق لإيجاد التوزيعات المختلفة، ومنها نحسب أعلي توزيع إحتمالي والذي تكون له أقل طاقة حرة. ولكن للأسف فإن هذه الطريقة لا تصلح للتعامل مع نظام حقيقي (نظام عيني) له أعداد فلكية من الجسيمات ومن مستويات الطاقة. ومن حسن حظنا أن عالماً مثل بولتزمان قد وُفق في إيجاد معادلة لحساب التوزيع الإحصائي لأعداد كبيرة من الجسيمات على مستويات الطاقة. وقد بني بولتزمان توزيعه الإحصائي على الأسس التالية:

1- إيجاد النهاية العظمى لإنتروبيا النظام،

2- مع التقيد بشرط أن عدد الجسيمات N يظل ثابت

3- وأيضاً التقيد بالشرط أن الطاقة الداخلية للنظام U تظل ثابتة.

وهذا ما سوف نتعرض له في الباب التالي.

واهب منزلي: استنتج العلاقة $S = k_B \ln\Omega$



الحل: سنفترض نظامان منفصلان تماما بحائل وهما A,B كما بالشكل. وسنفترض أن لكل نظام منهما الإنتروبي والحالات المجهرية الخاصة به، مثل S_A,Ω_A و S_B,Ω_B. وسنفترض أن النظامان تم خلطهما بإزالة الحائل. ولكننا نعلم أن الإنتروبي هي كمية شاملة، ومنها نضع:

$$S_{total} = S_A + S_B \qquad (I)$$

ولكننا نعلم أيضاً أن والحالات المجهرية هي كميات تضاعفية بمعني أن:

$$\Omega_{total} = \Omega_A \times \Omega_B \qquad (II)$$

سنفترض الآن S أن هي دالة في المتغير Ω بالصورة:

$$S = f(\Omega) \qquad (III)$$

من (I) نجد

$$f(\Omega_{total}) = f(\Omega_A) + f(\Omega_B) \qquad (IV)$$

ومن (II) نجد

$$f(\Omega_{total}) = f(\Omega_A \times \Omega_B) \qquad (V)$$

ومن (IV) و (V) نجد

$$f(\Omega_A) + f(\Omega_B) = f(\Omega_A \times \Omega_B) \qquad (VI)$$

المعادلة (V) لا تتحقق إلا إذا استخدمنا الدالة اللوغاريتمية بالشكل:

$$S = k_B \ln\Omega$$

وهو المطلوب.

II– أمثلة منوعة

1- افترض وجود كرتان متطابقتان (وغير مميزتان) ويراد وضعهما في أربعة أماكن منفصلة هما (A,B,C,D). احسب عدد الحالات العينية.

الحل

بترتيب الكرات كما بالجدول التالي نجد أن عدد الحالات العينية هي 10. مع وجود الشرط بأن عدد الكرات بكل حالة العينية يجب أن تكون 2 (لاحظ هنا أن التجميع أفقيا).

k				
1				••
2			••	
3		••		
4	••			
5			•	•
6		•		•
7		•	•	
8	•			•
9	•		•	
10	•	•		
	A	B	C	D

2- افترض وجود جسيمان متطابقتان (ومميزتان) ويراد وضعهما في ثلاث مستويات للطاقة تعطي بالعلاقة:

$$\varepsilon_i = i \times \varepsilon, \qquad i = 0,1,2$$

إذا استطعنا ترتيب الجسيمات بحيث أن المجموع الكلي للطاقة $U = 2\varepsilon$.

أ- احسب عدد الحالات المجهرية،

ب- الإنتروبي،

ت- إذا وضع جسم مميز أخر بطاقة صفر، اثبت أن الإنتروبي سوف يزداد بالقيمة 1.63 .

الحل

أ- نكون الجدول التالي بحيث أن عدد الجسيمات هو 2 و المجموع الكلي للطاقة هو $U = 2\varepsilon$ فنجد أن عدد الحالات العينية هو 2 .وبحساب عدد الحالات المجهرية لكل حالة نجد أن عددهما هو1 و2.

	الحالات العينية	
ε_i	1	2
2		$\oplus$
1	$\oplus$ $\otimes$	
0		$\otimes$
الحالات المجهرية ω_i	$\frac{2!}{2!0!0!}=1$	$\frac{2!}{1!0!1!}=2$

ويصبح المجموع الكلي للحالات المجهرية هو $\Omega_1 = \omega_1 + \omega_2 = 1+2 = 3$.

ب- الإنتروبي للنظام يحسب كالتالي:

$$S_1 = k_B \ln \Omega_1 = \left(1.38\times10^{-23}\ \text{JK}^{-1}\right)\ln 3 = 1.5\times10^{-23}\ \text{JK}^{-1}$$

ت- وعند وضع جسم مميز أخر، $\odot$ ، بالمستوى ذو الطاقة صفر، كما بالجدول التالي، نجد أن المجموع الكلي للحالات المجهرية هو $\Omega_2 = \omega_1 + \omega_2 = 3+3 = 6$:

	الحالات العينية	
ε_i	1	2
2		$\oplus$
1	$\oplus$ $\otimes$	
0	$\odot$	$\otimes$ $\odot$
الحالات المجهرية ω_i	$\frac{3!}{2!1!0!}=3$	$\frac{3!}{2!0!1!}=3$

والإنتروبي لهذه الحالة:

$$S_2 = k_B \ln \Omega_2 = \left(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}\right)\ln 6 = 2.5\times10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}$$

ومنها نجد النسبة:

$$\frac{S_2}{S_1} = \frac{\ln 6}{\ln 3} = 1.63$$

III تمارين عامة

1 الفرض وجود أربعة جسيمات متطابقة (ومميزة) ويراد وضعهما في أربعة مستويات للطاقة تعطي بالعلاقة:

$$\varepsilon_i = i\times\varepsilon, \qquad i = 0,1,2,3$$

إذا استطعنا ترتيب الجسيمات بحيث أن المجموع الكلي للطاقة $U = 6\varepsilon$.

أ- اوجد الخمس حالات العينية ورتبهم بحسب الحالات المجهرية،

ب- اثبت أن عدد الحالات المجهرية الكلية = 44.

ث- اثبت أن متوسط الإسكان للكميات الأربعة هو $0.91, 0.91, 1.09, 1.09$.

الباب الخامس

الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان

الفصل	العنوان	الصفحة
I	فرضيات الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان	80
	i المستويات المنفردة (وحيدة الانتماء)	83
	ii المستويات متعددة الانتماء	84
II	علاقات هامة	86
	i حساب المعامل e^{α}	86
	ii تفاضلات مهمة	87
	iii حساب الطاقة المتوسطة	87
	iv حساب الضغط المتوسط	88
	v حساب الإنتروبي	88
	vi حساب المعامل β	89
	vii حساب طاقة هلمهولتز الحرة	90
III	تمارين عامة	91

الباب الخامس

الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان

Classical Statistics of Maxwell-Boltzmann

في هذا الباب نستعرض الفروض الأساسية التي بنى عليها ماكسويل- بولتزمان توزيعه الإحصائي. والتوزيع الإحصائي ماهو إلا معادلة يُعرف بها عدد الجسيمات n_i التي تشغل كل مستوى من مستويات الطاقة ε_i بالنظام مع وجود بعض القيود. وسوف نُوجد من هذا التوزيع جميع دوال الحالة للديناميكا الحرارية. وتظهر أهمية الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان في كثير من التطبيقات النظرية المهمة مثل حساب الخواص الفيزيائية للغاز المثالي. والإحصاء التقليدي ماهو إلا تقريب لإحصاءات متطورة مثل إحصاء بوز- أينشتين أو إحصاء فيرمي- ديراك وذلك عند درجات الحرارة المرتفعة.

I- فرضيات الإحصاء التقليدي لماكسويل- بولتزمان

سوف نفترض نظاماً يحتوي على عدد كبير من الجسيمات:

1- المتطابقة (Identical)

2- والمميزة (Distinguishable)

3- والتي لا ينطبق عليها مبدأ باولي للاستبعاد (Pauli exclusion principle).

الجسيمات المتطابقة تعني أن الجسيمات متطابقة في التركيب والمكونات (كتلة، شحنة،...) والجسيمات المميزة تعني أننا نستطيع أن نميز (أو نعرف الفرق) بين جسيم وآخر بالرغم من تطابقهما. مثال على ذلك نموذج العملة المعدنية حيث ميزنا العملات بالتاريخ أو اللون. بالرغم من عدم منطقية الفرضين السابقين! ولكن نتائج هذا النموذج من البساطة بحيث يستخدم لتوضيح ومناقشة خواص هذا النظام.

سنفترض هنا أن النظام التقليدي (كما بالشكل المقابل):



1- يتكون من مستويات للطاقة $(\varepsilon_1, \varepsilon_2, \varepsilon_3, \cdots)$ حيث $(\varepsilon_1 < \varepsilon_2 < \varepsilon_3, \cdots)$

2- وهذه المستويات تتشبع بعدد من الجسيمات $(n_1, n_2, n_3, \cdots)$،

مع التقيد بالشرطين التاليين:

I- العدد الكلي N للجسيمات بالنظام هو عدد ثابت، ويمكن كتابته رياضياً كالتالي:

$$N = \sum_i n_i \ , \qquad (1)$$

II- الطاقة الداخلية الكلية U للجسيمات بالنظام كمية ثابتة، وتُعرف رياضيا كالتالي:

$$U = \sum_i n_i \varepsilon_i \qquad (2)$$

ونعلم من نظرية الاحتمالات (انظر الملحق C) أن عدد الطرق اللازمة لتوزيع عدد N من الجسيمات المميزة على عدد j من المستويات بحيث يوضع n_1 بالمستوى الأول و n_2 بالمستوى الثاني وهكذا هو:

$$\widetilde{\omega} = \omega\{n_i\} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{j} n_i!} \qquad (3)$$

ووجدنا بالباب الرابع أنه عند وصول نظام يتكون من عدد لانهائي من الجسيمات والمستويات إلى حالة الاتزان، أي أعلى توزيع محتمل يحتوي على فئة من الأعداد $\tilde{n}_i$ يصل عنده قيمة الاحتمال الديناميكي الحراري "$\widetilde{\omega}$" إلى قيمة عظمى. بالتالي فإن أي تغيير، ولو طفيف، في فئة الأعداد $\{n_i\}$ لن يؤثر بقيمة $\widetilde{\omega}$. وهذا يعني أن العلاقة $\delta\widetilde{\omega} = 0$ تتحقق تحت التغيير $\tilde{n}_i \to \tilde{n}_i + \delta n_i$ مع التقيد بالشرطين التاليين:

$$\delta N = \sum_i \delta n_i = 0 \qquad (4)$$

و

$$\delta U = \sum_i \varepsilon_i \delta n_i = 0 \qquad (5)$$

وبالإمكان استخدام الشرط المكافئ:

$$\delta \ln \widetilde{\omega} = 0 \qquad (6)$$

بدلاً من استخدام $\delta \widetilde{\omega} = 0$، وذلك لأن الدالة اللوغارتميه هي دالة مطردة (رتيبة) "Monotonic function"، ومن السهل التعامل معها. ونحن نعلم أن قيمة $\widetilde{\omega}$ تصل إلى أرقام فلكية ولكن قيمة $\ln \widetilde{\omega}$ تعتبر محدودة ويمكن التعامل معها حسابياً.

مثال: من المعادلة (3)، واستخدام تقريب استيرلنج $\ln(z!) = z \ln(z) - z$، اثبت أن:

$$\ln(\widetilde{\omega}) = N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i \qquad (7)$$

ومنها اثبت أن:

$$\delta \ln(\widetilde{\omega}) = -\sum_i \ln n_i \ \delta n_i \qquad (8)$$

الحل: باستخدام لوغاريتم المعادلة (3) نجد أن:

$$\ln(\widetilde{\omega}) = \ln\left(\frac{N!}{\prod_{i=1}^{n} n_i!}\right) = \ln(N!) - \ln\left(\prod_{i=1}^{n} n_i!\right)$$

$$= \ln(N!) - \ln[n_1! \times n_2! \cdots\cdots \times n_n!]$$

$$= \ln(N!) - [\ln(n_1!) + \ln(n_2!) + \cdots\cdots]$$

$$= \ln(N!) - \sum_i \ln(n_i!)$$

وباستخدام تقريب استيرلنج للمعادلة السابقة نجد أن:

$$\ln(\widetilde{\omega}) = N \ln N - N - \sum_i (n_i \ln n_i - n_i)$$

$$= N \ln N - N - \sum_i n_i \ln n_i - \underbrace{\sum_i n_i}_{N}$$

$$= N \ln N - \sum_i n_i \ln n_i \qquad (7a)$$

و هو المطلوب إثباته أولاً. وبتفاضل المعادلة (7a) بالنسبة إلى n_i نجد:

$$\delta \ln(\widetilde{\omega}) = \delta(N \ln N) - \sum_i \ln n_i \delta n_i - \sum_i n_i \underbrace{\delta(\ln n_i)}_{\frac{1}{n_i}\delta n_i}$$

$$= 0 - \sum_i \ln n_i \delta n_i - \underbrace{\sum_i \delta n_i}_{=0}$$

$$= -\sum_i \ln n_i \ \delta n_i \qquad (8a)$$

و هو المطلوب إثباته ثانيةً. المعادلة (8a) تعطي التغير في قيمة $\ln(\widetilde{\omega})$ مع التغير في عدد الجسيمات δn_i لكل مستوي.

و السؤال هنا: كيف نحسب التوزيع الإحصائي مع وجود القيدين (1) و(2) واحتمالية الديناميكا الحرارية (3)؟ دعونا نجيب على هذا السؤال في الحالتين التاليتين.

أ- المستويات المنفردة (وحيدة الانتماء)

(Non – Degenerate levels)

نظراً للقيود المطبقة على النظام، فإن تغيير n_i لن يصبح مستقلاً. لذلك سوف نستخدم طريقة لاجرانج (أنظر الملحق B)، وذلك بضرب المعادلة (1) بالمعامل $-\alpha$ والمعادلة (2) بالمعامل β وجمعهما على المعادلة (8) نجد أن:

$$\delta\left[\ln(\tilde{\omega})+\alpha\sum_i n_i-\beta\sum_i \varepsilon_i\, n_i\right]=0 \qquad (11)$$

حيث α و β تسمى معاملات "لاجرانج"، ولهم علاقة بالخواص الفيزيائية للنظام. وبتفاضل المعادلة (11) نصل إلى الصيغة التالية:

$$\sum_i[-\ln n_i+\alpha-\beta\varepsilon_i]\delta n_i=0$$

وهي تعبر عن عدد لانهائي من المعادلات. وحيث أن التغير δn_i اختياري ومستقل، ولهذا فبمساواة معاملات δn_i بالصفر نصل إلى أشهر علاقة للتوزيع الإحصائي وهي:

$$\boxed{n_i=e^{\alpha-\beta\varepsilon_i}} \qquad (12)$$

وتسمي المعادلة (12) بالتوزيع الإحصائي التقليدي لماكسويل- بولتزمان. الكمية $e^{-\beta\varepsilon_i}$ تسمي معامل بولتزمان، وهي دالة تعتمد على درجة الحرارة والحجم ولها أهميتها التطبيقية الخاصة بمختلف الفروع العلمية.

ii- المستويات متعددة الانتماء (Degenerate States)

إذا افترضنا أن كل منسوب للطاقة "i" متعدد الانتماء، بحيث أنه يتكون من عدد g_i من مستويات الطاقة، فإن كل جسيم n_i يمكنه أن يستقر في أي مستوى بعدد من الطرق مقدارها $g_i^{n_i}$. ولجميع مناسيب الطاقة نجد أن عدد الطرق تأخذ الصورة النهائية $\prod_{i=1}^{j} g_i^{n_i}$. ومنها نجد أن عدد المستويات المجهرية للجسيمات المميزة تعرف بالمعادلة:

$$\tilde{\omega}\{n_i\}=N!\prod_{i=1}^{j}\frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \qquad (13)$$

وإذا كانت الجسيمات غير مميزة فإننا يجب أن نقسم على القيمة $N!$ لنحصل على:

$$\tilde{\omega}\{n_i\}=\frac{N!}{N!}\prod_{i=1}^{j}\frac{g_i^{n_i}}{n_i!}=\prod_{i=1}^{j}\frac{g_i^{n_i}}{n_i!} \qquad (13a)$$

واجب منزلي:

1- من المعادلة (13) اثبت أن:

$$\ln(\tilde{\omega})=\sum_i n_i\left(\ln\frac{g_i}{n_i}+1\right)$$

ومنها اثبت أن:

$$\delta\ln(\tilde{\omega})=\sum_i \ln\frac{g_i}{n_i}\,\delta n_i \qquad (14)$$

2- باستخدام المعادلات (1) و(2) و(14) ومعاملات "لاجرانج" α و β اثبت أن التوزيع الإحصائي التقليدي لماكسويل- بولتزمان يأخذ الشكل:

$$\boxed{n_i=g_i e^{\alpha-\beta\varepsilon_i}} \qquad (15)$$

وتطبيقات إحصاء ماكسويل- بولتزمان، خلال معادلتي (12) و (15)، متعددة ومتنوعة. ومن أهم التطبيقيات الخاصة لهذا لتوزيع هي دراسة عملية تضخيم الضوء (Light amplification) من خلال دراسة تفاعل المواد مع مجال خارجي للطاقة، مثل الإشعاعات الكهرومغناطيسية، (Interaction of radiation with matter) والتي يظهر تأثيرها من خلال الفوتونات على الكترونات المواد. وسوف ندرس هذه العملية من خلال تعرضنا لعمل الليزر لاحقاً في كتاب أخر.

II– علاقات هامة

i– حساب المعامل e^{α}

يحسب المعامل e^{α} باستخدام الشرط الأساسي:

$$N = \sum_i n_i = \sum_i g_i e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i} = e^{-\alpha}\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

ومنه نجد أن:

$$e^{-\alpha} = \frac{N}{\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}} = \frac{N}{Z_{sp}}, \qquad Z_{sp} = \sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

حيث عرفنا الدالة الجديدة Z_{sp} لجسيم مفرد "Single particle". الدالة Z_{sp} تسمى بالإنجليزية "Partition function" بمعنى دالة تجزئ. والدالة مشتقة أصلاً من المصطلح الألماني "Zustandsumme" وتعنى تجميع الحالات (المستويات). لذلك فسوف نستخدم الترجمة الألمانية ونسميها "دالة تجميع المستويات"، أو باختصار دالة تجميع. وسوف نخصص الباب السادس لشرح خصائص الدالة بالتفصيل نظراً لأهميتها في حساب الكميات الفيزيائية.

باستخدام دالة التجميع يأخذ توزيع ماكسويل– بولتزمان، المعادلة (15) الشكل:

$$n_i = N\frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z_{sp}}; \tag{16}$$

أو الصيغة العامة

$$n_i = Ng_i\frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z_{sp}} \tag{17}$$

ii– تفاضلات مهمة

1-

$$\frac{\partial Z_{sp}}{\partial\beta} = \frac{\partial}{\partial\beta}\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i} = -\sum_i \varepsilon_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\frac{\partial Z_{sp}}{\partial\beta} = -\sum_i \varepsilon_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}} \tag{18}$$

2-

$$\left(\frac{\partial Z_{sp}}{\partial V}\right)_{T,N} = \left(\frac{\partial}{\partial V}\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}\right)_{T,N} = -\sum_i \beta g_i e^{-\beta\varepsilon_i}\left(\frac{\partial\varepsilon_i}{\partial V}\right)_{T,N}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\left(\frac{\partial Z_{sp}}{\partial V}\right)_{T,N} = -\beta\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}\left(\frac{\partial\varepsilon_i}{\partial V}\right)_{T,N}} \tag{19}$$

iii– حساب الطاقة المتوسطة

تحسب الطاقة المتوسطة من العلاقة:

$$\bar{E} = \frac{1}{N}\sum_i n_i\varepsilon_i = \frac{1}{Z_{sp}}\sum_i \varepsilon_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i}$$

$$= -\frac{1}{Z_{sp}}\frac{\partial}{\partial\beta}\sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i} = -\frac{1}{Z_{sp}}\frac{\partial Z_{sp}}{\partial\beta}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\bar{E} = -\frac{\partial}{\partial\beta}[\ln(Z_{sp})]} \tag{20}$$

وتصبح الطاقة الداخلية الكلية:

$$\Rightarrow \quad \boxed{U = -N\frac{\partial}{\partial\beta}[\ln(Z_{sp})]} \tag{21}$$

وبمساواة المعادلتين (a) و (b) نحصل على:

$$\frac{1}{T} = k_B \beta$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\beta = \frac{1}{k_B T}} \tag{23}$$

vii- حساب طاقة هلمهولتز الحرة F

تحسب طاقة هلمهولتز الحرة من العلاقة

$$\begin{aligned} F &= U - TS \\ &= U - T\left(k_B N \ln Z_{sp} + k_B \beta U\right) \\ &= U - N k_B T \ln Z_{sp} - \underbrace{\beta k_B T}_{1/\beta} U \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{F = -N k_B T \ln Z_{sp}} \tag{24}$$

واجب منزلي: إذا علمنا أن $\beta = \frac{1}{kT}$ ، اثبت أن

$$\boxed{\begin{aligned} &\frac{\partial \beta}{\partial T} = -\frac{1}{k_B T^2}, \\ &\frac{\partial}{\partial \beta} = \frac{\partial T}{\partial \beta}\frac{\partial}{\partial T} = -k_B T^2 \frac{\partial}{\partial T} \\ &\frac{\partial}{\partial \beta}[\ln(Z_{sp})] = -kT^2 \frac{\partial}{\partial T}[\ln(Z_{sp})] \end{aligned}}$$

II- تمارين عامة

1- باستخدام دالة التجميع بالشكل:

$$Z_{sp} = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$

تحقق من النتائج التالية:

التعريف Quantity	الرمز Symbol	الصيغة Formula
الطاقة الداخلية	$U = N\overline{E} = N\left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial \beta}\right)_{V,N}$	$Nk_B T^2 \left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial T}\right)_{V,N}$
الإنتروبي	$S = k_B \ln(\tilde{\omega})$	$Nk_B \ln Z_{sp} + Nk_B U$
طاقة هلمهولتز	$F = U - TS$	$-Nk_B T \ln Z_{sp}$
معادلة الحالة	$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$	$Nk_B T \left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial V}\right)_{T,N}$
الجهد الكيميائي	$\mu = -\left(\frac{\partial F}{\partial N}\right)_{T,V}$	$-Nk_B T \left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial N}\right)_{V,T}$
دالة جبس	$G = F + PV$ $= F - V\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$	$Nk_B T \left[\left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial \ln U}\right)_{T,N} - \ln Z_{sp}\right]$
المحتوى الحراري	$H = U + PV$	$Nk_B T \left[\left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial \ln T}\right)_{V,N} + \left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial \ln V}\right)_{T,N}\right]$
الحرارة النوعية	$C_V = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_{V,N}$ $= -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_{V,N}$	$Nk_B T \left[2\left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial T}\right)_V + T\left(\frac{\partial^2 \ln Z_{sp}}{\partial T^2}\right)_V\right]$

2- نظام يتكون من ثلاث مستويات للطاقة كالتالي: $\varepsilon_1 = 0$، $\varepsilon_2 = 100\,k_B$، $\varepsilon_3 = 200\,k_B$ **ولهم الانتماءات** $g_1 = 1$، $g_2 = 3$، $g_3 = 5$. **احسب الإسكان النسبي** "Relative population" **بين المستويات عند درجة الحرارة** $T = 100\,\mathrm{K}$.

الحل: من المعادلة (15) نجد أن الإسكان النسبي بين المستويات يُعطى بالعلاقة:

$$\frac{n_j}{n_i} = \frac{g_j e^{\alpha - \beta\varepsilon_j}}{g_i e^{\alpha - \beta\varepsilon_i}} = \frac{g_j e^{-\beta\varepsilon_j}}{g_i e^{-\beta\varepsilon_i}}$$

ومنها نجد

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{3e^{-100\,k_B/100\,k_B}}{1e^{-0}} = 3e^{-1}$$

$$\frac{n_3}{n_1} = \frac{5e^{-200\,k_B/100\,k_B}}{1e^{-0}} = 5e^{-2}$$

$$\frac{n_3}{n_2} = \frac{5e^{-200\,k_B/100\,k_B}}{3e^{-100\,k_B/100\,k_B}} \approx 1.7e^{-1}$$

الباب السادس

دالة تجميع المستويات وتطبيقاتها

الفصل	العنوان	الصفحة
I	دالة التجميع للمستويات المنفردة	94
II	دالة التجميع للمستويات المتصلة	99
III	تطبيقات دالة التجميع للغاز المثالي	100
	i حساب الضغط	101
	ii حساب الطاقة الداخلية	101
	iii حساب الحرارة النوعية	102
	iv حساب الإنتروبي	102
IV	أمثلة محلولة	103
V	تمارين عامة	111

الباب السادس

دالة تجميع المستويات وتطبيقاتها

Partition Function and its Applications

I – دالة التجميع للمستويات المنفردة

Partition Function for Non-Degenerate states

سوف نستعرض هنا أهم دالة بالفيزياء الإحصائية، ألا وهي دالة تجميع المستويات "Z_{sp}"، حيث تعتبر حجر الأساس في حسابات خواص ودوال الديناميكا الحرارية. الدالة Z_{sp} لجسيم أحادي "Single particle" تسمي بالإنجليزية "Partition function" بمعني "دالة تجزئ". والدالة مشتقة أصلاً من الكلمة الألماني "Zustandsumme" وتعني تجميع الحالات (المستويات). لذلك فسوف نستخدم الترجمة الألمانية ونسميها "دالة تجميع المستويات"، أو باختصار "دالة التجميع".

الدالة Z_{sp} هي تجميع لمعامل بولتزمان $e^{-\beta\varepsilon_i}$ ولها الخواص التالية:

1- التجميع لجميع المستويات المجهرية المميزة للنظام ككل، بمعني أن

$$Z_{sp} = \sum_i e^{-\beta\varepsilon_i} \qquad (1)$$

2- أو هي تجميع لجميع مستويات الطاقة المميزة للنظام ككل، بمعني أن:

$$Z_{sp} = \sum_i g_i e^{-\beta\varepsilon_i} \qquad (2)$$

3- تعتمد على خواص النظام وتركيبته المجهرية الإحصائية.

4- تعتمد على درجة حرارة النظام المطلقة من خلال المعامل β.

5- تتناسب مع حجم الغاز وذلك من خلال كثافة المستويات $g(\varepsilon)$ أو g_i.

6- قيمتها العددية تتغير من القيمة 1 إلي قيم فلكية.

دعونا نطبق العلاقة (1) لبعض الأمثلة المختلفة حتى نستخلص بعض من الخواص الهامه لهذه الدالة.

مثال: اعتبر نظام بسيط يتكون من جسيمين. إذا تواجد النظام في مستويين فقط للطاقة وهما $\varepsilon_1 = 0$ و $\varepsilon_2 = \varepsilon$ مع الشرط، $g_1 = g_2 = 1$،

1- احسب Z_{sp}

2- احسب Z_2 في حالة أن الجسيمان مميزان (جسيمات بولتزمان).

3- احسب $Z_2^{\backslash}$ في حالة أن الجسيمان غير مميزان.

الحل:

1- لجسيم واحد نجد أن عدد الحالات المجهرية هم اثنتان كما بالشكل التالي:



لذلك نجد أن دالة التجميع هي:

$$Z_{sp} = \sum_{i=1}^{2} e^{-\beta\varepsilon_i} = e^{-\beta\varepsilon_1} + e^{-\beta\varepsilon_2}$$
$$= e^{0} + e^{-\beta\varepsilon} = 1 + e^{-\beta\varepsilon}$$

2 – في حالة أن الجسيمان مميزان نجد أن عدد الحالات المجهرية أربع مستويات كما بالشكل التالي:



الجسيمان مميزان

وتحسب دالة التجميع بالمعادلة

$$Z_2 = \sum_{i=1}^{4} e^{-\beta\varepsilon_i} = e^{-\beta\varepsilon_1} + e^{-\beta\varepsilon_2} + e^{-\beta\varepsilon_3} + e^{-\beta\varepsilon_4}$$
$$= e^{-\beta(0+0)} + e^{-\beta(0+\varepsilon)} + e^{-\beta(\varepsilon+0)} + e^{\beta(-\varepsilon-\varepsilon)}$$
$$= 1 + 2e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon} = (1+e^{-\beta\varepsilon})^2$$
$$= \left(Z_{\text{sp}}\right)^2$$

3- وفي حالة أن الجسيمان غير مميزان نجد أنه يوجد ثلاثة مستويات مجهريه فقط كما بالشكل التالي:

الجسيمان غير مميزان

وتحسب دالة التجميع بالمعادلة

$$Z_2^{\setminus} = \sum_{i=1}^{4} e^{-\beta\varepsilon_i} = e^{-\beta\varepsilon_1} + e^{-\beta\varepsilon_2} + e^{-\beta\varepsilon_3} + e^{-\beta\varepsilon_4}$$
$$= e^{-\beta(0+0)} + e^{-\beta(0+\varepsilon)} + e^{\beta(-\varepsilon-\varepsilon)}$$
$$= 1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon}$$
$$\neq \left(Z_{\text{sp}}\right)^2$$

من هذا المثال يتضح التالي: أنه في الحالة العامة للجسيمات التقليدية المميزة والمتطابقة فإن دالة التجميع لكل جسيم منفرد متساوية. بالتالي فإن العلاقة بين دالة التجميع الكلية للجسيمات Z_N ودالة التجميع للجسيم المنفرد Z_{sp} تعطي بالعلاقة:

$$Z_N = \left(Z_{\text{sp}}\right)^N \tag{3}$$

وهذا لا ينطبق على الجسيمات الغير المميزة. ونلاحظ أيضاً أن القيم العددية لدالة التجميع في حالة الجسيمات المميزة اكثر من القيم العددية لدالة التجميع في حالة الجسيمات الغير مميزة. وعامةً فإنه للجسيمات الغير المميزة نجد أن دالة التجميع تحسب من المعادلة التالية:

$$\boxed{Z_N = \frac{Z_{\text{sp}}^N}{N!}} \tag{4}$$

ويصبح توزيع ماكسويل- بولتزمان بالشكل

$$n_i = N g_i \frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z_{\text{sp}}} \tag{5}$$

والأن دعونا نعرف دالة التوزيع لماكسويل- بولتزمان بالصورة:

$$f(\varepsilon_i) = \frac{n_i}{g_i} = N \frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z_{\text{sp}}} \tag{6}$$

وهي تعين متوسط عدد الجسيمات لكل مستوى كمي. وبالإمكان أيضاً أن نعرف النسبة:

$$P_i = \frac{n_i}{N} = g_i \frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z_{\text{sp}}}, \text{ with } N \to \infty \tag{7}$$

بأنها الاحتمالية العشوائية لوجود جسيم بالمستوي i، مع وجود الشرطين:

$$\sum_i P_i = 1 \quad \text{and} \quad \sum_i \varepsilon_i P_i = \overline{E}$$

والقيمة المتوسطة لأي كمية فيزيائية تأخذ الصيغة التجميعية:

$$\overline{f} = \frac{1}{N}\sum_i n_i f(\varepsilon_i) = \frac{1}{Z_{\text{sp}}}\sum_i g_i f(\varepsilon_i) e^{-\beta\varepsilon_i} \tag{8}$$

واجب منزلي: باستخدام التعريف $P_i = \frac{n_i}{N}$ حيث $N \to \infty$ ، اثبت أن:

$$s = \frac{S}{N} = -k_B \sum_i P_i \ln P_i \tag{9}$$

مثال: نظام يتكون من ثلاث مستويات للطاقة كالتالي: $\varepsilon_1 = 0$ ، $\varepsilon_2 = 100\,k_B$ ، $\varepsilon_3 = 200\,k_B$ ولهم الانتماءات $g_1 = 1$ ، $g_2 = 3$ ، $g_3 = 5$. احسب دالة التجميع Z_{sp}. احسب أيضاً الإسكان النسبي لكل مستوى ومتوسط الطاقة عند درجة الحرارة $T = 100\,\mathrm{K}$.

الحل: دالة التجميع تحسب من المعادلة

$$Z_{sp} = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$$
$$= 1 + 3e^{-100\,k_B/100\,k_B} + 5e^{-200\,k_B/100\,k_B}$$
$$= 1 + 3e^{-1} + 5e^{-2} = 2.78$$

والإسكان النسبي لكل مستوى يعطي بالعلاقة

$$P_i = \frac{n_i}{N} = g_i \frac{e^{-\beta \varepsilon_i}}{Z}$$

بالتالي احتمالية وجود الجسيم بكل مستوى يعطي بالقيم:

$$P_o = \frac{1}{Z} = 0.360, \quad P_1 = \frac{3e^{-1}}{Z} = 0.397, \quad P_2 = \frac{5e^{-2}}{Z} = 0.243$$

i	g_i	ε_i	$g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$	$P_i = g_i \dfrac{e^{-\beta \varepsilon_i}}{Z_{sp}}$	$\varepsilon_i P_i$
0	1	0	1	0.360	0
1	3	$100\,k_B$	$3e^{-1}$	0.397	$39.7\,k_B$
2	5	$200\,k_B$	$5e^{-2}$	0.243	$48.6\,k_B$
			$Z_{sp} = 2.78$	Total = 1	$\overline{E} = 88.3\,k_B$

والطاقة المتوسطة:

$$\overline{E} = \sum_i \varepsilon_i P_i = \left(0 \times P_0 + 100 \times P_1 + 200 \times P_2\right) k_B = 88.3\,k_B$$

II – دالة التجميع للمستويات المتصلة

عندما تصبح المستويات متقاربة من بعضها البعض (متصلة)، نستطيع أن نستغنى عن دالة التجميع $Z_{sp} = \sum_i g_i e^{-\beta \varepsilon_i}$ بالتكامل التالي:

$$Z_{sp} = \int g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon \qquad (1)$$

حيث $g(\varepsilon)$ هي كثافة المستويات (راجع الباب الثالث الفصل III) وتصبح الصورة العامة لدالة التجميع بالشكل:

$$Z_{sp} = \frac{1}{h^3} \int g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon} d\varepsilon \, d\mathbf{r} \qquad (2)$$

حيث N هو عدد الجسيمات بالنظام. ε هي الطاقة الكلية للجسيم و $\mathbf{r}$ هي إحداثيات المكان له. وللمستويات المتصلة تأخذ دالة التوزيع لماكسويل- بولتزمان الصورة:

$$f(\varepsilon) = \frac{N(\varepsilon)}{g(\varepsilon)} = N \frac{e^{-\beta \varepsilon_i}}{\int g(\varepsilon) e^{-\beta \varepsilon_i} d\varepsilon} \qquad (3)$$

مثال: استخدم المعادلة (2) لحساب دالة التجميع للغازات أحادية الذرة (الغاز المثالي).

الحل: نحن نعرف أن الغاز المثالي يمتلك طاقة حركية انتقالية فقط (نظراً لإهمالنا طاقة التفاعل بين الذرات). وحيث أن الغاز يشغل حيزاً كبيراً وتتقارب فيه مستويات الطاقة بحيث يمكن اعتبار أن دالة كثافة المستويات g_i دالة متصلة. ولذلك يمكننا أن نعوض عنها بالكمية $g(\varepsilon)d\varepsilon$ والتي تعبر عن عدد الجزيئات التي تنحصر طاقاتها بين القيمتين ε و $\varepsilon + d\varepsilon$.

دعونا نبدأ بحساب دالة التجميع لجسيم منفرد Z_{sp}، من المعادلة (2) حيث كثافة المستويات تعرف بالمعادلة:

$$g(\varepsilon) = \frac{V}{2\pi^2} \left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon}$$

وبالتالي فإن:

$$Z_{sp} = \int_0^\infty g(\varepsilon) e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \sqrt{\varepsilon} e^{-\varepsilon/k_B T} d\varepsilon$$

$$= \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \underbrace{\int_0^\infty \sqrt{y} e^{-y} dy}_{\Gamma(3/2)=\frac{\sqrt{\pi}}{2}} = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2} (k_B T)^{3/2} \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

$$= V\left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} = V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2}$$

ولعدد N من جسيمات ماكسويل المميزة نجد أن دالة التجميع الكلية هي:

$$\boxed{Z_N = (Z_{sp})^N = V^N \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3N/2}} \qquad (4)$$

وغالباً نستخدم اللوغارتم لدالة التجميع وتأخذ الصور:

$$\ln(Z_{sp})^N = N \ln V + N \ln\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2}, \qquad \beta = 1/k_B T \qquad (4a)$$

$$= N \ln V + \frac{3}{2} N \ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + \frac{3}{2} N \ln(T) \qquad (4b)$$

وسوف تتضح أهمية هذة المعادلات عند استخدامها في حساب الكميات الفيزيائية للغاز المثالي.

III – تطبيقات دالة التجميع للغاز المثالي

لقد وجد سابقاً أن خواص الغاز المثالي تُعرف بالكميات الفيزيائية مثل الضغط والطاقة الداخلية والحرارة النوعية. وقد تم حساب هذه الكميات من خلال الديناميكا الحرارية والنظرية الحركية. وهنا سوف نستخدم دالة التجميع، المعادلة (4)، لحساب الكميات السابقة.

i – حساب الضغط

يحسب ضغط الغاز المثالي كالتالي: بدأ من المعادلة (4)، نجد أن الطاقة الحرة لهلمهولتز تعطي:

$$F = -k_B T \ln(Z_{sp})^N = -N k_B T \ln(Z_{sp})$$

ويحسب الضغط من العلاقة:

$$p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,\beta} = N k_B T \left(\frac{\partial \ln Z_{sp}}{\partial V}\right)_{T,N} = N k_B T \frac{\partial\{(4.a)\}}{\partial V}$$

$$= N k_B T \frac{1}{V}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{pV = N k_B T}, \qquad (5)$$

وهي المعادلة العامة للغاز المثالي.

ii – حساب الطاقة الداخلية

تحسب الطاقة الداخلية للغاز المثالي من العلاقة:

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta} \ln Z_N = -\frac{\partial}{\partial\beta}\{(13.b)\}$$

$$= -\left(\frac{3}{2}\beta\left(-\frac{1}{\beta^2}\right)\right) = \frac{3}{2}\frac{N}{\beta} = \frac{3}{2} N k_B T$$

$$\boxed{\Rightarrow \quad U = \frac{3}{2} N k_B T} \qquad (6)$$

ومنها نجد أن متوسط الطاقة الحركية لجسيم هي:

$$\boxed{\bar{\varepsilon} = \frac{U}{N} = \frac{3}{2} k_B T} \qquad (7)$$

والتي تتطابق مع قانون توزيع الطاقة المتساوي على درجات الحرية.

iii – حساب الحرارة النوعية

تحسب الحرارة النوعية للغاز المثالي من العلاقة:

$$\boxed{C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{V,N} = \frac{3}{2}Nk_B} \qquad (8)$$

ومنها نجد أنها كمية ثابتة ولا تعتمد علي درجة الحرارة.

iv – حساب الإنتروبي

يحسب الإنتروبي كالتالي:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = Nk_B\left[\ln V + \frac{3}{2}\ln T + S_0\right], \qquad (9)$$

حيث $S_0 = \frac{3}{2}\left[\ln\left(\frac{2\pi mk}{h^2}\right)+1\right]$ كمية ثابتة ولا تعتمد علي درجة الحرارة T أو N أو V. المعادلة (18) تشبه المعادلات المشتقة سابقاً بقوانين الديناميكا الحرارية، والتي لها الشكل:

$$s = c_v \ln T + R\ln v + s_o \qquad (10)$$

حيث استخدمنا التعريفات: $s = \frac{S}{n}$ و $\frac{Nk_B}{n} = R$. المعادلة (9) لإنتروبي الغاز المثالي تسمي بمعادلة "ساكور تيترود" . وبالرغم من بساطتها ولكنها غير صحيحة للأسباب التاليه:

1- عند النهاية $T \to 0$ نجد أن $\lim_{T\to 0} S \neq 0$ وهذا يتناقض مع القانون الثالث للديناميكا الحرارية والذي يفترض أن $\lim_{T\to 0} S = 0$ لأي نظام. هذا التناقض ناتج من أننا حسبنا دالة التجميع بواسطة صيغة التكامل وليس التجميع. وباستخدامنا لهذا التقريب فإننا نهمل (نستبعد) جميع المستويات ذات الطاقة $\varepsilon_i = 0$ عندما $T \to 0$، وهذه المستويات هي السائدة.

2- سوف تظهر لنا معضلة جبس الناتجة من عدم تمييز الجسيمات المجهرية، وسوف نتحدث عنها بالتفصيل بمكان آخر.

IV – أمثلة محلولة

1- نظام يتكون من 4000 جسيمة تتوزع على ثلاثة مستويات طاقة $(\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = \varepsilon, \varepsilon_3 = 2\varepsilon)$ حيث ε ثابت وله وحدات الطاقة، و $g_i = g$.

أ- اوجد عدد الجسيمات بكل مستوى للتوزيع الأكثر احتمالاً، مع العلم أن الطاقة الكلية للنظام تساوي 2300ε.

ب- احسب النسبة بين الاحتمالين، لو أخذنا جسيمتين من n_2 وحُلت واحدة منهما بالمستوى n_1 وأخرى بالمستوى n_3.

الحل

أ- نعلم أن توزيع ماكسويل يستخدم للتوزيع الأكثر احتمالاً ويتحقق من العلاقة:

$$n_i = g_i e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}$$

$$\Rightarrow n_1 = ge^{-\alpha}, \quad n_2 = ge^{-\alpha-\beta\varepsilon}, \quad n_3 = ge^{-\alpha-2\beta\varepsilon}$$

وللتبسيط نضع $x = e^{-\beta\varepsilon}$ فنجد أن $n_2 = n_1 x$ و $n_3 = n_1 x^2$.

وحيث أن مجموع الجسيمات كمية ثابتة، لذلك نجد:

$$n_1 + n_2 + n_3 = n_1 + n_1 x + n_1 x^2 = 4000,$$

$$\Rightarrow \boxed{n_1\left(1 + x + x^2\right) = 4000} \qquad (a)$$

والطاقة الكلية هي أيضاً كميه ثابتة، لذلك نجد:

$$n_1\times 0 + n_2\times\varepsilon + n_3\times 2\varepsilon = n_1\times 0 + n_1 x\times\varepsilon + n_1 x^2\times 2\varepsilon$$

$$= 2300\varepsilon,$$

$$\Rightarrow \boxed{n_1\left(x + 2x^2\right) = 2300} \qquad (b)$$

وبحذف n_1 من المعادلتين (a) و (b) نحصل على المعادلة:

$$57x^2 + 17x - 23 = 0$$

والتي لها الجذران $x = 0.5034$ و $x = -0.802$. وبإهمال القيمة السالبة، لماذا؟ نحصل على:

$$n_1 = \frac{2300}{0.5034 + 2(0.5034)^2} \approx 2277,$$

$$n_2 = n_1 x = 1146,$$

$$n_3 = n_1 x^2 = 577$$

واحتمالية الديناميكا الحرارية لهذا الترتيب هي:

$$\omega_1 = \tilde{\omega} = \frac{g^{4000}}{(2277!)\times(1146!)\times(577!)}$$

ب- احتمالية الديناميكا الحرارية عند أخذ جسيمتين من n_2 ووضع واحدة منها بالمستوى n_1 وأخرى بالمستوى n_3 هي:

$$\omega_2 = \frac{g^{4000}}{(2278!)\times(1144!)\times(578!)}$$

والنسبة بين ω_1 و ω_2 هي:

$$\frac{\omega_2}{\omega_1} = 0.9966$$

من هذا المثال يتضح أن الاحتمالين متساويين تقريباً، وهذا متوقع، حيث أن ω_1 تعتبر القيمة العليا. ولذلك فإن أي تغيير طفيف في النظام لن يغير في قيمتها حيث أننا بحالة الاتزان، أي التوزيع الأكثر احتمالاً.

2 – إذا كانت قيم الطاقة الممكنة لنظام من الجسيمات هي:

$$\varepsilon_i = i\varepsilon, \qquad i = 0,1,2,\cdots$$

أ- احسب دالة التجميع عندما $g_i = g = 1$.

ب- احسب الطاقة المتوسطة لهذه الجسيمات.

ت- اوجد نهاية الطاقة المتوسطة عندما $\varepsilon << k_B T$.

الحل

أ- نعلم أن دالة التجميع تعطي بالعلاقة:

$$Z_{sp} = \sum_{i=0}^{\infty} g_i e^{-\beta\varepsilon_i} = \sum_{i=0}^{\infty} e^{-\beta\varepsilon_i}$$

$$= 1 + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-2\beta\varepsilon} + \cdots$$

$$= 1 + x + x^2 + \cdots, \qquad x = e^{-\beta\varepsilon} < 1$$

$$= \frac{1}{1-x} = \frac{1}{1-e^{-\beta\varepsilon}}$$

حيث أن التجميع هو لمتوالية هندسية لانهائية.

ب- الطاقة المتوسطة لهذه الجسيمات تحسب من العلاقة:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{U}{N} = -\frac{1}{N}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z_N$$

$$= -\frac{1}{N}\frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(\frac{1}{1-e^{-\beta\varepsilon}}\right)^N = -\frac{1}{N}\ln\left(1-e^{-\beta\varepsilon}\right)^{-N}$$

$$= \frac{\partial}{\partial\beta}\ln\left(1-e^{-\beta\varepsilon}\right) = \frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}}{1-e^{-\beta\varepsilon}}$$

$$= \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon}-1}$$

ت- نهاية الطاقة المتوسطة عندما $\varepsilon << k_B T$ تحسب كما يلي:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{\varepsilon}{e^{\beta\varepsilon}-1} \approx \frac{\varepsilon}{\cancel{1} + \beta\varepsilon + \cdots - \cancel{1}} \approx \frac{1}{\beta} = k_B T$$

3 – نظام يتكون من عدد N من المتذبذبات التوافقية، ولكل واحد منها كتله m و تردد ν.

أ- اكتب الهملتونيان واحسب دالة التجميع التقليدية للنظام.

ب- إذا علم أن الطاقة ألاهتزازية هي:

$$E_n = (n + \tfrac{1}{2})h\nu, \qquad n = 0,1,2,\cdots$$

احسب دالة التجميع الكمية، وبرهن على أنه عندما $\frac{h\nu}{k_B T} \to 0$ فإن النتيجة تتطابق مع دالة التجميع التقليدية.

الحل

1- لإحداثي أحادي نجد أن الهملتونيان للنظام يعطي بالمعادلة:

$$\hat{H}(p_x,q_x)=\frac{\hat{p}_x^2}{2m}+\frac{1}{2}m\omega^2\hat{x}^2, \qquad \omega=2\pi\nu$$

ومنها فإن دالة التجميع التقليدية الفردية تحسب كالتالي:

$$Z_{sp}=\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta H}\frac{dp_x dx}{h}=\frac{1}{h}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\beta p_x^2}{2m}}dp_x}_{\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\frac{\beta m w^2 x^2}{2}}dx}_{\sqrt{\frac{2\pi}{\beta m\omega^2}}}$$

$$=\frac{1}{h}\sqrt{\frac{2\pi m}{\beta}}\sqrt{\frac{2\pi}{\beta m\omega^2}}=\frac{1}{\beta\hbar\omega}, \qquad \hbar=\frac{h}{2\pi}$$

ولعدد N من المتذبذبات نجد أن دالة التجميع الكلية هي:

$$Z_N=\left(Z_{sp}\right)^N=\left(\frac{1}{\beta\hbar\omega}\right)^N$$

ب- في ميكانيكا الكم نجد أن طاقة المستويات تعطي بالصورة:

$$E_n=(n+\tfrac{1}{2})h\nu, \qquad n=0,1,2,\cdots$$

أ- وبالتالي فإن دالة التجميع الكمية هي:

$$Z_{sp}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta E_n}=\sum_{n=0}^{\infty}e^{-\beta(n+\frac{1}{2})\hbar\omega}=e^{-\beta\hbar\omega/2}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-n\beta\hbar\omega}$$

$$=e^{-a}\sum_{n=0}^{\infty}e^{-2na}=e^{-a}\left(\frac{1}{1-e^{-2a}}\right),$$

$$=\frac{1}{e^a-e^{-a}}=(2\sinh a)^{-1}$$

حيث $a=\beta\hbar\omega/2$ و استخدمنا مجموع المتوالية الهندسية (انظر الملحق A) بالخطوة الثانية. وعند النهاية $a\to 0$ نجد:

$$\left(e^{a}-e^{-a}\right)^{-1}\approx\left(1+a-1+a\right)^{-1}=\left(2a\right)^{-1}=\frac{1}{\beta\hbar\omega}$$

وهي نفس النتيجة التقليدية.

ولعدد N من المتذبذبات نجد أن دالة التجميع الكلية هي:

$$Z_N=\left(Z_{sp}\right)^N=\left(2\sinh a\right)^{-N}$$



4- نظام، من غاز مثالي، يتكون من عدد N من الذرات الغير مميزة، لكل منها كتلة m، متواجد بداخل اسطوانة لانهائية الارتفاع، نصف قطرها R، في المجال التثاقلي الأرضي فقط. اوجد لهذا النظام:

أ- دالة التجميع،

ب- طاقة هلمهولتز الحرة،

ت- الحرارة النوعية.

الحل

أ- للغاز المثالي الذي يتكون من عدد N من الذرات في اسطوانة نصف قطرها R، فإن الهملتونيان للنظام يعطي بالمعادلة:

$$\hat{H}(p,z)=\left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m}+\frac{\hat{p}_y^2}{2m}+\frac{\hat{p}_z^2}{2m}\right]+mghz,$$

وحجم الإسطوانة هو:

$$\int d^3r=\underbrace{\int dxdy}_{\pi R^2}\int dz=\pi R^2\int dz$$

لذلك فإن دالة التجميع الفردية هي:

$$Z_{sp} = \frac{1}{h^3}\int d^3r\, d^3p\, e^{-\beta\frac{p^2}{2m}-\beta mgz}$$

$$= \frac{\pi R^2}{h^3}\underbrace{\left(\int_0^\infty dz\, e^{-\beta mgz}\right)}_{\frac{1}{\beta mg}}\underbrace{\left(\int_{-\infty}^{\infty} dp_x\, e^{-\beta\frac{p_x^2}{2m}}\right)^3}_{\left(\frac{2\pi m}{\beta}\right)^{3/2}}$$

$$= \frac{R^2}{h^3}\frac{\sqrt{m}}{2}\left(\frac{2\pi}{\beta}\right)^{5/2}$$

وتكون دالة التجميع الكلية للذرات الغير مميزة هي:

$$Z_N = \frac{1}{N!}\left(Z_{sp}\right)^N$$

ب- طاقة هلمهولتز الحرة تصبح:

$$F = Nk_BT\ln Z_N \approx Nk_BT\left[\ln N - 1 - \ln Z_{sp}\right]$$

ت- والحرارة النوعية هي:

$$C_V = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_V = \frac{5}{2}Nk_B$$

5- نظام مثالي يطبق علية إحصاء ماكسويل التقليدي ويتكون من جسيمين متطابقين ومميزين في وعاء ذو حجم V. كل جسيم بإمكانه التواجد في مستويات لها الطاقة $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1\varepsilon, \varepsilon_3 = 2\varepsilon,$ و الانتماءات $g_1 = 2, g_2 = 1, g_3 = 1,$. احسب:

أ- العدد الكلي للحالات المجهرية

ب- دالة التجميع،

ت- الطاقة المتوسطة.

الحل

سوف نفترض هنا أن الجسيمان المميزان هما (a,b) وبالتالي نستطيع ترتيبهم كالتالي، مع ملاحظة أن المستوى الأول له درجة الانتماء $g_1 = 2$:

Energy	Microstates			
	1	2	3	4
2ε	0	0	0	0
ε	0	0	0	0
0	ab | 0	0 | ab	a | b	b | a
E_0 =	0	0	0	0

Energy	Microstates			
	5	6	7	8
2ε	0	0	0	0
ε	b	a	b	a
0	a | 0	b | 0	0 | a	0 | b
E_1 =	ε	ε	ε	ε

Energy	Microstates				
	9	10	11	12	13
2ε	b	a	b	a	0
ε	0	0	0	0	ab
0	a | 0	b | 0	0 | a	0 | b	0 | 0
E_2 =	2ε	2ε	2ε	2ε	2ε

Energy	Microstates		
	14	15	16
2ε	b	a	ab
ε	a	b	0
0	0 | 0	0 | 0	0 | 0
E_3 =	3ε	3ε	$E_4 = 4\varepsilon$

أ- والعدد الكلي للحالات المجهرية في إحصاء ماكسويل يحسب من العلاقة:

العدد الكلي للحالات المجهرية = (عدد مستويات الطاقة)$^{\text{عدد الجسيمات}}$

$$\therefore g^N = (2+1+1)^2 = 4^2 = 16 \text{ microstates}$$

ب- دالة التجميع تحسب كالتالي،

$$\begin{aligned} Z_{MB} &= \sum_{i=0} e^{-\beta E_i} \\ &= 4e^{-\beta E_o} + 4e^{-\beta E_1} + 5e^{-\beta E_2} + 2e^{-\beta E_3} + e^{-\beta E_4} \\ &= 4 + 4e^{-\beta\varepsilon} + 5e^{-2\beta\varepsilon} + 2e^{-3\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon} \end{aligned}$$

ت- والطاقة المتوسطة هي:

$$U_{MB} = -\frac{1}{Z}\frac{\partial Z}{\partial \beta}$$

$$= \frac{4\varepsilon e^{-\beta\varepsilon} + 10\varepsilon e^{-2\beta\varepsilon} + 6\varepsilon e^{-3\beta\varepsilon} + 4\varepsilon e^{-4\beta\varepsilon}}{4 + 4e^{-\beta\varepsilon} + 5e^{-2\beta\varepsilon} + 2e^{-3\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon}} \to \frac{3}{2}\varepsilon \quad (as\ T \to \infty)$$

V - تمارين عامة

1- دالة التجميع لنظام يحقق إحصاء ماكسويل بولتزمان تأخذ الشكل:

$$Z = aVT^4$$

حيث a ثابت. احسب U و Pو S لهذا النظام.

الحل: $U = 4Nk_BT\,,\ P = Nk_BT/V\,,\ S = Nk_B[5 + \ln(aVT^4/N)]$

2- نظام يتكون من عدد N من الإلكترونات. إذا تواجد النظام في مستويين فقط للطاقة وهما $\varepsilon_{\downarrow} = +\varepsilon$ و $\varepsilon_{\uparrow} = -\varepsilon$ مع الشرط $g_1 = g_2 = 1$، تأكد من الحسابات التالية لهذا النظام:

Quantity	Formula
دالة التجميع	$Z_N = 2^N \cosh^N(a), \qquad a = \beta\varepsilon$
طاقة هلمبولتز	$F = -Nk_BT \ln(z) = -Nk_BT \ln\{2\cosh(a)\}$
الإنتروبي	$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = Nk_B \ln\left[\{2\cosh(a)\} - a\tanh(a)\right]$
الطاقة الداخلية	$U = -\left(\frac{\partial \ln Z_N}{\partial \beta}\right)_{V,N} = -N\varepsilon\tanh(a)$
الحرارة النوعية	$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H = -T\left(\frac{\partial^2 F}{\partial T^2}\right)_{V,N} = \frac{Nk_Ba^2}{\cosh^2 a}$

3- نظام يتكون من عدد N من المتذبذبات التوافقية التقليدية، له قوة ارجاع بالشكل $F=-Kx^3$. أذا وضعت $Z_{sp}=A\beta^q$ بالشكل $Z_{\rm sp}$ فاثبت أن $q=-3/4$ و $A=\frac{1}{2}\Gamma\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{4}{K}\right)^{1/4}\sqrt{\frac{2m\pi}{h^2}}$. ومنها اثبت العلاقات التالية:

$$F=-k_BT\ln Z_N=Nk_BT\left[\frac{3}{4}\ln\beta-\ln A\right]$$

$$P=-\left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T=0$$

$$S=-\left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_N=Nk_B\left[\frac{3}{4}\ln\beta+\ln A+\frac{3}{4}\right]$$

$$U=F+TS=\frac{3}{4}Nk_BT$$

$$C_V=-T\left(\frac{\partial^2F}{\partial T^2}\right)_V=\frac{3}{4}Nk_B$$

4- نظام يتكون من عدد N من الجسيمات الغير مميزة مرتبطة بالعلاقة:

$$\varepsilon=c\left|p\right|,$$

حيث $c>1$ ثابت، p هي كمية الحركة، ε هي الطاقة. لهذا النظام اثبت العلاقات التالية:

$$Z_{sp}=\frac{1}{h^3}\underbrace{\int d^3r}_{V}\int d^3p\,e^{-\beta cp}=\frac{V}{h^3}4\pi\left(\int_0^\infty dpp^2e^{-\beta cp}\right)$$

$$=\frac{4\pi V}{h^3}\frac{\partial^2}{\partial(\beta c)^2}\underbrace{\left(\int_0^\infty dpp^2e^{-\beta cp}\right)}_{\left(\frac{1}{\beta c}\right)}=\frac{8\pi V}{h^3}\left(\frac{1}{\beta c}\right)^3,$$

$$Z_N=\frac{1}{N!}Z_{sp}^N$$

$$F=-k_BT\ln Z_N=k_BT\left(N\ln N-N\right)-Nk_BT\ln Z_{sp},$$

$$C_v=\left(\frac{\partial^2F}{\partial T^2}\right)_{N,V}=-Nk_BT\frac{\partial^2}{\partial T^2}(-3T\ln T)$$

$$=3Nk_B$$

5- نظام يتكون من عدد من الجسيمات الغير مميزة مرتبطة بعلاقة طاقة المستويات بالشكل:

$$E_n=n\varepsilon,\qquad n=0,1,2,\ldots$$

و $g_n=n+1$. لهذا النظام تحقق من الأتي:

أ- دالة التجميع:

$$Z_{\rm sp}=\sum_{n=0}^{\infty}g_ie^{-\beta\varepsilon_i}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)e^{-\beta\varepsilon n}=\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n,\quad x=e^{-\beta\varepsilon}$$

$$=\frac{d}{dx}\sum_{m=0}^{\infty}x^m,\qquad m=n+1,$$

$$=\frac{d}{dx}(1-x)^{-1}=(1-x)^{-2}=(1-e^{-\beta\varepsilon})^{-2}$$

ب- الطاقة المتوسطة

$$<E_i>=-\frac{\partial\ln Z}{\partial\beta}=\frac{2\varepsilon}{e^{-\beta\varepsilon}-1}$$

6- باستخدام دالة التجميع الدالة $Z_N=\left(\frac{1}{\beta\hbar\omega}\right)^N$ اشتق الكميات التالية:

$$F=-k_BT\ln Z_N=Nk_BT\ln\left(\beta\hbar\omega\right)$$

$$\mu=k_BT\ln\left(\beta\hbar\omega\right)$$

$$P=0$$

$$S = Nk_B\left[\ln(\beta\hbar\omega) + 1\right]$$

$$U = Nk_BT - 2\left(\frac{1}{2}Nk_BT\right)$$

$$C_P = C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V} = Nk_B$$

7- باستخدام دالة التجميع $Z_N = (2\sinh a)^{-N}$ اشتق الكميات التالية (وذلك بالعلم أن $a = \beta\hbar\omega/2.$ و $\beta = 1/k_BT$):

$$F = -k_BT\ln Z_N = N\left[\frac{\hbar\omega}{2} + k_BT\ln\left(1 - e^{-2a}\beta\hbar\omega\right)\right]$$

$$U = -\frac{\partial}{\partial\beta}\ln Z = N\left(\frac{\hbar\omega}{2}\right)\coth a = N\left[\frac{\hbar\omega}{2} + \frac{\hbar\omega}{e^{2a}-1}\right]$$

$$C_P = C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_{N,V} = Nk_B\frac{e^{2a}}{\left(e^{2a}-1\right)^2}(2a)^2$$

$$S = \frac{U-F}{T} = Nk_B\left[a\coth a - \ln(2\sinh a)\right]$$

وعند النهاية $a \to 0$ اثبت أن

$$U = \frac{1}{2}\hbar\omega + Nk_BT$$

الباب السابع

دالة توزيع السرعات لماكسويل- بولتزمان

الفصل	العنوان	الصفحة
I	التوزيع الإحصائي لسرعة الجزيئات	117
	i حساب السرعة المتوسطة للجزيئات (v_{av})	118
	ii حساب متوسط مربع سرعة الجزيئات $(\overline{v^2})$	119
	iii حساب الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعات للجزيئات (v_{rms})	119
	iv حساب السرعة الأكثر احتمالاً للجزيئات (v_{mps})	120
	v مبدأ تساوي توزيع الطاقة	212
	vi توزيع السرعات باتجاه احد المحاور	122
	vii عدد الجزيئات في مدى سرعة معينة	124
II	تمارين عامة	126

الباب السابع

دالة توزيع السرعات لماكسويل–بولتزمان

Velocity Distribution Function of Maxwell-Boltzmann

نبدأ بدالة التوزيع التقليدية لماكسويل– بولتزمان والمعرفة بالصورة:

$$f(\varepsilon_i)=\frac{N_i}{g_i}=\frac{N}{Z_{sp}}e^{-\beta\varepsilon_i}=\frac{N}{V\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}}e^{-\beta\varepsilon_i}$$

$$=\left(\frac{N}{V}\right)\frac{1}{n_Q}e^{-\beta\varepsilon_i}, \qquad (1)$$

حيث تُعرف $n_Q=\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}$ بالتركيز الكمي للغاز ولها وحدات مقلوب الحجم "m^{-3}"، نجد أن إحصاء ماكسويل– بولتزمان (النظام التقليدي) يتحقق مع فرض أن الغاز مخفف الكثافة (مثالي)، بمعني أن:

$$f(\varepsilon_i)=\frac{N_i}{g_i}<<1 \qquad (2)$$

مثال: لغاز الهيليوم نجد أن الكتلة هي ($m_{He}=6.65\times10^{-27}$ kg) تحت الظروف المعتادة (NTP)، ولذا نجد:

$$n_Q=7\times10^{30}\ m^{-3},$$

$$\frac{N}{V}=\frac{6.02\times10^{26}}{22.4}\approx3\times10^{25}\ m^{-3},$$

$$e^{-\beta\varepsilon}\approx1,$$

وأخيراً

$$\frac{N_i}{g_i}\approx\frac{3\times10^{25}}{7\times10^{30}}\approx4\times10^{-6}.$$

هذه النتيجة تدل على أن في المتوسط مستويات قليلة من المليون هي المملوءة. ولذلك نستطيع التعامل مع غاز الهيليوم على أنه غاز مثالي تحت الظروف المعتادة. ولذلك حينما نجد أن $N_i<<g_i$ فإننا نكون في مدي النظام التقليدي، حيث نعرف أن الغاز المثالي لا تتفاعل جزيئاته مع بعضها.

I– التوزيع الإحصائي لسرعة الجزيئات

سوف نتعامل مع الغازات المثالية باستخدام العلاقة $f(\varepsilon_i)=\frac{N_i}{g_i}=N\frac{e^{-\beta\varepsilon_i}}{Z}$ لنُعرف بها عدد الجسيمات، $dn(\varepsilon)$، التي لها الطاقة المحددة بين القيمتين ε و $\varepsilon+d\varepsilon$ والتي تعطي بالعلاقة:

$$dn(\varepsilon)=N(\varepsilon)d\varepsilon$$

$$=f(\varepsilon)g(\varepsilon)d\varepsilon$$

$$=N\frac{e^{-\beta\varepsilon}}{Z_{sp}}g(\varepsilon)d\varepsilon \qquad (3)$$

وباستخدام كثافة المستويات (راجع الباب الثالث، الفصل *III*) بالشكل:

$$g(\varepsilon)=\frac{4\pi V\sqrt{2}}{h^3}m^{3/2}\varepsilon^{1/2},$$

ودالة التجميع للغاز المثالي:

$$Z_{sp}=V\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2},$$

نجد أن المعادلة (3) تؤول إلي:

$$N(\varepsilon)d\varepsilon = \frac{2\pi N}{(\pi k_B T)^{3/2}} \varepsilon^{1/2} e^{-\beta\varepsilon} d\varepsilon, \qquad (4)$$

وباستخدام طاقة الحركة ومشتقاتها لجسيم بالشكل:

$$\varepsilon = \frac{1}{2} m \, \mathrm{v}^2$$

$$d\varepsilon = m \, \mathrm{v} \, d\mathrm{v}$$

$$\varepsilon^{1/2} d\varepsilon = \frac{1}{\sqrt{2}} m^{3/2} \, \mathrm{v}^2 d\mathrm{v}$$

وذلك بغرض التحويل من توزيع لطاقة الحركة إلي توزيع سرعات، بحيث نصل إلي الشكل النهائي لتوزيع السرعات لماكسويل وهو:

$$d^3\mathrm{v} = 4\pi \mathrm{v}^2 d\mathrm{v}$$

$$dn_{\mathrm{v}} = N(\mathrm{v}) d^3\mathrm{v},$$

$$= N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} e^{-\beta m \mathrm{v}^2/2} d^3\mathrm{v}$$

$$= 4\pi N \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \mathrm{v}^2 e^{-\beta m \mathrm{v}^2/2} d\mathrm{v}. \qquad (5)$$

حيث الكمية dn_{v} تُعرف بأنها متوسط عدد الجسيمات التي لها السرعات المحددة بين القيمتين v و $\mathrm{v}+d\mathrm{v}$. وقد اشتقت المعادلة (5) سابقاً باستخدام فروض نظرية الحركة للغازات. وسوف نستخدم المعادلة (5) لحساب بعض الكميات الفيزيائية للغاز المثالي، كما يلي:

i – حساب السرعة المتوسطة للجزيئات (v_{av}) (Average molecular speed)

تحسب السرعة المتوسطة للجزيئات من العلاقة:

$$\mathrm{v}_{av} = \bar{\mathrm{v}} = \frac{1}{N} \int_0^\infty \mathrm{v} N(\mathrm{v}) d\mathrm{v} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \underbrace{\int_0^\infty \mathrm{v}^3 e^{-a\mathrm{v}^2} d\mathrm{v}}_{\frac{1}{2a^2}},$$

$$= \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\mathrm{v}_{av} = 1.596 \sqrt{\frac{RT}{M}}} \qquad (6)$$

حيث $a = \beta m/2$ و m هي كتلة الجزئ بالكيلوجرام و $M = m \times N_a$ هي الوزن الجزيئي للجزئ بالكيلوجرام\مول.

ii – حساب متوسط مربع سرعة الجزيئات $\left(\overline{\mathrm{v}^2}\right)$

يحسب متوسط مربع سرعة الجزيئات من العلاقة:

$$\overline{\mathrm{v}^2} = \frac{1}{N} \int_0^\infty \mathrm{v}^2 N(\mathrm{v}) d\mathrm{v} = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_B T} \right)^{3/2} \underbrace{\int_0^\infty \mathrm{v}^4 e^{-a\mathrm{v}^2} d\mathrm{v}}_{\frac{3\sqrt{\pi}}{8a^{5/2}}}$$

$$= \frac{3k_B T}{m}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{\overline{\mathrm{v}^2} = \frac{3RT}{M}} \qquad (7)$$

iii – حساب الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعات للجزيئات (v_{rms}) (Root-mean-square speed)

يحسب الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعة الجزيئات من العلاقة:

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_{rms} = 1.732\sqrt{\frac{RT}{M}}} \qquad (8)$$

iv – حساب السرعة الأكثر احتمالاً للجزيئات (v_{mps}) (Most probable speed)

تعرف السرعات الأكثر احتمالاً للجزيئات بأنها السرعة المقابلة للنهاية العظمى للدالة $v^2e^{-av^2}$ **أو الدالة** $\varepsilon^{1/2}e^{-\beta\varepsilon}$. **وتحسب** (v_{mps}) **كالتالي: عند النهاية العظمى فإن التفاضل الأول للدالة يتساوي بالصفر، بمعنى أن:**

$$v_{mps} = \frac{d}{dv}(v^2e^{-av^2})\Big|_{v=v_{mps}} = \left(2v - 2av^3\right)e^{-av^2}\Big|_{v=v_{mps}} = 0, \qquad a = \frac{m}{2k_BT}$$

ومنها نجد مع ثبوت درجة الحرارة:

$$v_{mps} = \sqrt{\frac{1}{a}} = \sqrt{\frac{2k_BT}{m}} = \sqrt{\frac{2RT}{M}} = 1.414\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{v_{mps} = 1.414\sqrt{\frac{RT}{M}}} \qquad (9)$$

هذه السرعات الثلاث: السرعةات الأكثر احتمالاً، السرعة المتوسطة، الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعات لا تختلف قيمها كثيراً عن بعضها ويربطها التناسب الأتي:

$$v_{mps} : v_{av} : v_{rms} = 1.00 : 1.1288 : 1.224$$



شكل (1): السرعة الأكثر احتمالاً للجزيئات (v_{mps}) **، السرعة المتوسطة للجزيئات** (v_{av})**، الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعات للجزيئات** (v_{rms}).

مثال: بمعلومية أن الوزن الجزيئي للنيتروجين عند درجة الحرارة $T = 1000$ K **هو** $M_N = 28\times10^{-3}$ kg/molc**، احسب السرعة المتوسطة، الجذر التربيعى لمتوسط مربع السرعة، السرعات الأكثر احتمالاً للنيتروجين عند درجة الحرارة** $T = 1000$ K.

الحل: باستخدام القوانين (6) و(8) و (9) نجد أن:

$$v_{av} = \sqrt{\frac{8k_BT}{\pi m_N}} = \sqrt{\frac{8RT}{\pi M_N}} = \sqrt{\frac{8\times8.314\times1000}{\pi\times28\times10^{-3}}} \approx 870 \text{ m/s},$$

$$v_{rms} = \sqrt{\frac{3RT}{M_N}} \approx 944 \quad \text{m/s},$$

$$v_{mps} = \sqrt{\frac{2RT}{M_N}} \approx 771 \quad \text{m/s}.$$

واجب منزلي: لتوزيع ماكسويل اثبت أن $\bar{v} \times \left(\overline{\frac{1}{v}}\right) = \frac{4}{\pi}$.

v – مبدأ تساوي توزيع الطاقة (Equipartition of energy principle)

ينص المبدأ على أنه: "لأي مجموعة ديناميكية تتواجد في حالة اتزان حراري عند درجة حرارة معينة T فإن الطاقة الكلية تتوزع بالتساوي على درجات الحرية المختلفة وتكون طاقة كل منها يساوي $\frac{1}{2}k_BT$".

"For every degree of freedom for which the energy is a quadratic function, the mean energy per particle of a system in equilibrium at temperature T is $\frac{1}{2}k_BT$ "

ملاحظة مهمة هنا وهي أن الطاقة المعرفة يجب أن تكون دالة مربعة بالصورة $\varepsilon(q)=aq^2$ حيث q هي درجة الحرية و a ثابت. مثال على ذلك: طاقة الحركة $K.E.=\frac{1}{2}m\mathrm{v}^2$ أو طاقة الوضع للحركة التوافقية البسيطة $P.E.=\frac{1}{2}kx^2$.

ومن السهل إثبات هذا المبدأ باستخدام العلاقة:

$$\bar{\varepsilon}(q)=\frac{\int\varepsilon(q)N(q)dq}{\int N(q)dq}=\frac{\int aq^2e^{-\beta aq^2}dq}{\int e^{-\beta aq^2}dq}$$

$$=\frac{1}{2\beta}=\frac{1}{2}k_BT \qquad (10)$$

vi – توزيع السرعات باتجاه احد المحاور

إذا عرفنا $dn(v_x)$ بمتوسط عدد الجسيمات التي لها السرعات المحددة بين القيمتين v_x و v_x+dv_x، فإننا نستطيع حساب هذه القيمة كالتالي:

$$dn(\mathrm{v}_x)=N(\mathrm{v}_x)d\mathrm{v}_x$$

$$=N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta m\left(\mathrm{v}_x^2+\mathrm{v}_y^2+\mathrm{v}_z^2\right)/2}d\mathrm{v}_yd\mathrm{v}_z$$

$$=N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{3/2}e^{-\beta m\mathrm{v}_x^2/2}d\mathrm{v}_x\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta m\mathrm{v}_y^2/2}d\mathrm{v}_y}_{\sqrt{\frac{2\pi k_BT}{m}}}\underbrace{\int_{-\infty}^{\infty}e^{-\beta m\mathrm{v}_z^2/2}d\mathrm{v}_z}_{\sqrt{\frac{2\pi k_BT}{m}}}$$

$$=N\left(\frac{m}{2\pi k_BT}\right)^{1/2}e^{-\beta m\mathrm{v}_x^2/2}d\mathrm{v}_x \qquad (11)$$

واجب منزلي: تحقق من النتائج التالية:

$1-\overline{\mathrm{v}_x}=0$

$2-\overline{\mathrm{v}_x^2}=\frac{k_BT}{m}$

$3-\overline{\mathrm{v}^2\,\mathrm{v}_x}=\overline{\mathrm{v}_x^2}+\overline{\mathrm{v}_y^2}\,\overline{\mathrm{v}_x}+\overline{\mathrm{v}_z^2}\,\overline{\mathrm{v}_x}=0$

$4-\overline{\mathrm{v}_x^3\,\mathrm{v}_y}=\overline{\mathrm{v}_x^3}\,\overline{\mathrm{v}_y}=0$

$5-\overline{\left(\mathrm{v}_x+b\mathrm{v}_y\right)^2}=\overline{\mathrm{v}_x^2}+2b\,\overline{\mathrm{v}_x}\,\overline{\mathrm{v}_y}+b^2\overline{\mathrm{v}_x^2}=(1+b^2)\frac{k_BT}{m}$

$6-\overline{\mathrm{v}_x^2\,\mathrm{v}_y^2}=\left(\frac{k_BT}{m}\right)^2$

vii – عدد الجزيئات في مدى سرعة معينة

(Molecules in a certain speed range)

لحساب عدد الجزيئات ذات سرعات في مدي محدد، من الضروري أن نكامل دالة توزيع السرعات بين حدود ذالك المدى. على سبيل المثال فإن عدد الجزيئات والتي لها سرعات محددة بين 0 و v يعطي بالعلاقة:

$$N_{0\to \mathrm{v}} = \int_0^{\mathrm{v}} dn_{\mathrm{v}} = \frac{4N}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\mathrm{v}} a^2 \mathrm{v}^2 e^{-a^2\mathrm{v}^2} d\mathrm{v}, \qquad (12)$$

حيث $a = \left(\frac{m}{2kT}\right)^{1/2}$. باستخدام التعويض $x = a\mathrm{v} = \frac{\mathrm{v}}{\mathrm{v}_{mps}}$ حيث $dx = a d\mathrm{v}$ ينتج:

$$N_{0\to \mathrm{v}} = \frac{4N}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x} x^2 e^{-x^2} dx$$

$$= -\frac{2N}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x} x \, d(e^{-x^2})$$

وبالتكامل بالتجزئ ينتج:

$$N_{0\to \mathrm{v}} = -\frac{2N}{\sqrt{\pi}} \left[x e^{-x^2} - \int_0^{x} e^{-x^2} dx \right]$$

$$= N \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x} e^{-x^2} dx - \frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2} \right]$$

$$= N \left[\mathrm{erf}(x) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} x e^{-x^2} \right]$$

حيث $x = \sqrt{\frac{m}{2k_B T}}\,\mathrm{v}$ و $\mathrm{erf}(x) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{x} e^{-x^2} dx$ هي دالة الخطأ (انظر الملحق A).

مثال: احسب عدد الجزيئات لغاز محصور بين السرعتين 0 و v_{mps}.

الحل: نجد هنا أن x تقع بين القيم 0 و 1، بالتالي فإن عدد الجزيئات لغاز محصور بين السرعتين 0 و v_{mps} هو:

$$N_{0\to \mathrm{v}_{mps}} = N \left[\mathrm{erf}(1) - \frac{2}{\sqrt{\pi}} 1 \times e^{-1} \right]$$

$$= N \left[0.8427 - \frac{2}{\sqrt{\pi} \times 2.718} \right]$$

$$= 0.4267\, N$$

وهذه النتيجة تعني أن 42.67% من الجزيئات لها السرعات بين 0 و v_{mps}.

مثال: احسب عدد الجزيئات لغاز محصور بين السرعتين v_{mps} و $1.6\,\mathrm{v}_{mps}$ وسرعته باتجاه المحور السيني فقط.

الحل: عدد الجزيئات والتي لها السرعة ما بين v_{mps} و $1.6\,\mathrm{v}_{mps}$ يعرف كالتالي:

$$N_{\mathrm{v}_{mp}\to 1.6\mathrm{v}_{mp}} = \int_{\mathrm{v}_{mp}}^{1.6\mathrm{v}_{mp}} f(\mathrm{v}_x) d\mathrm{v}_x, \qquad f(\mathrm{v}_x) d\mathrm{v}_x = \frac{N}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{m}{2kT}\right)^{1/2} e^{-m\beta \mathrm{v}_x^2/2} d\mathrm{v}_x$$

باستخدام التعويض

$$x = \frac{\mathrm{v}_x}{\mathrm{v}_{mps}} \quad \Rightarrow \quad d\mathrm{v}_x = \mathrm{v}_{mps} dx,$$

ومنها نجد:

$$N_{\mathrm{v}_{mp}\to 1.6\mathrm{v}_{mp}} = \frac{N}{\sqrt{\pi}} \int_1^{1.6} e^{-x^2} dx = \frac{N}{2} \left[\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{1.6} e^{-x^2} dx - \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{1} e^{-x^2} dx \right]$$

$$= \frac{N}{2} \left[\mathrm{erf}(1.6) - \mathrm{erf}(1) \right] = \frac{N}{2} \left[0.9763 - 0.8427 \right] = 0.0668\, N$$

II تمارين عامة

1- بمعلومية أن الوزن الجزيئي للهيليوم عند درجة الحرارة $T=0\,\mathrm{K}$ هو $M_{He}=4.003\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mole}$، احسب السرعة المتوسطة، الجذر التربيعي لمتوسط مربع السرعة، السرعة الأكثر احتمالاً للهيليوم عند درجة الحرارة $T=0\,\mathrm{K}$. الحل: $v_{av}\approx1203\ \mathrm{m/s},\ v_{rms}\approx1303\ \mathrm{m/s},\ v_{mps}\approx1064\ \mathrm{m/s}$

2- احسب السرعة المتوسطة، الجذر التربيعي لمتوسط مربع السرعة، السرعة الأكثر احتمالاً لجزيئات الأوكسجين عند درجة الحرارة $T=300\,\mathrm{K}$.(استخدم الوزن الجزيئي للأوكسجين $M_{O_2}=32\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mole}$).

الحل: $v_{av}=446\ \mathrm{m/s},\ v_{rms}=484\ \mathrm{m/s},\ v_{mps}=395\ \mathrm{m/s}$

3- احسب السرعة المتوسطة، الجذر التربيعي لمتوسط مربع السرعة، السرعة الأكثر احتمالاً لغاز الأمونيا عند درجة الحرارة $T=300\,\mathrm{K}$. استخدم الوزن الجزيئي للأمونيا $M_{Am}=17\times10^{-3}\ \mathrm{kg/mole}$.

الحل: $v_{av}=611.2\ \mathrm{m/s},\ v_{rms}=663.4\ \mathrm{m/s},\ v_{mps}=541.7\ \mathrm{m/s}$

4- لأي قيم من السرعات يكون توزيع ماكسويل للسرعات له نصف القيمة العليا؟

الحل: $2.31\sqrt{\frac{k_BT}{m}},\ 0.682\sqrt{\frac{k_BT}{m}}$.

5- احسب عدد الجزيئات لغاز محصور بين السرعتين 0 و $1.2\,v_{mps}$ وسرعته باتجاه المحور السيني فقط.

6- اثبت أن عدد الجزيئات لغاز محصور بين السرعتين v_x و ∞ وسرعته باتجاه المحور السيني فقط يعطي بالمعادلات:

$$N_{0\to x}=\frac{N}{2}\mathrm{erf}(x),\qquad N_{0\to\infty}=\frac{N}{2}$$

$$N_{x\to\infty}=N_{0\to\infty}-N_{0\to x}=\frac{N}{2}\left[1-\mathrm{erf}(x)\right]$$

الباب الثامن

دالة التجميع للجزيئات ثنائية الذرات

STATISTICAL MECHANICS OF DIATOMIC GASES

الفصل	العنوان	الصفحة
I	النمط الاهتزازي	130
II	النمط الدوراني	133
	i درجات الحرارة المنخفضة	135
	ii درجات الحرارة المرتفعة	136
III	تمارين عامة	140

الباب الثامن

دالة التجميع للجزيئات ثنائية الذرات

Statistical Mechanics OF Diatomic Gases

نحن نعلم أن الغازات المثالية أحادية الذرات لها ثلاث درجات حرية مرتبطة بالحركة الانتقالية. ومنها، ومن قانون التوزيع المتساوي للطاقة على درجات الحرية، وُجد أن متوسط الطاقة الحركية لمول واحد تعطي بالعلاقة:

$$u = \frac{3}{2}RT \qquad (1)$$

والحرارة النوعية تُعطى بالعلاقة:

$$c_V = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V = \frac{3}{2}R \qquad (2)$$

ولحساب الكميات الفيزيائية السابقة للجزيئات، يجب أن نعرف طبيعة القوى التي أدت إلى تكوين الجزيئات من الذرات المنفصلة. وكما نعلم أن الجزيئات مركبات ثابتة (مستقرة) تتكون من ذرتين أو أكثر، وقد تم التعامل معها عن طريق نظرية الكم. وقد وجد أن الطاقة الكلية للجزئ ناتجة من مجموع الطاقات التالية:

1- طاقه حركة انتقالية (Translation kinetic energy, E_{trans}) لمركز ثقل الجزئ.

2- طاقة الإثارة (Excitation energy, E_{excit}) لإليكترونات ذرات الجزئ.

3- الطاقة الاهتزازية (التذبذبية) (Vibrational energy, E_{vib}) لأنوية الجزيء على طول المحور الممتد بينهما.

4- طاقة الحركة الدورانية (Rotational energy, E_{rot}) للذرات حول مركز ثقل النواة.

ولهذا فإن الطاقة الكلية تكون على الشكل:

$$E_{\text{total}} = E_{trans} + E_{excit} + E_{rot} + E_{vib} \qquad (3)$$

وتصبح دالة التجميع الكلية للجزئ على الصورة:

$$Z_{sp} = \sum e^{-\beta E_{Total}}$$

$$= \left(\sum e^{-\beta E_{trans}}\right)\left(\sum e^{-\beta E_{excit}}\right)\left(\sum e^{-\beta E_{rot}}\right)\left(\sum e^{-\beta E_{vib}}\right)$$

$$= z_{trans} z_{excit} z_{rot} z_{vib} \qquad (4)$$

وتتحول المسألة إلى حساب دالة التجميع لكل نمط من أنماط الطاقة على حدة، مع ملاحظة أن الطاقات الداخلية كلها، ماعدا طاقه الحركة الانتقالية، هي طاقات مكممة وغير متصلة.

ولتبسيط حساب دالة التجميع الفردية سوف نقترح الفروض التالية:

1- سنفترض أن الحركات الداخلية (إلكترونية ،اهتزازية، دورانية) حركات مستقلة، بمعنى أنها لا تؤثر على بعضها البعض.

2- انعدام تأثير الحركة الاهتزازية على طبيعة الحركة الدورانية ولذا فإن عزم القصور للجزئ سوف يعتبر كمية ثابتة.

3- فرق الطاقة في الانتقالات الإلكترونية المثارة يتطلب درجات حرارة مرتفعة،

$$\Delta E_{excit} \approx 1\,\text{eV} \approx 10^4 K$$

بالتالي يمكن إهماله. وذلك مقارنةً بدرجة حرارة الغرفة $T = 300\ \text{K}$ والتي تكافئ $0.03\ \text{eV}$.

4- وحيث أنه وُجد عملياً أن فرق الطاقات في النمط الاهتزازي والدوراني تقريباً هو :

$$\Delta E_{rot} \approx 10^{-4}, \qquad \Delta E_{vib} \approx 10^{-3}\text{eV to } 10^{-1}\text{eV}$$

ولذلك فإنه من السهل أن نجد أعداد لابأس بها من المستويات الاهتزازية والدورانية في درجة حرارة الغرفة، كما هو بالشكل (1).

I – النمط الاهتزازي (Vibrational mode)

يُكتب الهملتونيان للمتذبذب التوافقي البسيط ذو الكتلة m والتردد الزاوي $\omega = 2\pi f$، على الصورة:

$$H(p_x, x) = \frac{p_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m\omega^2 x^2 \qquad (1)$$

حيث p_x هي كمية الحركة الخطية باتجاه المحور X و x هي الإزاحة عن وضع الاتزان.
وباستخدام ميكانيكا الكم وجد أن مستويات طاقته الاهتزازية المميزة هي:

$$\varepsilon_j = (j + \frac{1}{2})\hbar\omega, \qquad j = 0,1,2,\cdots \qquad (2)$$

من المعادلة (2) والشكل (1) نجد الملاحظات التالية:

1- الفرق بين مستويات الطاقة المتتالية متساوي وهو $\varepsilon_{j\pm1} - \varepsilon_j = \pm\hbar\omega$.

2- طاقة المستوى الأرضي هي $\hbar\omega/2$، وتسمى طاقة الصفر.

3- مستويات الطاقة وحيدة الانتماء، بمعنى أن $g_i = 1$ لكل قيم i.



شكل (1) مستويات الطاقة للنمط الاهتزازي والدوراني للجزيئات ثنائية الذرات.

4- ودالة التجميع الفردية تحسب كالتالي:

$$z_{vib} = \sum_j e^{-\beta\varepsilon_j} = e^{-\frac{1}{2}\beta\hbar\omega}\left(e^0 + e^{-\beta\hbar\omega} + e^{-2\beta\hbar\omega} + \cdots\right)$$

$$= e^{-a}\left(e^0 + e^{-2a} + e^{-4a} + \cdots\right),$$

$$= \frac{e^{-a}}{1 - e^{-2a}} = \frac{1}{e^a - e^{-a}} = (2\sinh a)^{-1} \qquad (3)$$

حيث

$$a = \frac{1}{2}\beta\hbar\omega = \frac{\hbar\omega}{2k_B T} = \frac{\theta_{vib}}{2T}, \qquad (4)$$

وقد استخدمنا $\theta_{vib} = \frac{\hbar\omega}{k_B}$ ومجموع المتوالية الهندسية (انظر الملحق A).

5- ولحساب الطاقة الداخلية نجد أنه من المعادلة (3):

$$U_{vib} = -\left(\frac{\partial \ln Z_{vib}}{\partial\beta}\right)_{V,N} = -\left(\frac{\partial \ln (z_{vib})^N}{\partial\beta}\right)_{V,N}$$

$$= N\hbar\omega\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2a} - 1}\right] \qquad (5)$$

وعند درجات الحرارة المنخفضة، حيث $\frac{1}{2a} << \frac{1}{2}$، نجد أن:

$$U_{vib} = N\hbar\omega\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{\cancel{1} + 2a - \cancel{1}}\right] \approx N\hbar\omega\left[\frac{1}{2} + \cdots\right]$$

$$\approx \frac{1}{2} N\hbar\omega, \qquad (6)$$

وعند درجات الحرارة المرتفعة، حيث $\frac{1}{2a} >> \frac{1}{2}$، نجد أن:

$$U_{vib} = N\hbar\omega\left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/k_BT} - 1}\right] \approx N\hbar\omega\left[\frac{1}{2a}\right]$$
$$\approx Nk_BT, \qquad (7)$$

وهي النتيجة التقليدية المشهورة. وبالتالي، فعند درجات الحرارة المرتفعة نجد أن المستويات المثارة العليا هي الممتلئة. ومن ثم فإن استخدام ميكانيكا الكم يصبح غير منطقي عندما تكون $k_BT >> \hbar\omega$.

6- ونحسب الحرارة النوعية من المعادلة (5) كالتالي:

$$C_{vib} = \left(\frac{\partial U_{vib}}{\partial T}\right)_{V,N}$$
$$= Nk_B\left(\frac{\theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_{vib}/T}}{\left(e^{\theta_{vib}/T} - 1\right)^2} \qquad (8)$$

الشكل (2) يعبر عن تغير الحرارة النوعية C_{vib} مقابل درجة الحرارة المطلقة في النمط الاهتزازي. كما يتضح من الشكل أن في المنطقة التقليدية تكون الحرارة النوعية ثابتة، وتساوي R ، وتقل أسياً حتى تصل إلى الصفر عندما تؤول T إلى الصفر المطلق.



شكل(2): تغير الحرارة النوعية C_{vib} مقابل درجة الحرارة المطلقة

مثال: احسب الحرارة النوعية الاهتزازية c_{vib} لكل مول من جزئ النيتروجين N_2 عند درجة الحرارة 1000 K إذا عُلم أن $\hbar\omega = 0.29$ eV. وقارنها بالقيمة العملية وهي $3.43\ \text{J mole}^{-1}\ \text{K}^{-1}$.

الحل: أولا يجب أن نحسب θ_{vib} حتى نستطيع أن نقرر ما إذا كانت درجة الحرارة 1000 K تقع في مدى المنطقة الكمية أو في مدى المنطقة التقليدية (التقليدية)، فنجد:

$$\theta_{vib} = \frac{\hbar\omega}{k_B} = \frac{0.29\times1.6\times10^{-19}\ \text{J}}{1.38\times10^{-23}\ \frac{\text{J}}{\text{K}}} = 3362\ \text{K}$$

ولهذا فإن درجة الحرارة 1000 K تعتبر في المنطقة الكمية حيث أنها أصغر من 3362 K. وباستخدام $x = \frac{3362}{1000} = 3.362$ نجد أن:

$$c_{vib} = R\left(\frac{\theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_{vib}/T}}{\left(e^{\theta_{vib}/T} - 1\right)^2}$$
$$= 8.31x^2\frac{e^x}{\left(e^x - 1\right)^2} = 3.49\ \text{J mole}^{-1}\ \text{K}^{-1}$$

وهي متفقة مع القيمة العملية، ولكنها صغيرة مقارنةً بالقيمة التقليدية:

$$c_{vib} = R = 8.314\ \text{JK}^{-1}\text{mol}^{-1}$$

II- النمط الدوراني (Rotational mode)

تُعرف طاقة الحركة الدورانية تقليدياً بالعلاقة:

$$\text{K.E.} = \frac{1}{2}I\omega^2 = \frac{(I\omega)^2}{2I} = \frac{L^2}{2I} \qquad (1)$$

حيث L هي كمية الحركة المدارية و I هو عزم القصور الذاتي حول محور مار بمركز ثقل الجزئ الثنائي وباستخدام العلاقات $m_1r_1 = m_2r_2$ ، $r_o = r_1 + r_2$ والمعرفة بالشكل (3):



شكل (3) الحركة الدورانية للجـزيء ثنائي الذرات حول محور يمر بمركـز ثقلهما.

ونجد أن عزم القصور الذاتي حول محور مار بمركز ثقل الجزئ الثنائي هو:

$$I = m_1 r_1^2 + m_2 r_2^2 = \mu r_o^2, \qquad (2)$$

حيث: $\mu = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}$ هي الكتلة المختزلة.

وتبعاً لقوانين ميكانيكا الكم فإن طاقة المستويات الدورانية يعرف بالعلاقة:

$$\varepsilon_r = \frac{L^2}{2I} = \frac{\hbar^2}{2I} l(l+1), \qquad l = 0,1,2,\cdots \qquad (3)$$

حيث l عدد كمي يحدد كمية الحركة المدارية بالنسبة إلى مركز ثقل الجزئ، ولها التعددية $g_l = (2l+1)$. وعند تغير الحالات الكمية الدورانيـة، يتبـع العـدد قاعـدة الانتقـاء: $\Delta l = \pm 1$.

ولهذا النمط الدوراني فإن دالة التجميع الدورانية الفردية تحسب كالتالي:

$$z_{rot} = \sum_l g_i e^{-\beta\varepsilon_l}$$
$$= \sum_l (2l+1) e^{-\beta\varepsilon_l} = \sum_l (2l+1) e^{-l(l+1)\theta_{rot}/T}, \qquad (4)$$

حيث استخدمنا $\theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B}$. والجدول التالي يعرض قيم θ_{vib} و θ_{rot} لبعض الجزيئات المهمة.

جزيء	$\theta_{vib} = \frac{\hbar w}{k_B}$ (K)	$\theta_{rot} = \frac{\hbar^2}{2Ik_B}$ (K)
الهيدروجين H_2	6140	85.4
الأكسوجين O_2	2260	2.1
النيتروجين N_2	3352	2.9
الكلور Cl_2	810	0.0347

ونظراً لصعوبة حساب صيغة التجميع في المعادلة (4)، لهذا فسوف ندرسها تقريبياً في حالتين وهما:

i- درجات الحرارة المنخفضة $T << \theta_{rot}$

مع وجود الشرط $T << \theta_{rot}$ نجد أن $k_B T << \frac{\hbar^2}{2I}$ وهذا أيضاً يتطلـب أن $\frac{\beta\hbar^2}{2I} >> 1$.

وعند درجات الحرارة المنخفضة، منطقة ميكانيكا الكم، نجد أن أعداد قليلة من المستويات الدورانية الأولية تصبح مهمة ولهذا سنكتفي بالحدين الأولين من التجميع، وتـصبح دالـة التجميع $z_{rot,Q}$، حيث الرمز Q يدل على منطقة ميكانيكا الكم، بالصورة:

$$z_{rot,Q} = \sum_l (2l+1) e^{-\beta\varepsilon_r}$$
$$= 1 + 3e^{-2\theta_{rot}/T} = 1 + 3e^{-\beta\hbar^2/I}, \qquad (5)$$

ومنها نجد أن الطاقة الداخلية:

$$U_{rot,Q} = -\frac{1}{z_{rot,Q}}\frac{\partial z_{rot,Q}}{\partial \beta} = -\frac{1}{1+3e^{-\beta\hbar^2/I}} \times \left(-3\hbar^2/I\right)e^{-\beta\hbar^2/I}$$

$$= \frac{\left(3\hbar^2/I\right)}{e^{\beta\hbar^2/I} + \not{3}}$$

$$\approx \left(\frac{3\hbar^2}{I}\right)e^{-\beta\hbar^2/I}$$

$$= 6Nk_B\theta_{rot}e^{-2\theta_{rot}/T}, \qquad (6)$$

والحرارة النوعية تحت حجم ثابت هي:

$$C_{V,rot,Q} = \left(\frac{\partial U_{rot,Q}}{\partial T}\right)_V = \left(\frac{3\hbar^2}{I}\right)\frac{\partial e^{-\hbar^2/k_BTI}}{\partial T}$$

$$= \left(\frac{3\hbar^2}{I}\right)\left(\frac{\hbar^2}{Ik_BT^2}\right)e^{-\hbar^2/k_BTI}$$

$$= 3Nk_B\left(\frac{2\theta_{rot}}{T}\right)^2 e^{-2\theta_{rot}/T} \qquad (7)$$

ii– درجات الحرارة المرتفعة $T >> \theta_{rot}$

مع وجود الشرط $T >> \theta_{rot}$ نجد أن $k_BT >> \frac{\hbar^2}{2I}$ وهذا أيضاً يتطلب أن $\frac{\beta\hbar^2}{2I} << 1$.

لذلك فإنه عند درجات الحرارة المرتفعة نجد أن أعداد كبيرة من المستويات الدورانية تصبح مهمة . ولهذا سوف نستعيض عن التجميع بالمعادلة (4) بالتكامل. ولهذا تأخذ دالة التجميع الفردية $z_{rot,C}$ الشكل:

$$z_{rot,C} = \int_0^\infty (2l+1)e^{-l(l+1)\theta_{rot}/T}\,dl$$

$$\approx \int_0^\infty (2l+1)e^{-l(l+1)\theta_{rot}/T}\,dl \qquad (8)$$

والرمز C يدل على المنطقة التقليدية. وباستخدام التعويض التالي:

$$x = l(l+1) \quad \Rightarrow \quad dx = 2l+1$$

نجد أن المعادلة (8) تؤول إلي:

$$z_{rot,C} = \int_0^\infty e^{-\beta\hbar^2x/2I}\,dx = \frac{2I}{\beta\hbar^2}e^{-\beta\hbar^2x/2I}\Big|_0^\infty$$

$$= \frac{2I}{\beta h^2} = \frac{T}{\theta_{rot}} \qquad (8.a)$$

ومن (8.a) نجد أن:

$$U_{rot,C} = \frac{\partial \ln\left(z_{rot,C}\right)}{\partial\beta} = Nk_BT, \qquad (9)$$

$$C_{V,rot,C} = Nk_B = nR \qquad (10)$$

وهي النتيجة التقليدية المشهورة.

وقبل أن نختتم الحديث عن هذا الموضوع نود أن ننوه أن دالة التجميع الدورانية يجب أن تُقسَم على معامل خاص بتماثل الجزيئات، وهو المعامل σ، ويسمى عدد التماثل (Symmetry number). وللجزيئات متجانسة النواة (Homonuclear) مثل $Q_2, H_2, N_2, \cdots$ نجد أن $\sigma = 2$ وللجزيئات مختلفة النواة مثل HCl, ... فإن $\sigma = 1$. ويصبح الشكل النهائي لدالة التجميع على الصورة:

$$z_{rot} = \frac{z_{rot,C}}{\sigma}, \qquad (11)$$

$$z_{rot} = \frac{z_{rot,Q}}{\sigma}, \qquad (12)$$

ولن نتعرض لهذا التعريف حيث أنه بعيد عن تخصص هذا الكتاب.

مثال: احسب θ_{rot} لجزئ النيتروجين N_2 إذا عُلم أن $r_o = 1.0976\times10^{-10}$ m.

الحل: نعلم أن كتلة جزئ النيتروجين N_2 هي:

$$m = \frac{14.008}{6.023\times10^{26}} = 2.325\times10^{-26}\ \text{kg},$$

ومنها نجد أن $\mu = m/2 = 1.163\times10^{-26}$ kg, و

$$I = \mu r_o^2$$

$$= 1.163\times10^{-26}\ \text{kg} \times \left(1.0976\times10^{-10}\ \text{m}\right)^2 = 14\times10^{-47}\ \text{kg.m}^2.$$

بالتالي فإن:

$$\theta_{rot} = \frac{h^2}{8\pi^2 I k_B}$$

$$= \frac{\left(6.625 \cdot 10^{-36}\ \mathrm{J\cdot s}\right)^2}{8\pi^2 \times 14\times10^{-47}\ \mathrm{kg.m^2} \times 1.38\times10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molecule.K}}} = 2.88\ \mathrm{K}$$

مثال: احسب دالة التجميع، تقليدياً وكمياً، لجزئ الهيدروجين H_2 عند درجة الحرارة 300 K إذا عُلم أن $I = 6.29\times10^{-48}\ \mathrm{kg.m^2}$.

الحل: أولا يجب أن نحسب θ_{rot} لنستطيع أن نقرر ما إذا كانت درجة الحرارة في المنطقة الكَمية أو المنطقة التقليدية، لذلك:

$$\theta_{rot} = \frac{h^2}{8\pi^2 I k_B}$$

$$= \frac{\left(6.625\times10^{-36}\ \mathrm{J\cdot s}\right)^2}{8\pi^2 \times 6.29\times10^{-48}\mathrm{kg.m^2} \times 1.38\times10^{-23}\ \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{molecule.K}}} = 64.03\ \mathrm{K}$$

ومنها نجد أن دالة التجميع التقليدية هي:

$$z_{rot,C} = \frac{T}{\theta_{rot}} = \frac{300}{\theta_{rot}} = \frac{300}{64.03} = 4.69$$

وباستخدام صيغة الجمع نجد أن:

$$z_{rot,Q} = \sum_{l=0}^{\infty}(2l+1)e^{-l(l+1)\theta_{rot}/T}$$

$$= 1.000 + 3e^{-2\times64.03/300} + 5e^{-6\times64.03/300} + \cdots$$

$$= 1.000 + 1.958 + 1.389 + 0.540 + 0.126 + \cdots \approx 5.001$$

ولنا هنا بعض الملاحظات التالية على النتيجتين السابقتين:

1- مساهمة كل حد من قيم l في التجميع لها قيمة قصوى عند $l = 1$ وبعد ذلك تتناقص بسرعة مع زيادة l.

2- التناقص في قيم الحدود العليا ناتج عن المعامل $-l(l+1)$ بالدليل (الأس).

3- الفرق بين القيمة التقليدية والقيمة الكَمية ناتج من استخدامنا للتكامل بدلاً من التجميع وهذا يعني أن النسبة $\left(\frac{\theta_{rot}}{T} = \frac{64.03}{300}\right)$ مازالت لها قيمة محسوسة ومؤثرة في الحسابات.

ملخص لما سبق:

لجزئ ثنائي الذرة وجدنا أن دالة التجميع الفردية تأخذ الشكل:

$$Z_{sp} = z_{trans} z_{rot} z_{vib} = V\left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} \times z_{rot} \times z_{vib}$$

والحرارة النوعية الكلية تكتب على الصورة:

$$C_V = C_{V,tr} + C_{V,rot} + C_{V,vib}$$

$$= \frac{3}{2}Nk_B + Nk_B + Nk_B\left(\frac{\theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_{vib}/T}}{\left(e^{\theta_{vib}/T} - 1\right)^2}$$

وعند درجة حرارة الغرفة نجد أن فرق الطاقة بين مستويات الطاقة الدورانية لمعظم الجزيئات ثنائية الذرة أصغر بكثير من $k_B T_{room}$، ولكن فرق الطاقة بين مستويات الطاقة



شكل (4) تغير الحرارة النوعية مع درجة الحرارة المطلقة للأنماط المختلفة للجزيئات ثنائية الذرات.

الاهتزازية أكبر بكثير من $k_B T_{room}$. وهذا يعني أن السعة الحرارية عند درجة حرارة الغرفة هي $\frac{5}{2}R$ لكل مول: منها $\frac{1}{2}R$ من الحركة الانتقالية، و R من الحركة الدورانية. وتعتبر مساهمة الحركة الاهتزازية للسعة الحرارية عند درجة حرارة الغرفة شبه منعدمة وتأتي مساهمتها فقط عند درجات الحرارة المرتفعة، كما بالشكل (4).

III– تمارين عامة

1- باستخدام $z_{vib} = (2\sinh a)^{-1}$ تحقق من النتائج بالجدول التالي وارسمها.

Quantity	Formula	$T \to \infty$
دالة التجميع	$Z_{vib} = (z_{vib})^N = (2\sinh a)^{-N}$	$(\frac{k_B T}{\hbar\omega})^N$
طاقة هلمهولتز	$F = -k_B T \ln Z_{vib}$ $= Nk_B T \ln(2\sinh a)$	$F = Nk_B T \ln(\beta\hbar\omega)$
الإنتروبي	$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N}$ $= Nk_B \left[a\coth a - \ln(a\sinh a)\right]$	$S = Nk_B \left[1 - \ln(\beta\hbar\omega)\right]$
الطاقة الداخلية	$U_{vib} = N\hbar w \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2a} - 1}\right]$	$Nk_B T = nRT$
الحرارة النوعية الإهتزازية	$C_{vib} = Nk_B \left(\frac{\theta_{vib}}{T}\right)^2 \frac{e^{\theta_{vib}/T}}{\left(e^{\theta_{vib}/T} - 1\right)^2}$	$Nk_B = nR$

الباب التاسع

إحصاء المواد المغناطيسية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	الوصف النوعي للتمغنط	144
II	الوصف الكمي للتمغنط	145
III	نظرية لانجفن للمغناطيسية	147
	i حساب الطاقة الداخلية	150
	ii حساب الحرارة النوعية	151
	iii حساب الإنتروبي	152
	iv حساب العزم المغناطيسي الكلي $\overline{M}$	153
IV	ملحق (9.A) العزم المغناطيسي لثنائي القطب	154

الباب التاسع

إحصاء المواد المغناطيسية

Statistics of Magnetic Materials

ترجع أهمية المواد المغناطيسية لاستخدامها في جميع الأجهزة الكهربائية القديمة والحديثة، مثل ذاكرة الكمبيوتر والدوائر المنطقية التي تعتمد على مفاتيح الفتح والفصل المغناطيسية. ولهذا أصبح من الأهمية دراسة خواص المواد المغناطيسية من الناحية التجريبية والنظرية. وهذا الموضوع المهم لن يتسع هذا الباب لاستعراضه بالتفصيل ولذا سنتعرض له بصورة مبسطة.

يمكن تصنيف الحاله المواد المغناطيسية إلى الحالات النيسيه التاليه:

1- بارامغناطيسية (Paramagnetic)

2- دايامغناطيسية (Diamagnetic)

3- فيرومغناطيسية (Ferromagnetic)

4- فيريمغناطيسية (Ferrimagnetic)

5- مواد مضادة_للفيرومغناطيسية (Antiferromagnetic)

وفي تصنيف حالة المواد من ناحية خواصها المغناطيسية نود أن نوضح أن النظرية التقليدية تنسب جميع المجالات المغناطيسية للمواد إلى حركة شحناتها الكهربائية. بالمقياس الذري، فإن الذرات المنفصلة ينشأ عنها مجالات مغناطيسية حينما تمتلك إلكتروناتها عزم مغناطيسي μ، يسمى عزم ثنائي القطب، ناتج من كمية حركتهم الدورانية μ_l أو المغزلية μ_s أو الاثنين معاً $(\mu = \mu_l + \mu_s)$ (انظر الملحق $9.A$). والعزوم المغناطيسية الناتجة عن الحركتين المدارية والمغزلية للإلكترونات يلغي بعضها البعض في أغلب الذرات. وإذا لم يكن التلاشي في العزوم تاماً فإن المادة عندئذ تُسمى بارامغناطيسية.

وسوف نتعامل هنا ونفسر الظواهر المرتبطة بالمواد البارامغناطيسية فقط، مثل الألمونيوم والتيتانيوم، وهي المواد التي تنجذب للمناطق القوية في المجال المغناطيسي. ونبدأ هنا ببعض التعريفات التي دائماً ما نجدها عندما نتعامل مع المواد المغناطيسية أولها:

التمغنط (Magnetization, M) ويعرف بأنه العزم المغناطيسي لوحدة الحجوم من المادة الممغنطة عند نقطة ما. فإذا تواجد عدد $n = \frac{N}{V}$ من الذرات لوحدة الحجوم تمتلك كل منها عزماً ثنائياً مغناطيسياً μ باتجاه ما، فإن:

$$M = n\mu$$

وعادةً تقاس الخواص المغناطيسية للمادة بمدى تأثرها بالمجال المغناطيسي الخارجي وتُسمى هذه الخاصية ***بالقابلية المغناطيسية*** (Magnetic susceptibility, χ) لوحدة الحجوم وتعريفها هو:

$$\chi = \frac{M}{H}$$

حيث H هو الشدة المغناطيسية الخارجية. وقد وجد عند درجات الحرارة المرتفعة أن $\chi \propto \frac{1}{T}$ حيث T هي درجات الحرارة المطلقة وتعرف هذه العلاقة بقانون كوري. والشكل (1) يظهر ثلاث أنواع من المواد المغناطيسية المهمة وخواصها ومدى تأثرها بالمجال المغناطيسي الخارجي.



شكل (1) ملخص للصفات المغناطيسية لبعض المواد.

I- الوصف النوعي للتمغنط

(Qualitative description of magnetization)

عند التأثير بمجال مغناطيسي خارجي H، كما بالشكل 1،على الذرات ذات العزم المغناطيسي ثنائي القطب μ (μموجب) فإن العزوم المغناطيسية μ تترتب إما موازية لاتجاه المجال $\mu_{\uparrow}$، ولها الطاقة المغناطيسية $\varepsilon_{\uparrow} = \mu_{\uparrow} \cdot H = -\mu \cdot H$ أو عكس اتجاه المجال $\mu_{\downarrow}$، ولها الطاقة المغناطيسية $\varepsilon_{\downarrow} = \mu_{\downarrow} \cdot H = \mu \cdot H$.



الشكل(1) يصف وضع ثنائي القطب في مجال مغناطيسي خارجي

ويمكن تلخيص ذلك بالجدول التالي،

المستوي	الشرط	الطاقة المغناطيسية	احتمالية التوزيع
$(\uparrow)$	$\mu\uparrow H\uparrow$	$\varepsilon_{\uparrow} = -\mu H$	$P_{\uparrow} = Ce^{\beta\mu H}$
$(\downarrow)$	$\mu\downarrow H\uparrow$	$\varepsilon_{\downarrow} = \mu H$	$P_{\downarrow} = Ce^{-\beta\mu H}$

حيث يوضح الجدول وضع مستوى ثنائي القطب بالنسبة للمجال الخارجي، وطاقة المستوى واحتمالية تواجد ثنائي القطب بالمستويات باستخدام توزيع ماكسويل- بولتزمان التقليدي.

ونستطيع أن نلخص الجدول السابق كالتالي:

1- $\varepsilon_{\uparrow}$ هي طاقة المستوى الأدنى والتي يكون فيها احتمال وجود الذرات هو المفضل.

2- $\varepsilon_{\downarrow}$ هي طاقة المستوى الأعلى والتي يكون فيها احتمال وجود الذرات هو الأقل تفضيلاً.

II- الوصف الكمي للتمغنط

(Qualitative description of magnetization)

ولحساب الصفات المغناطيسية للمواد دعونا نعرف النسبة η بالصيغة التالية:

$$\eta = \beta\mu H = \frac{\mu H}{k_B T} = \frac{\text{(magnetic) potential energy}}{\text{(thermal) translational energy}}$$

وهي نسبة عديمة الوحدات حيث أنها تقيس النسبة بين طاقتين: الأولى هي الطاقة المغناطيسية (μH) المسئولة عن محاذاة العزم المغناطيسي مع المجال الخارجي، والثانية هي الطاقة الحرارية $(k_B T)$ المسئولة عن توجيه العزم المنفرد بشكل عشوائي.

ومن η نستطيع أن نحسب القيمة المتوسطة للعزم المغناطيسي $(\bar{\mu}_H)$ الناتج من المجال الخارجي بواسطة المعادلة:

$$\bar{\mu}_H = \frac{\mu_{\uparrow} P_{\uparrow} + \mu_{\downarrow} P_{\downarrow}}{P_{\downarrow} + P_{\uparrow}} = \frac{\mu P_{\uparrow} + (-\mu) P_{\downarrow}}{P_{\downarrow} + P_{\uparrow}}$$

$$= \mu \frac{e^{\eta} - e^{-\eta}}{e^{\eta} + e^{-\eta}}$$

$$= \mu \tanh \eta = \mu \times \begin{cases} \eta & \text{for } \eta << 1 \\ 1 & \text{for } \eta >> 1 \end{cases} \qquad (1)$$

بالتالي فإن القيمة المتوسطة للتمغنط $\overline{M}$ باتجاه H هي:

$$\overline{M} = n\bar{\mu}_H = \begin{cases} n\mu\eta = \chi H & \text{for } \eta << 1 \\ n\mu & \text{for } \eta >> 1 \end{cases} \qquad (2)$$

حيث الرمز $n = \frac{N}{V}$ يدل على عدد العزوم المغناطيسية لوحدة الحجم. الشكل (2) يوضح تغير $\frac{\overline{M}}{n\mu}$ مع η. من الشكل (2) يتضح أنه:



الشكل(2) يصف تغير $\frac{\overline{M}}{n\mu}$ مع η

1- عند درجات الحرارة المنخفضة $(\eta >> 1, T << 1)$ نجد أن $\overline{M}$ لا تعتمد على H وتصل إلى درجة التشبع المغناطيسي (Magnetic saturation). ودرجة التشبع المغناطيسي تعني أن العزوم المغناطيسية تأخذ الإتجاه الموازي للمجال الخارجي، وهذا معناه أن النظام يوجد بحالة مرتبة (Low disorder ≡ Order). ونجد أيضاً أن العزوم كلها تصبح موازية للمجال، بمعنى أن $P_{\uparrow} = 1$ و $P_{\downarrow} = 0$. وهذا الوصف ينطبق أيضاً على المجالات الخارجية المرتفعة $H >> 1$.

2- عند درجات الحرارة المرتفعة (وأيضاً المجالات المنخفضة) نجد أن $\overline{M}$ تعتمد على H ويصبح النظام بحالة غير مرتبة (High disorder). ولذلك نجد أن $P_{\uparrow} = P_{\downarrow}$.

والمعادلة (2) تتفق مع الوصف التجريبي للمواد البارامغناطيسية، ومنه نجد أن:

$$\chi = \frac{\overline{M}}{H} = \frac{n\mu^2}{k_B T} \qquad (3)$$

القانون بالمعادلة (3) يعرف بأنه "قانون كوري" وقد تم التحقق منه عملياً.

III – نظرية لانجفن للمغناطيسية

(Langevin's theory for magnetization)

تقليدياً وحسب توزيع بولتزمان، يكون عدد ثنائي القطب والذي يأخذ اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي بزاوية تنحصر بين θ و $\theta + d\theta$ تُعطى بالعلاقة التالي:

$$dn = ce^{-\beta\varepsilon} d\omega = ce^{\beta\mu H\cos\theta} d\omega$$
$$= ce^{\beta\mu H\cos\theta} (2\pi \sin\theta d\theta) \qquad (1)$$



شكل (3) اتجاه عزم ثنائي القطب μ في مجال مغناطيسي خارجي H.

حيث c هو ثابت التناسب، و $d\omega$ عنصر الزاوية الفراغية المحصورة بين θ و $\theta + d\theta$ على اتجاه المجال. وكما هو مبين بالشكل (3) يكون إسهام عزم- ثنائي القطب في اتجاه المجال المغناطيسي هو $\mu\cos\theta$، لذلك فإن إسهام الذرات في عنصر الزاوية الفراغية يكون:

$$\mu\cos\theta dn = ce^{\beta\mu H\cos\theta} (\mu\cos\theta) 2\pi \sin\theta d\theta \qquad (2)$$

ومن ثم فإن الإسهام الكلي لثنائي القطب في اتجاه المجال سوف يكون:

$$c\int_0^{2\pi} e^{\beta\mu H\cos\theta} (\mu\cos\theta) 2\pi \sin\theta d\theta \qquad (3)$$

ومنه نجد أن المغناطيسية:

$$\overline{M} = n\langle \mu\cos\theta\rangle = n\frac{\int_0^{\pi}\mu\cos\theta\, dn}{\int_0^{\pi} dn}$$

$$= n\mu\frac{\int_0^{\pi}\cos\theta\sin\theta e^{\beta\mu H\cos\theta}\, d\theta}{\int_0^{\pi}\sin\theta e^{\beta\mu H\cos\theta}\, d\theta} \qquad (4)$$

لإجراء التكامل الوارد بالمعادلة (4) نستخدم التعويضات التالية:

$$\eta = \beta\mu B = \frac{\mu B}{k_B T}, \qquad y = \cos\theta \;\Rightarrow\; -\sin\theta = dy$$

لنجد أن:

$$\overline{M} = n\mu\frac{\int_{-1}^{1} y e^{\eta y}\, dy}{\int_{-1}^{1} e^{\eta y}\, dy} = n\mu\left[\frac{e^{\eta}+e^{-\eta}}{e^{\eta}-e^{-\eta}} - \frac{1}{\eta}\right]$$

$$= n\mu\left[\coth\eta - \frac{1}{\eta}\right]$$

$$= n\mu L(\eta) \qquad (5)$$

حيث $L(\eta)$ هي دالة لانجفن (Langevin's function)، انظر الدالة بالشكل (4).



شكل (4) تغير دالة لانجفن $L(\eta)$ مع η.

ملاحظات حول سلوك دالة لانجفن عند قيم η المنخفضة والمرتفعة:

1- لقيم η المنخفضة $(\eta >> 1)$ تأخذ الدالة القيمة $L(\eta) = 1$ وهذا يعني أن شدة المجال الخارجي قوية (أو درجة حرارة المادة منخفضة). ونجد أن $\overline{M}$ لا تعتمد على B وتصل إلى درجة التشبع المغناطيسي.

$$\overline{\mu}_z \approx \mu, \qquad \overline{M} \approx n\overline{\mu}_z. \qquad (6)$$

2- لقيم η المرتفعة $(\eta << 1)$ وهذا يعني أن شدة المجال الخارجي ضعيفة (أو درجة حرارة المادة مرتفعة) نجد أن $\overline{M}$ تأخذ الشكل التقريبي التالي:

$$\overline{M} \approx n\overline{\mu}_z = n\mu L(\eta << 1)$$

$$\approx n\mu\left(\frac{\eta}{3} - \frac{\eta^3}{45} + \cdots\right) \approx \frac{n\mu^2}{3kT}H, \qquad (7)$$

ومن (7) نجد أن القابلية المغناطيسية للنظام تكون على الصورة:

$$\chi = \lim\left(\frac{\partial M_{zn}}{\partial H}\right)_{H\to 0} \approx \frac{n\mu^2}{3kT} = \frac{C}{T} \qquad (8).$$

وهو قانون كوري للمواد البارامغناطيسية.

مثال: ادرس الخواص الفيزيائية لنظام يتكون من عدد N من الإلكترونات تقع في مجال مغناطيسي خارجي H باعتبار الحركة المغزلية فقط للإلكترون.

الحل: إذا تواجد الإلكترون في مجال مغناطيسي خارجي فإن الحركة المغزلية للإلكترون إما أن تأخذ اتجاه المجال وتصبح طاقة الإلكترون $\varepsilon_{\uparrow} = -\mu H$ أو تأخذ الاتجاه المعاكس وتصبح طاقته $\varepsilon_{\downarrow} = \mu H$ كما بالشكل (1). وتحسب Z_{sp} كالتالي:

$$Z_{sp} = e^{-\beta\varepsilon_{\uparrow}} + e^{-\beta\varepsilon_{\downarrow}} = e^{\eta} + e^{-\eta} = 2\cosh\eta,$$

ولعدد N من الإلكترونات نجد أن:

$$Z_N = \left(Z_{sp}\right)^N = \left(2\cosh(\eta)\right)^N$$

i حساب الطاقة الداخلية U

نحسب الطاقة الداخلية U من العلاقة:

$$U=-\left(\frac{\partial \ln Z}{\partial \beta}\right)_{V,N}=-N\mu H\tanh(\eta)=\begin{cases}0, & T\to\infty\\ \\ -N\mu H, & T\to 0\end{cases}$$



شكل (5) تغير الطاقة الداخلية لنظام يتكون من ثنائي القطب المغناطيسي مع درجة الحرارة المطلقة.

وبالنسبة إلى الطاقة الداخلية نجد من الشكل (5) أنه: عند درجات الحرارة المنخفضة $(T\to 0)$، فإن $U=-N\mu B$ وهذا يدل ببساطة على أن جميع العزوم المغناطيسية للإلكترونات تكون موازية لاتجاه المجال الخارجي، أنظر الشكل 6- أ.



(أ) $(T\to 0)$ (ب) $(T>0)$ (ت) $(T\to\infty)$

شكل (6) دوران العزوم بتغير درجات حرارة النظام. وللسهولة أخذنا اتجاهين فقط لأعلى ولأسفل.

وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع نجد أن العزوم تبدأ بالانقلاب أنظر الشكل 6- ب، وعندما تؤول درجة الحرارة إلى مالانهاية، نصل إلى الحالة العشوائية ويصبح عدد العزوم المتجهة لأعلى باتجاه المجال الخارجي كعدد العزوم المتجهة لأسفل، أنظر الشكل 6- ت،

وتصل الطاقة الداخلية إلى الصفر. بتعبير آخر نستطيع أن نقول أنه بارتفاع درجات الحرارة فإن الطاقة الحرارية كافية لجعل دوران العزوم في اتجاهات عشوائية.

ii – حساب الحرارة النوعية C_H

تحسب الحرارة النوعية C_H من العلاقة:

$$C_H=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_H=\frac{Nk_B\eta^2}{\cosh^2\eta}=\begin{cases}0, & T\to\infty\\ \\ 0, & T\to 0\end{cases}$$

بالنسبة إلى الحرارة النوعية نجد من الشكل (7) أنه عند درجات الحرارة المنخفضة $(T\to 0)$، فإن $C_H\to 0$ وهو يدل ببساطة على أنه عند تحقق الشرط $k_BT<<2\mu B$ فإن جميع العزوم المغناطيسية للإلكترونات تكون موازية لاتجاه المجال الخارجي وتكون الطاقة كمية ثابتة. وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع نجد أن العزوم تبدأ بالانقلاب وترتفع الحرارة النوعية إلى قيمة قصوى، انظر الشكل (7). وعندما تؤول درجة الحرارة إلي مالانهاية، نصل إلى الحالة العشوائية ويصبح عدد العزوم المتجهة لأعلى باتجاه المجال الخارجي كعددها المتجهة لأسفل وتقل الطاقة الداخلية إلى الصفر وكذلك الحرارة النوعية.



شكل (7) تغير الحرارة النوعية لنظام يتكون من ثنائي القطب المغناطيسي مع درجة الحرارة المطلقة.

ولنا ملاحظة مهمة هنا وهي أن هذا السلوك خاص فقط بهذا النظام لأنه يحتوي على مستويين فقط. وحيث أن معظم الأنظمة الفيزيائية تحتوي على عدد لانهائي من مستويات الطاقة لذلك فإن الحرارة النوعية تصل إلى قيمة ثابتة ولا تقل.

iii حساب الإنتروبي S

يحسب الإنتروبي S من دالة هلمهولتز :

$$F = -Nk_B T \ln Z_N$$

كالتالي:

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_{V,N} = Nk_B \ln\left[2\cosh(\eta) - \eta \tanh(\eta)\right]$$

$$= \begin{cases} Nk_B \ln 2, & T \to \infty \\ 0, & T \to 0 \end{cases}$$



شكل (8) تغير الإنتروبي لنظام يتكون من ثنائي القطب المغناطيسي مع درجة الحرارة المطلقة.

بالنسبة إلى الإنتروبي نجد من الشكل (8) أنه: عند درجات الحرارة المنخفضة $(T \to 0)$، نجد أن $S \to 0$ وهذا يدل ببساطة على أنه عند تحقق الشرط $k_B T << 2\mu B$ فإن جميع العزوم المغناطيسية للإلكترونات تكون موازية لاتجاه المجال الخارجي، وبالتالي يوجد مستوى مجهري واحد فقط. ومن تعريف الإنتروبي نجد أن:

$$S = Nk_B \ln W = Nk_B \ln 1 = 0$$

وهذا يتفق مع القانون الثالث للديناميكا الحرارية.

وعندما تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع نجد أن العزوم تبدأ بالانقلاب وعندما تؤول درجة الحرارة إلى مالانهاية، نصل إلى الحالة العشوائية ويصبح عدد العزوم المتجهة لأعلى باتجاه المجال الخارجي كعددها المتجهة لأسفل، وبالتالي يوجد مستويان مجهريان فقط. ومن تعريف الإنتروبي نجد أن أعلى قيمة يصل إليها الإنتروبي هو:

$$S = Nk_B \ln W = Nk_B \ln 2$$

iv – حساب العزم المغناطيسي الكلي $\overline{M}$

يحسب العزم المغناطيسي الكلي $\overline{M}$ كالتالي:

$$\overline{M} = -\left(\frac{\partial F}{\partial H}\right)_{V,N} \left(= n\overline{\mu} = \frac{\mu e^{\eta} - \mu e^{-\eta}}{e^{\eta} + e^{-\eta}} = n\mu \tanh \eta\right)$$

وهذا يتفق مع ما حصلنا عليه في المعادلة (1).

IV – ملحق (9.A) العزم المغناطيسي لثنائي القطب
(Magnetic Dipole Moment)



سوف نتحدث في هذا الملحق عن العزم المغناطيسي ثنائي القطب الناتج من حركة الإلكترون المدارية أو حركته الذاتية المغزلية، وتأثره بالمجال المغناطيسي الخارجي. لذا دعونا نتصور إلكترون، كما بالشكل المقابل، شحنته $(-e)$ و كتلة m_e، ويدور حول النواة المركزية $+Ze$ في مدار نصف قطره r، بالمستوى XY، وبسرعة v. في هذه الحالة ستكون مركبات العزم الزاوي L (وباستخدام قاعدة اليد اليمنى) هي:

$$\boldsymbol{L} = (L_x = 0, L_y = 0, L_z = m_e v r) \tag{1}$$

ونتيجة لحركة الإلكترون ينتج تيار مكافئ عبارة عن:

$$I = \frac{q}{t} = \frac{(-e)}{(2\pi r)/v} = -\frac{ev}{2\pi r} \tag{2}$$

ونحن نعرف من النظرية الكهرومغناطيسية أن أي تيار يدور في حلقة مساحتها $|A|$ ينشأ عنه عزم مغناطيسي ثنائي القطب (Orbital magnetic dipole moment) هو μ_L ويعرف بالمعادلة:

$$\mu_L = I\vec{A} = I\,|A|\,\hat{k} = (-\frac{ev}{2\pi r})(\pi r^2)\hat{k}$$

$$= -(\frac{e}{2m_e})L = \boldsymbol{L} \tag{3}$$

حيث $\hat{k}$ هي متجه الوحدة باتجاه المحور Z. ونظراً لشحنة الإلكترون السالبة فإن μ_L دائماً تكون باتجاه مضاد مع L. بالرغم من أننا حصلنا على العلاقة السابقة باستخدام الميكانيكا التقليدية لمدار دائري، إلا أن هذه العلاقة تظل صحيحة في ميكانيكا الكم لأي مدار اختياري له عزم زاوي مقداره L. وإذا استخدمنا المركبة Z للعزم المغناطيسي μ_L فإن:

$$\mu_{Lz} = -(\frac{e}{2m_e})L_z = -(\frac{e}{2m_e})\hbar m_l = -\beta m_l \tag{4}$$

حيث μ_B هو ثابت بوهر المغناطيسي (Bohr magneton) وقيمته هي:

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9.27\times10^{-24}\,\mathrm{JT^{-1}} = 5.66\times10^{-5}\,\mathrm{eV\cdot T^{-1}} \tag{5}$$



والآن عندما يوضع مغناطيس ثنائي القطب ذو عزم مداري μ_L في مجال مغناطيسي باتجاه المحور Z فإنه سوف يتأثر بازدواج τ مقداره:

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{\mu}_L \times \boldsymbol{B} = -\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B} \tag{6}$$

والذي يجعل المتجه μ_L يطوف (يدور بشكل مخروطي) حول اتجاه المجال المغناطيسي الخارجي كما بالشكل المرافق.

وعندما يصنع ثنائي القطب زاوية θ مع المجال المغناطيسي فإن طاقة الوضع المغناطيسية ε تُعرف على أنها: الشغل اللازم لدوران ثنائي القطب من وضع طاقة السكون $(\theta = \frac{\pi}{2})$ إلى الوضع ذو الزاوية θ :

$$\varepsilon = \int_{\pi/2}^{\theta} \tau d\theta = \mu_L B \int_{\pi/2}^{\theta} \sin\theta d\theta = -\mu B\cos\theta$$

$$= -\boldsymbol{\mu}\cdot\boldsymbol{B} \tag{7}$$

ولذلك، عند وضع الذرة في مجال مغناطيسي خارجي، فإن إلكترون المدار يكتسب طاقة إضافية مقدارها ε نتيجة لهذا المجال الخارجي.

بنفس المحاكاة السابقة نستطيع أن نجزم أن الحركة الذاتية المغزلية للإلكترون ينشأ عنها عزم مغناطيسي ثنائي القطب هو μ_S ويعرف بالمعادلة:

$$\boldsymbol{\mu}_S = -2.0023\beta\boldsymbol{S}$$

$$\approx -2\beta\boldsymbol{S} \tag{8}$$

ويصبح الاضطراب من الدرجة الأولى الناشئ من المجال المغناطيسي الخارجي هو:

$$\hat{H}_B = \mu_B\hat{B}\cdot(\hat{L}+2\hat{S}) = \mu_B B(\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) \tag{9}$$

الباب العاشر

الإحصاء الكمي

الفصل	العنوان	الصفحة
I	إحصاء فيرمي- ديراك	160
II	إحصاء بوز-اينشتين	163
III	أمثلة منوعة	166

الباب العاشر

الإحصاء الكمي

Quantum Statistics

نعلم أنه في الميكانيكا التقليدية يستطيع المرء أن يحدد إحداثيات جسم وكمية حركته الخطية بدقة متناهية، وفي وقت واحد. ولكن في ميكانيكا الكم فإن مبدأ عدم التيقن لهيزنبرج، بالصورة $\Delta r \Delta p >> h$ ، يمنع هذا التحديد. والوصفة التقليدية تعتبر مقبولة في حالة أن الثابت h يكون مهملاً. ولوضع الشروط الواجبة للوصفة التقليدية وتحديد انتقالها إلي وصفة ميكانيكا الكم، دعونا نعتبر حركة الجزيء في الغاز. إذا اعتبرنا أن p_{av} هي متوسط كمية الحركة الخطية و r_{av} هو متوسط المسافة بين الجزيئات (الجسيمات) المتشابهة، كما بالشكل (1)، فإن الوصفة التقليدية تتحقق عندما يتحقق الشرط:



شكل (1) تداخل موجات دى- برولى المصاحبة لجسيم a- حالة تقليدية b- حالة كمية

$$r_{av} p_{av} >> h \qquad (1)$$

وباستخدام موجة دي- برولى بالطول ألموجي $\lambda = h / p$ نعلم أن:

$r_{av} >> \lambda_{av}$ (classical limit);

$r_{av} << \lambda_{av}$ (quantum limit);

وحيث أن λ_{av} هي مقياس لانتشار الجزيء في الفراغ، فإن الشرط $r_{av} >> \lambda_{av}$ يعني أن الدوال الموجية للجزيئات لا تتداخل، وبالتالي تصبح الجزيئات محددة بأماكنها.

لإيضاح ذالك بمثال رقمي، دعونا نتخيل غاز مثالي يتكون من عدد N من الجزيئات وأن كل جزيء مستقر بمكعب طول ضلعه r_{av} وهذه المكعبات تشغل فراغاً حجمه V، بحيث:

$$r_{av}^3 N \approx V \quad \Rightarrow \quad r_{av} \approx \left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} \qquad (2)$$

ونعلم أن العلاقة بين درجة الحرارة المطلقة T لنظام متزن ومتوسط الطاقة الحركية لجزيئاته $\bar{\varepsilon}$ هي:

$$\bar{\varepsilon} = \frac{p_{av}^2}{2m} = \frac{3}{2} k_B T \quad \Rightarrow \quad p_{av} \approx \left(3mk_B T\right)^{1/2} \qquad (3)$$

ولهذا فإن:

$$\lambda_{av} = \frac{h}{p_{av}} = \frac{h}{\left(3mk_B T\right)^{1/2}} \qquad (4)$$

بالتالي فإن الشرط التقليدي يصبح:

$$\left(\frac{V}{N}\right)^{1/3} >> \frac{h}{\left(3mk_B T\right)^{1/2}} \qquad (5)$$

وهذا يعني أن الوصفة التقليدية تصبح ملائمة عندما تتحقق الشروط التالية:

1- عدد الجسيمات N بالنظام يجب أن تكون قليلة (غاز ذو كثافة منخفضة)

2- درجة الجرارة المطلقة T يجب أن تكون مرتفعة،

3- كتلة جزيء الغاز m ليست صغيرة جداً.

مثال عددي:

أ- جزيئات الغاز عند NTP

باستخدام كثافة الجزيئات: $\rho_{molecules} = 10^{25}\ \text{molecules m}^{-3}$

فإن الحجم المتاح للجزيء: $V_{molecule} = \dfrac{1}{\rho_{molecules}} = 10^{-25}\,\text{m}^3$

∵ نصف قطر الجزيء: $r_{molecule} \approx 10^{-10} m$

∴ الحجم الحقيقي للجزيء: $V_{molecule} = \dfrac{4}{3}\pi (r_{molecule})^3 \approx 10^{-30}\,\text{m}^3$

بالتالي، في الغازات، نجد أن حجم الجزيء عامةً أصغر جداً من الحجم المتاح له، بالتالي فإننا نستطيع، كمبدأ، تحديد كل جزيء في الغاز، ونستطيع التعامل معه تقليدياً.

ب- إلكترونات التوصيل في المعادن:

باستخدام كثافة الإلكترونات: $\rho_{electrons} = 10^{28}\ \text{electrons m}^{-3}$

فإن الحجم المتاح للإلكترون: $V_{electron} = \frac{1}{\rho_{electrons}} = 10^{-28}\text{m}^3$

∵ نصف قطر الإلكترون: $r_{electron} = \frac{h}{p} = \frac{h}{\sqrt{2mE\,(1\text{eV})}} = 10^{-9}\text{m}$

∴ الحجم الحقيقي للإلكترون: $V_{molecule} = \frac{4}{3}\pi(r_{molecule})^3 \approx 10^{-25}\text{m}^3$

لهذا فإنه في المواد الموصلة، نجد أن حجم الإلكترون عامةً أكبر من الحجم المتاح له، ومنه نجد أن الدوال الموجية سوف تتداخل إلي حد كبير. ولا نستطيع هنا تحديد الإلكترونات في المعادن، لذلك يصبح الإلكترون غير مميز، ولهذا سوف نلجأ إلي تطبيق طرق ميكانيكا الكم الإحصائية.

وهناك طريقتين إحصائيتين في هذا المجال، ألا وهما إحصاء فيرمي- ديراك و إحصاء بوز- اينشتين. وسوف نتكلم عنهم بالتفصيل في الفصلين التاليين، مع بعض الأمثلة التوضيحية. أما التطبيقات الخاصة بهما فسوف يتم دراستها بالبابين التاليين.

I- إحصاء فيرمي- ديراك

هو إحصاء يطبق علي الجسيمات غير المميزة، وتسمي فيرميون مثل الالكترونات والبوزيترونات والبروتونات والميونز. وجسيمات الفيرميون لها دوال موجيه مضادة للتماثل (Antisymmetric wave functions) وتخضع لمبدأ باولي للاستبعاد لذلك فإنه لا يمكن لأكثر من جسيم أن يشغل نفس المستوى الكمي (وذلك أيضاً مع وجود الحركة المغزلية). وجسيمات الفيرميون لها الحركة المغزلية أنصاف أعداد صحيحة فردية من القيمة $\hbar$. وتعتبر جسيمات فيرمي مثالية إذا أهملت طاقة التفاعل بينهما. وتطبيقات إحصاء فيرمي- ديراك كثيرة ومهمة وخصوصاً لدراسة سلوك الإلكترونات الحرة في المعادن وأشباه الموصلات.

ولإيجاد احتمالية الديناميكا الحرارية لحاله عينية محددة لإحصاء فيرمي- ديراك، نعلم أنه في حالة جسيمات الفيرميون فإن كل مستوى طاقة إما أن يملأ بجسيم واحد فقط، أو أن يصبح فارغاً، كما بالشكل (2).



شكل (2) أربعة من جسيمات الفيرميون ● موزعة علي سبع من المستويات المتساوية الطاقة ε_j.

ولذلك فإنه لكل منسوب طاقة j، حيث تكون له درجة الاشماء g_j، نجد أن عدد الجسيمات n_j أقل من، أو تساوي g_j، بمعني أنه $n_j \le g_j$. وأنه لمجموعة من المستويات عددها g_j يمكن تقسيمها إلي مجموعتين: المجموعة الأولي وعددها n_j وتحتوي كل مستوى منها علي جسيم منفرد، والمجموعة الثانية فارغة من الجسيمات وعددها $(g_j - n_j)$. وتصبح المسألة كما في حالة تجربة العملات المعدنية ذات العدد N حيث عرفنا حدث الحصول على عدد الصور لأعلى بالعدد N_1 و حدث الحصول على عدد العملات ذات الكتابة لأعلي بالعدد $N_2 = N - N_1$ ولذلك عرفنا عدد الطرق المختلفة للحصول علي هذا الترتيب هو:

$$\omega = \frac{N!}{N_1!(N-N_1)!}$$

ولمسألتنا هنا نجد أن احتمالية الديناميكا الحرارية لمنسوب الطاقة j هي:

$$\omega_{FD}(j)=\frac{g_j!}{n_j!\left(g_j-n_j\right)!} \tag{1}$$

بالتالي فإن العدد الكلي للحالات المجهرية المناظر لترتيب عيني مسموح به هو ببساطة حاصل ضرب المعادلة (1) لكل مناسيب الطاقة، بمعني أن:

$$\Omega_{FD}=\prod_{j=1}^{n}\frac{g_j!}{n_j!\left(g_j-n_j\right)!} \tag{2}$$

واجب منزلي: استخدم الطريقة التي طبقت في إحصاء ماكسويل- بولتزمان (وهي كالتالي: أخذ الوغاريتم للمعادلة (2)، استخدام تقريب استيرلنج، حساب النهاية العظمي، واستخدام معاملات لاجرانج مع التقيد بشرطي ثبوت عدد الجسيمات والطاقة) لإثبات أن توزيع فيرمي- ديراك الأكثر احتمالاً يؤول إلي:

$$n_j^*=\frac{g_j}{e^{-\alpha+\beta\varepsilon_j}+1} \tag{3}$$

حيث الرمز n_j^* يمثل عدد جسيمات الفيرميون التي لها الطاقة ε_j و g_j هو درجة الانتماء ويعبر عن عدد المستويات التي لها نفس الطاقة ε_j.

وكما تم سابقاً فإن $\beta=\frac{1}{k_BT}$. وبالنسبة إلي معامل لاجرانج α فإننا سوف نضعه بدلالة معامل أخر يسمي الجهد الكيميائي μ بالشكل:

$$\alpha=\frac{\mu}{k_BT}$$

ويصبح توزيع فيرمي- ديراك بالصورة:

$$f_j\equiv\frac{n_j^*}{g_j}=\frac{1}{e^{(\varepsilon_j-\mu)/k_BT}+1} \tag{4}$$

وذلك في حالة طيف الطاقة المنفصلة. وفي حالة الطيف المتصل نجد أن التوزيع يعطي بالشكل:

$$f(\varepsilon)=\frac{1}{e^{(\varepsilon-\mu)/k_BT}+1} \tag{5}$$

II- إحصاء بوز-اينشتين

هو إحصاء يطبق علي الجسيمات الغير مميزة وتسمي بوزون، مثل الفوتونات والفونونات. وجسيمات البوزون لها دوال موجيه متماثلة (Symmetric wave functions) ولا تخضع لمبدأ باولي للاستبعاد والحركة المغزلية لها تأخذ أعداد صحيحة من القيمة $\hbar$. لذلك فإنه يمكن لأي عدد من الجسيمات أن يشغل نفس المستوى الكمي. وتعتبر جسيمات البوزون مثالية إذا أهملت طاقة التفاعل بينهما. وتطبيقات إحصاء بوز- اينشتين كثيرة ومهمة وخصوصاً لدراسة سلوك فوتونات الإشعاع وجزيئات الغاز عند درجات الحرارة المنخفضة.

طريقة حساب عدد الحالات المجهرية للبوزون تعتبر أكثر تعقيداً من توزيع فيرمي- ديراك. فإنه لمنسوب الطاقة j، سوف يكون له عدد g_j من المستويات والتي تحتوي على عدد n_j من الجسيمات الغير مميزة والتي لا يوجد عليها أي قيود بالنسبة لعددها بالمستوى الواحد. ولذلك من الملائم هنا أن نتخيل، كما بالشكل (3)، ترتيب عدد n_j من الجسيمات (والتي تُمثل بالنقاط السوداء) خلال g_j من المستويات والمقسمة بواسطة $\left(g_j-1\right)$ من الخطوط.



شكل (3) ثلاثة عشر من جسيمات البوزون ● موزعة علي تسع من المستويات المتساوية الطاقة ε_j.

والآن نستطيع أن نحصل علي حالات مجهريه جديدة بواسطة خلط الخطوط والجسيمات مع احتفاظنا بالأعداد n_j و g_j ثابتة. ويظهر لنا السؤال التالي: ما هي عدد الطرق التي ترتب بها $\left(n_j+g_j-1\right)$ من الرموز (وهي الخطوط والنقاط) في عدد $\left(g_j-1\right)$ من الخطوط و n_j من النقاط؟ مرة أخري من تجربة العملة نجد أن عدد الحالات المجهرية لكل منسوب طاقة j هي:

$$\omega(j)=\frac{\left(n_j+g_j-1\right)!}{n_j!\left(g_j-1\right)!} \tag{1}$$

بالتالي فإن العدد الكلي للحالات المجهرية المناظر لترتيب مسموح به هو ببساطة حاصل ضرب المعادلة (1) لكل مناسيب الطاقة ، بمعني أن:

$$\Omega_{BE} = \prod_{j=1}^{n} \frac{(n_j + g_j - 1)!}{n_j!(g_j - 1)!} \qquad (2)$$

واجب منزلي: استخدم الطريقة التي طبقت في إحصاء ماكسويل- بولتزمان (وهي كالتالي: أخذ الوغاريتم للمعادلة (2)، استخدام تقريب استيرلنج، حساب النهاية العظمي، واستخدام معاملات لاجرانج مع التقيد بشرطي ثبوت عدد الجسيمات والطاقة) لإثبات أن توزيع بوز- اينشتين الأكثر احتمالاً يؤول إلي:

$$n_j^* = \frac{g_j}{e^{-\alpha+\beta\varepsilon_j} - 1} \qquad (3)$$

حيث الرمز n_j^* يمثل عدد جسيمات البوزون التي لها الطاقة ε_j و g_j هو عدد المستويات التي لها نفس الطاقة ε_j. حيث $\beta = \frac{1}{k_B T}$ و $\alpha = \frac{\mu}{k_B T}$.

ويأخذ توزيع بوز- اينشتين الصورة:

$$f_j \equiv \frac{n_j^*}{g_j} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_j - \mu)/k_B T} - 1} \qquad (4)$$

وذلك في حالة طيف الطاقة المنفصلة. وفي حالة الطيف المتصل نجد أن التوزيع يعطي بالشكل:

$$f(\varepsilon) = \frac{1}{e^{(\varepsilon - \mu)/k_B T} - 1} \qquad (5)$$

والجدول التالي يلخص الفروق المهمة للتوزيعات الثلاثة.

	B.E. (Bosons)	F.D. (Fermions)	M.B.
الجسيمات	Indistinguishable غير مميزة	Indistinguishable غير مميزة	Distinguishable مميزة
الدالة الموجية	Symmetric متماثله	Antisymmetric غير متماثله	متماثله وغير متماثله
Spin	$0, \hbar, 2\hbar, \cdots$	$\frac{1}{2}\hbar, \frac{3}{2}\hbar, \cdots$	Any
أمثله للجسيمات	photons, phonons, ^4He, π-meson,	electron, proton, ^3He	أي جسيمات
n_i	0,1,2,.....	0,1	0,1,2,.....
$\omega(i)$	$\omega_{BE} = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$	$\omega_{FD} = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$	$\omega_{MB} = \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$ (*)
Ω	$\Omega_{BE} = \prod_{i=1}^{r} \omega_{BE}$	$\Omega_{FD} = \prod_{i=1}^{r} \omega_{FD}$	$\Omega_{MB} = \prod_{i=1}^{r} \omega_{MB}$
$f(\varepsilon_i) = \frac{n_i}{g_i}$	$\frac{1}{e^{-\alpha+\beta\varepsilon_i} - 1}$	$\frac{1}{e^{-\alpha+\beta\varepsilon_i} + 1}$	$e^{\alpha-\beta\varepsilon_i}$
Applications	Photons of radiation, gas molecules at very Low temperature)	Free electrons in metal and semi- conductor (except at very H. temp.)	Gas molecules (except near 0 K), electrons at Extremely H. temp.

(*) هذه صيغة معدلة حيث قسمنا علي $N!$. هذا التعديل ليس له أي ارتباط بصفات الجسيمات الفيزيائية ولكن هذه قاعدة لنموذج رياضي يعرف به الجسيمات الغير مميزة.

وللغازات المخففة، والمخففة هنا تعني أن عدد الجسيمات أقل جداً من عدد المستويات المسموح بها تبعاً للشرط:

$$n_j << g_j \qquad \text{for all } j$$

بمعني أن معظم مستويات طاقة النظام فارغة. وهذا الشرط يتحقق عند درجات الحرارة المرتفعة. وللغازات المخففة نجد أن دوال التوزيع للجسيمات المتطابقة والغير مميزة للإحصاءات الثلاثة تصبح متساوية:

$$\omega_{FD} = \omega_{BE} = \omega_{MB} = \prod_{i=1}^{r} \frac{g_i^{\,n_i}}{n_i!}$$

ودوال التوزيع الثلاثة للجسيمات المتطابقة والغير مميزة يمكن تمثيلها بمعادلة واحدة وهي:

$$f_j \equiv \frac{n_j}{g_j} = \frac{1}{e^{(\varepsilon_i - \mu)\cdot k_B T} + a}, \qquad a = \begin{cases} +1 & \text{for FD statistics} \\ -1 & \text{for BE statistics} \\ 0 & \text{for MB statistics} \end{cases}$$

III– أمثلة منوعة

1– اعتبر نظام يتكون من ثلاث جسيمات $(N=3)$ ومنسوبين ذو الطاقة ε_1 و ε_2 حيث $(\varepsilon_1 < \varepsilon_2)$، كما بالشكل التالي. المستوى ε_1 ثنائي الانتماء، بمعني أن $g_1 = 2$، ويتشبع بجسيمين. والمستوى ε_2 أحادي الانتماء ويتشبع بجسيم وحيد فقط. احسب عدد المستويات المجهرية لكل إحصاء.

$n_2 = 1$ ——— ε_2

$n_1 = 2$ ═══ ε_1

الحل

من المعطيات السابقة نعلم أن $g_1 = 2, g_2 = 1$، وعدد الجسيمات بالمستوي الأول هو $n_1 = 2$ وبالمستوي الثاني هو $n_2 = 1$. لذلك نستطيع أن نكون الجدول التالي لكل مستوي علي حدة، ومنه نحسب عدد المستويات المجهرية لكل توزيع إحصائي.

i^{th}level	n_i	g_i	$\omega_{FD}(i) = \frac{g_i!}{n_i!(g_i - n_i)!}$	$\omega_{BE}(i) = \frac{(n_i + g_i - 1)!}{n_i!(g_i - 1)!}$	$\omega_{MB}(i) = \frac{g_i^{n_i}}{n_i!}$
1	2	2	$\frac{2!}{2!(2-1)!} = 1$	$\frac{(2+2-1)!}{2!(2-1)!} = 3$	$\frac{2^2}{2!} = 2$
2	1	1	$\frac{1!}{1!(1-1)!} = 1$	$\frac{(1+1-1)!}{1!(1-1)!} = 1$	$\frac{1^1}{1!} = 1$
			$\Omega_{FD} = \prod_{i=1}^{2} \omega_{FD}(i) = 1$	$\Omega_{BE} = \prod_{i=1}^{2} \omega_{BE}(i) = 3$	$\Omega_{MB} = 3! \prod_{i=1}^{2} \frac{g_i^{n_i}}{n_i!} = 12$

2- نظام يتكون من جسيمين بداخل حجم V. بإمكان أي من الجسيمين التواجد بأي مستوى من المستويات الكمية الثلاث ذو الطاقات، $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 3$. احسب دالة التجميع إذا تحقق:

1– أن الجسيمات تَتبع إحصاء ماكسويل– بولتزمان.

2– أن الجسيمات تَتبع إحصاء بوز– أينشتين.

3– أن الجسيمات تَتبع إحصاء فيرمي– ديراك.

الحل

1– إحصاء ماكسويل–بولتزمان: نعلم أنه في حالة إحصاء ماكسويل– بولتزمان تكون الجسيمات مميزة، فرضاً مثل A, B، وبإمكان المستوى أن يتشبع بجسيم أو أكثر كما بالجدول التالي:

ε_i	Microstates					
	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
3			AB		B	B
1		AB		B		A
0	AB			A	A	
E_i	0	2	6	1	3	4
ω_i	1	1	1	2	2	2

$$Z_{MB} = \sum_i g_i e^{-\beta E_i}$$

$$= 1 + e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-6\beta\varepsilon} + 2e^{-\beta\varepsilon} + 2e^{-3\beta\varepsilon} + 2e^{-4\beta\varepsilon}$$

نلاحظ هنا أن عدد المستويات التي بها جسيمين مميزين هم 3 مستويات مجهريه، والتي بها جسيم واحد فقط هم 6 مستويات مجهريه، والمجموع الكلي للمستويات المجهرية هي 9.

2- إحصاء بوز- أينشتين: في إحصاء بوز- أينشتين يحتوي المستوى على أي عدد من الجسيمات الغير مميزة، فرضاً مثل A,A، كما بالجدول التالي:

ε_i	Microstates					
ε_i	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
3			AA		A	A
1		AA		A		A
0	AA			A	A	
E_i	0	2	6	1	3	4
ω_i	1	1	1	1	1	1

$$Z_{BE} = 1 + e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-6\beta\varepsilon} + e^{-\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon}$$

نلاحظ هنا أن عدد المستويات التي بها جسيمين مميزين هم 3 مستويات مجهريه، والتي بها جسيم واحد فقط هم 3 مستويات مجهريه، والمجموع الكلي للمستويات المجهرية هي 6.

2- إحصاء فيرمي- ديراك: في إحصاء فيرمي- ديراك لا يحتوي المستوى على أكثر من جسيم غير مميز، فرضاً مثل A، كما بالجدول التالي:

ε_i	Microstates		
ε_i	k_1	k_2	k_3
3		A	A
1	A		A
0	A	A	
E_i	1	3	4
ω_i	1	1	1

$$Z_{FD} = e^{-\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon} + e^{-4\beta\varepsilon}$$

نلاحظ هنا أنه لا يوجد مستويات بها جسيمين، والمستويات المجهرية التي بها جسيم واحد فقط هم 3 مستويات، والمجموع الكلي للمستويات المجهرية هي 3.

ملاحظات:

1- بالإمكان حساب عدد المستويات المجهرية لكل توزيع إحصائي كالتالي:

لإحصاء ماكسويل- بولتزمان: نستخدم القانون:

عدد المستويات المجهرية= (عدد المستويات)$^{\text{عدد الجسيمات}}$ = $(1+1+1)^2 = 9$

لإحصاء بوز- أينشتين: نستخدم القانون:

عدد المستويات المجهرية =(عدد المستويات)(عدد الجسيمات)=(3)(2)=6

لإحصاء فيرمي- ديراك: نستخدم القانون:

عدد المستويات المجهرية =(عدد المستويات)=(3)

ولكن في إحصاء بوز- أينشتين و فيرمي- ديراك فإن القوانين المستخدمة ليست دقيقه.

2- من الحسابات السابقة إذا عَرفنا:

$P(A)$ باحتمال وجود جسيمين بنفس المستوي

$P(B)$ باحتمال وجود جسيمين بمستويين مختلفين

فمن الحسابات السابقة سوف، نستطيع أن نكون الجدول التالي:

	ماكسويل- بولتزمان	بوز- أينشتين	فيرمي- ديراك
$P(A)$	3	3	0
$P(B)$	6	3	3
$P = \frac{P(A)}{P(B)}$	$\frac{1}{2}$	1	0

من الجدول الأخير نلاحظ التالي:

1- في إحصاء بوز- أينشتين نجد أن الجسيمات تميل إلي أن تتجمع بنفس المستوى أكثر من إحصاء ماكسويل- بولتزمان وينشأ عنه هذه ظاهرة تُدعىَ تكثف أينشتين (Einstein condensation).

2- في إحصاء فيرمي- ديراك نجد أن الجسيمات تميل إلي أن تتوزع على مستويات مختلفة أكثر من إحصاء ماكسويل- بولتزمان.

مثال: نظام يتكون من جسيمين غير مميزين. بإمكان أي من الجسيمين التواجد بأي مستوى من المستويات الكمية الثلاث ذو الطاقات، $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 2$. المستوى الأول $\varepsilon_1 = 0$ ثنائي الانتماء، بمعني أن $g_1 = 2$، والمستويات الأخرى أحادية الانتماء. احسب دالة التجميع والطاقة المتوسطة للنظام إذا تحقق أن الجسيمات:

1- تَتبع إحصاء فيرمي- ديراك

2- تَتبع إحصاء بوز- أينشتين

3- احسب الطاقة المتوسطة للنظام عندما $(T \to \infty)$، ماهو تعليقك على النتيجة النهائية؟

الحل

1- إحصاء فيرمي- ديراك: سوف نحصل على التوزيع التالي للحالات المجهرية:

ε_i	Microstates					
	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
$\varepsilon_3 = 2\varepsilon$	0	0	0	a	a	a
$\varepsilon_2 = 1\varepsilon$	0	a	a	0	0	a
$\varepsilon_1 = 0$	a a	a 0	0 a	0 a	0 a	0 0
E_i	$E_0 = 0$	$E_1 = \varepsilon$	$E_2 = \varepsilon$	$E_3 = 2\varepsilon$	$E_4 = 2\varepsilon$	$E_5 = 3\varepsilon$

وتصبح دالة التجميع:

$$Z_{FD} = \sum_i g_i e^{-\beta E_i}$$

$$= e^{-\beta E_0} + e^{-\beta E_1} + e^{-\beta E_2} + e^{-\beta E_3} + e^{-\beta E_4} + e^{-\beta E_5}$$

$$= 1 + 2e^{-\beta\varepsilon} + 2e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon}$$

والطاقة المتوسطة

$$U_{FD} = -\frac{1}{Z_{FD}}\frac{\partial Z_{FD}}{\partial \beta} = \frac{2\varepsilon e^{-\beta\varepsilon} + 4\varepsilon e^{-2\beta\varepsilon} + 3\varepsilon e^{-3\beta\varepsilon}}{1 + 2e^{-\beta\varepsilon} + 2e^{-2\beta\varepsilon} + e^{-3\beta\varepsilon}}$$

$$\to \frac{3}{2}\varepsilon \qquad (\text{as } T \to \infty)$$

واجب منزلي: احسب قيمة Z_{FD} عند النهايات $T \to \infty$ و $T \to 0$. ما هو تعليقك على النتائج؟

2- إحصاء بوز- أينشتين: سوف نحصل على التوزيع التالي للحالات المجهرية:

ε_i	Microstates				
	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5
$\varepsilon_3 = 2\varepsilon$	0	0	0	0	0
$\varepsilon_2 = 1\varepsilon$	0	0	0	a	a
$\varepsilon_1 = 0$	aa 0	0 aa	a a	a 0	0 a
E_i	$E_1 = 0$	$E_2 = 0$	$E_3 = 0$	$E_4 = \varepsilon$	$E_5 = \varepsilon$

ε_i	Microstates				
	k_6	k_7	k_8	k_9	k_{10}
$\varepsilon_3 = 2\varepsilon$	a	a	0	a	aa
$\varepsilon_2 = 1\varepsilon$	0	0	aa	a	0
$\varepsilon_1 = 0$	a 0	0 a	0 0	0 0	0 0
E_i	$E_6 = 2\varepsilon$	$E_7 = 2\varepsilon$	$E_8 = 2\varepsilon$	$E_9 = 3\varepsilon$	$E_{10} = 4\varepsilon$

وتصبح دالة التجميع:

$$Z_{BE}=\sum_{i} g_i e^{-\beta E_i}=3+2e^{-\beta\varepsilon}+3e^{-2\beta\varepsilon}+e^{-3\beta\varepsilon}+e^{-4\beta\varepsilon}$$

والطاقة المتوسطة

$$U_{BE}=-\frac{1}{Z_{BE}}\frac{\partial Z_{BE}}{\partial\beta}=\frac{2\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}+6\varepsilon e^{-2\beta\varepsilon}+3\varepsilon e^{-3\beta\varepsilon}+4\varepsilon e^{-4\beta\varepsilon}}{3+2e^{-\beta\varepsilon}+3e^{-2\beta\varepsilon}+e^{-3\beta\varepsilon}+e^{-4\beta\varepsilon}}$$

$$\to\frac{3}{2}\varepsilon \qquad (\text{as}\, T\to\infty)$$

من النتيجة النهائية للطاقة المتوسطة نجد أنه عند درجات الحرارة المرتفعة $(T\to\infty)$ أو $(\beta\to 0)$ فإن إحصاءي بوز- أينشتين و فيرمي- ديراك يؤولان إلي إحصاء ماكسويل بولتزمان التقليدي.

واجب منزلي: احسب قيمة Z_{BE} عند النهايات $T\to\infty$ و $T\to 0$. ما هو تعليقك على النتائج؟

مثال: نظام يتكون من جسيمين غير مميزين بداخل حجم V. بإمكان أي من الجسيمين التواجد بأي مستوى من المستويات الكمية الثلاث ذو الطاقات، $\varepsilon_1=0,\varepsilon_2=1\varepsilon,\varepsilon_3=2\varepsilon$. احسب دالة التجميع و $\overline{n_1},\overline{n_2}$ و $\overline{n_3}$ للمستويات الثلاث إذا تحقق أن الجسيمات:

1- تتبع إحصاء بوز- أينشتين

2- احسب $\overline{n_1},\overline{n_2}$ و $\overline{n_3}$ والطاقة المتوسطة عندما $(T\to 0)$، ماهو تعليقك على النتيجة النهائية؟

الحل:

1- إحصاء بوز- أينشتين: سوف نحصل على التوزيع التالي للحالات المجهرية:

ε_i	Microstates					
	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
$\varepsilon_3=2\varepsilon$	0	0	1	0	1	2
$\varepsilon_2=1\varepsilon$	0	1	0	2	1	0
$\varepsilon_1=0$	2	1	1	0	0	0
E_i	$2\varepsilon_1=0$	$\varepsilon_1+\varepsilon_2=\varepsilon$	$\varepsilon_1+\varepsilon_3=2\varepsilon$	$2\varepsilon_2=2\varepsilon$	$\varepsilon_2+\varepsilon_3=3\varepsilon$	$2\varepsilon_3=4\varepsilon$

$$Z_{BE}=\sum_{\{n_i\}} e^{-\beta\sum_i n_i\varepsilon_i}=\sum_{i\,(\text{energy levels})} g_i e^{-\beta E_i}$$

$$\begin{aligned}Z_{BE}&=e^{-2\beta\varepsilon_1}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_3)}+e^{-2\beta\varepsilon_2}+e^{-\beta(\varepsilon_2+\varepsilon_3)}+e^{-2\beta\varepsilon_3}\\&=1+e^{-\beta\varepsilon}+2e^{-2\beta\varepsilon}+e^{-3\beta\varepsilon}+e^{-4\beta\varepsilon}\\&=(1+e^{-2\beta\varepsilon})(1+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})\end{aligned}$$

وباستخدام دالة التجميع بالشكل:

$$Z_{BE}=e^{-2\beta\varepsilon_1}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_3)}+e^{-2\beta\varepsilon_2}+e^{-\beta(\varepsilon_2+\varepsilon_3)}+e^{-2\beta\varepsilon_3}$$

واستخدام القانون العام:

$$\overline{n_i}=-\frac{1}{\beta Z_{BE}}\left(\frac{\partial Z_{BE}}{\partial\varepsilon_i}\right)_{T,\varepsilon_j\neq\varepsilon_i}.$$

نجد أن:

$$\overline{n_1}=-\frac{1}{\beta Z_{BE}}\left(\frac{\partial Z_{BE}}{\partial\varepsilon_1}\right)_{T,\varepsilon_j\neq\varepsilon_i}=\frac{2e^{-2\beta\varepsilon_1}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_3)}}{Z_{BE}}$$

$$=\frac{2+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon}}{(1+e^{-2\beta\varepsilon})(1+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})}.$$

بالخطوة الأخيرة استخدمنا القيم: $\varepsilon_1=0,\varepsilon_2=1,\varepsilon_3=3$. وبالنسبة إلي $\overline{n_2}$ نجد.

$$\overline{n_2}=-\frac{1}{\beta Z_{BE}}\left(\frac{\partial Z_{BE}}{\partial\varepsilon_2}\right)_{T,\varepsilon_j\neq\varepsilon_i}=\frac{2e^{-2\beta\varepsilon_2}+e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_2)}+e^{-\beta(\varepsilon_2+\varepsilon_3)}}{Z_{BE}}$$

$$=\frac{e^{-\beta\varepsilon}(1+2+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})}{(1+e^{-2\beta\varepsilon})(1+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})}.$$

وبالنسبة إلي $\overline{n_3}$ نجد.

$$\overline{n_3} = -\frac{1}{\beta Z_{BE}}\left(\frac{\partial Z_{BE}}{\partial \varepsilon_3}\right)_{T,\varepsilon_j \neq \varepsilon_i} = \frac{2e^{-2\beta\varepsilon_3} + e^{-\beta(\varepsilon_1+\varepsilon_3)} + e^{-\beta(\varepsilon_2+\varepsilon_3)}}{Z_{BE}}$$

$$= \frac{e^{-2\beta\varepsilon}(1+e^{-\beta\varepsilon}+2e^{-2\beta\varepsilon})}{(1+e^{-2\beta\varepsilon})(1+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})}.$$

وتصبح الطاقة الداخلية:

$$U = \overline{n_1}\varepsilon_1 + \overline{n_2}\varepsilon_2 + \overline{n_3}\varepsilon_3 = \frac{\varepsilon e^{-\beta\varepsilon}(1+4e^{-\beta\varepsilon}+3e^{-2\beta\varepsilon}+4e^{-3\beta\varepsilon})}{(1+e^{-2\beta\varepsilon})(1+e^{-\beta\varepsilon}+e^{-2\beta\varepsilon})}.$$

وعندما T تؤول إلي الصفر، بمعني أن $e^{-\beta\varepsilon} \to 0$، نجد أن :

$$\overline{n_1} \to 2, \quad \overline{n_2} \to 0, \quad \overline{n_3} \to 0, \quad \overline{U} \to 0$$

وهنا تتجمع الجسيمات بالمستوى الأرضي

واجب منزلي: نظام يتكون من جسيمين غير مميزين بداخل حجم V. بإمكان أي من الجسيمين التواجد بأي مستوى من المستويات الكمية الثلاث ذو الطاقات، $\varepsilon_1 = 0, \varepsilon_2 = 1, \varepsilon_3 = 3$.

1- احسب $\overline{n_1}, \overline{n_2}$ و $\overline{n_3}$ للمستويات الثلاث إذا تحقق أن الجسيمات تَتبع إحصاء فيرمي- ديراك

1- احسب $\overline{n_1}, \overline{n_2}$ و $\overline{n_3}$ عندما $(T \to \infty)$، ماهو تعليقك على النتيجة النهائية؟

الباب الحادي عشر

تطبيقات إحصاء بوز- أينشتين

الفصل	العنوان	الصفحة
I	إشعاع الجسم الأسود	176
II	تكثيف بوز – أينشتين	418
III	خواص غاز البوزون المثالي	189
	i حساب الطاقة الداخلية	190
	ii حساب الحرارة النوعية	190
	iii حساب الإنتروبي	191
	iv حساب دالة هلمهولتز	192
	v حساب الضغط	192

الباب الحادي عشر

تطبيقات إحصاء بوز- اينشتين

Applications of Bose-Einstein Statistics

في هذا الباب سوف نستعرض بعض من تطبيقات إحصاء بوز- اينشتين المهمة. سنبدأ أولاً بإشعاع الجسم الأسود وصفاته. بالفصل الثاني سنلقي نظرة عامة علي أهم وأحدث التطبيقات ألا وهي تكثف بوز- اينشتين. وسوف نستعرض خواص غاز بوز- اينشتين المثالي بالفصل الثالث. وسوف نترك تطبيقات إحصاء بوز- اينشتين على المواد الفائقة التوصيل إلي كتاب أخر.

I- إشعاع الجسم الأسود (Black body radiation)



شكل (1) شكل نموذجى للجسم الأسود.

نعلم أن الحرارة الإشعاعية المنبعثة من جسم ما تعتمد على مساحته، نوعية مادته وأيضاً درجة حرارته. ويعرف الجسم الأسود (وهو جسم نظري) بأنه الجسم الذي له أعلى قدرة امتصاصية للأشعة الكهرومغناطيسية الساقطة عليه، وبالتالي فلن يكون هناك ضوء ينعكس منه، ولذا لا

نستطيع تحديد لونه. وحيث أن قدرته عالية للامتصاص فإن قدرته عالية أيضاً على الإشعاع. ونستطيع تمثيله بجسم مغلق أجوف به ثقب صغير ومطلي باللون الأسود من الداخل كما بالشكل 1). وبالتالي فإن الجسم يمتص كل الضوء الساقط عليه من خلال الثقب لأن الأشعة التي ستدخل خلال الثقب لن يسمح لها بالخروج مرةً أخرى نتيجة الانعكاسات المتتالية. وعندما يسخن الجسم الأسود فإنه يشع ضوءاً يحتوي على كل الأطوال الموجية الممكنة اعتماداً على درجة حرارته المطلقة (T).

و تبعا للوصف السابق والدراسات المعملية المكثفة (انظر الشكل 2) فإن الجسم الأسود له بعض المعالم الاستقرائية المهمة وهى:

1- يمتص كل الأشعة الساقطة (ولا يعكسها) بغض النظر عن الطول الموجى أو الاتجاه.

2- له قدرة عالية على الإشعاع (في جميع الاتجاهات) أكثر من أى جسم آخر.



شكل (2) مخطط لتوزيع الطاقة الإشعاعية $u(\lambda)$ للجسم الأسود مع طول الموجة λ عند درجات حرارة مختلفة.

3- منحنى الطاقة الإشعاعية المنبعثة من الجسم الأسود لا يعتمد على طبيعة المادة ولكن على درجة حرارتها.

4- المنحنيات عند درجة الحرارة المنخفضة تقع تماما بداخل المنحنيات ذات درجات الحرارة المرتفعة.

5- عند درجة حرارة ثابتة (T) تزداد الطاقة الإشعاعية المنبعثة من الجسم الأسود كلما ازداد طول الموجة، ثم تصل إلى قيمة عظمى ($\lambda_{\max}$) تبدأ بعدها الطاقة فى الانخفاض بزيادة الطول الموجى.

6- *قانون فين للإزاحة*: ينص على أن "العلاقة بين القيمة العظمى للطول الموجى ($\lambda_{\max}$) ودرجة الحرارة المطلقة (T) للجسم هي علاقة عكسية" بمعني أن:

$$\lambda_{\max} T = \text{ثابت}$$

وهي علاقة تعبر عددياً عن الحقيقة التجريبية التالية: بارتفاع درجة الحرارة فإن القمة في طيف الجسم الأسود تزاح باتجاه تناقص الطول الموجى (ازدياد التردد). وهذا يتفق مع الحقيقة أنه إذا ارتفعت درجة حرارة جسم متوهج يُصبح أكثر لمعاناً وأكثر بياضاً.

7- *قانون ستيفان للمساحة*: ينص على أن "الطاقة الإشعاعية الكلية لوحدة المساحات عند درجة حرارة ثابتة (T) تُعرف بالمساحة المحصورة بين المنحنى المحدد بقيمة (T) ومحور الطول الموجى وتعطى بالعلاقة:

$$u = bT^4$$

حيث b ثابت وقيمته هي $b = 7.55\times10^{-16}\ \text{J m}^{-3}\text{K}^{-4}$

8- *قانون ريلى- جينز* (Rayleigh-Jeans law): عند الترددات المنخفضة (الأطوال الموجية الطويلة) تُعرف الطاقة الإشعاعية بالعلاقة:

$$u(\lambda) \propto \frac{T}{\lambda^4} \ .$$

ومن معرفتنا بمبادئ الفيزياء التقليدية نتوقع أن الجسم الساخن يشع باستمرار كل حرارته علي هيئة موجات كهرومغناطيسية. ولكن من قانون ريلى- جينز نجد أن معدل الإشعاع يصبح مالانهاية عندما يؤول الطول الموجى الكهرومغناطيسي إلى الصفر، وسميت هذه المعضلة الغير منطقية حين ذاك بلغز "الكارثة الفوق بنفسجية Ultra-violet catastrophe". وأصبح السؤال: ماهو السبب في هذا اللغز نظرياً؟

9- *قانون فين* (Wien's law): عند الترددات المرتفعة (الأطوال الموجية القصيرة) تعرف الطاقة الإشعاعية بالعلاقة:

$$u(\lambda) \propto \lambda^{-5} e^{-d/\lambda T}$$

حيث d ثابت .

وقد نجح بلانك (1901) في حل معضلة "الكارثة الفوق بنفسجية" بفرضية أن "الطاقة الإشعاعية الممتصة أو المنبعثة لا تمثل فيضا من القيم المتصلة، ولكن من وحدات طاقة لا تتجزأ وسميت طاقة كم "Quanta" ومقدار الطاقة "E" التي يحملها كل طاقة كم تتناسب مع تردد الإشعاع "ν"، بمعنى أن:

$$E = h\nu = h\frac{c}{\lambda} \ ،$$

حيث h هو ثابت بلانك، ومن فرضيته اشتق بلانك علاقته المشهورة للطاقة الإشعاعية فى الصورة:

$$u(\lambda) = \frac{8\pi hc}{\lambda^5}\frac{1}{\left(e^{hc/\lambda k_B T}-1\right)} \qquad (1)$$

حيث k_B هو ثابت بولتزمان. وقد وجد أن هذا القانون أعطى تفسيرا كاملا لنتائج المعملية للإشعاع الحراري من الأجسام الصلبة بالرغم من غرابة الفرضية المقترحة.

مثال: اثبت قانون فين للإزاحة.

الحل: لإثبات قانون فين للإزاحة، فإننا نبحث عن الطول الموجى الذي تكون فيه كثافة الطاقة المعطاة بالمعادلة (1) في قيمتها العظمي وذلك باستخدام الشرط:

$$\left.\frac{\partial u(\lambda)}{\partial \lambda}\right|_{\lambda=\lambda_{\max}} = 0$$

وهذا الشرط يعطينا المعادلة:

$$x = 5(1-e^{-x})$$

حيث $x = \frac{\beta hc}{\lambda_{max}}$. بالإمكان حل المعادلة الأخيرة عددياً أو بالرسم البياني وحلها هو:

$$x = \frac{\beta hc}{\lambda_{max}} = \frac{hc}{\lambda_{max} k_B T} = 4.965$$

$$\Rightarrow \lambda_{max} T = \frac{hc}{4.965 k_B} = 2.897 \times 10^{-3} \text{ mK}$$

وهو المطلوب.

مثال: باستخدام قانون الإزاحة لفين احسب درجة حرارة سطح القمر إذا علم أن الطيف يصل ذروته عند الموجة $\lambda_{max} = 14 \times 10^{-6}$ m . أعتبر أن القمر جسم أسود.

الحل: باستخدام قانون الإزاحة لفين $\lambda_{max} T = 2.897 \times 10^{-3}$ mK نجد أن درجة حرارة سطح القمر هي:

$$T = \frac{2.897 \times 10^{-3} \text{ mK}}{\lambda_{max}} = \frac{2.897 \times 10^{-3} \text{ mK}}{14 \times 10^{-6} \text{ m}} \approx 207 \text{ K}$$

والآن قبل نطبق إحصاء بوز- أينشتين علي الإشعاع الجسم الأسود الكهرومغناطيسي (وباستخدام لغة ميكانيكا الكم، هو تجمع من الفوتونات) دعونا نسأل ما هي خواص الفوتونات؟ والإجابة هي أن خواص الفوتونات هي:

1- الحركة المغزلية للفوتونات لها القيمة $\hbar =$. ولذلك يطبق عليها إحصاء بوز- أينشتين.

2- لا تؤثر الفوتونات المثالية علي بعضها البعض.

3- كتلة الفوتون الساكنة منعدمة (zero rest mass)، لذلك فهو يتحرك بسرعة الضوء.

4- الفوتون يحقق علاقة التشتت (Dispersion relation)، $\omega = ck$، وبالتالي فإن

$$E = \hbar\omega = \hbar ck$$

5- للفوتونات نجد أن كمية الحركة الخطية تعرف بدلالة الطول الموجى λ ،أو التردد ν، كالتالي:

$$p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{c}\nu,$$

$$dp = \frac{h}{c} d\nu$$

حيث c هو سرعة الضوء في الفراغ. وباعتبار أن الفوتونات محتويه داخل جسم مغلق أجوف ذي حجم ثابت V ومتزن حرارياً عند درجة حرارة T مع الوسط المحيط به، فإن عدد الأنماط (مستويات الفوتونات) المتواجدة بين القيمتين p و $p - dp$ تعطي من العلاقة (انظر الباب الثالث الفصل الثالث):

$$g(p)dp = 2 \times 4\pi \frac{p^2}{h^3/V} dp, \qquad (2)$$

وعدد الأنماط المتواجدة بين قيمتي التردد ν و $\nu + d\nu$ تعطي بالعلاقة:

$$g(\nu)d\nu = 2 \times 4\pi V \frac{\nu^2}{c^3} d\nu \qquad (3)$$

حيث استخدم العدد "2 " في المعادلتين (2 و 3) نتيجة الاتجاهين المستقلين لاستقطاب الإشعاع الكهرومغناطيسي.

بالتالي فإن توزيع إحصاء بوز- اينشتين للفوتونات يعطي:

$$dn(\nu) = n(\nu)d\nu = \frac{g(\nu)d\nu}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1}$$

$$= 8\pi V \frac{\nu^2}{c^3} \frac{d\nu}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1} \qquad (4)$$

حيث $\varepsilon = h\nu$. وكثافة الطاقة $u d\nu = \frac{dn}{V}\varepsilon$ في المدى المحدد هي:

$$u(\nu)d\nu = g(\nu)\frac{h\nu d\nu}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1}$$

$$= 8\pi h \frac{\nu^3}{c^3} \frac{d\nu}{e^{\alpha+\beta\varepsilon} - 1} \qquad (5)$$

والمعادلة (5) تؤول إلي علاقة بلانك المشهورة للإشعاع (1) هذا إذا استخدمنا القيم التالية للفوتونات:

$$\alpha = 0, \qquad \beta = \frac{1}{k_B T}$$

وهذا يعني ببساطة أننا أهملنا الشرط $\delta N = \sum \delta n = 0$ والذي يدل علي أن العدد الكلي للفوتونات يظل ثابتاً. بالطبع فإن الفوتونات تختلف عن جسيمات البوزونات، في أن عدد الفوتونات الكلية لا تكون ثابتة وذلك ناتج عن ظاهرة الخلق Creation و الإفناء Annihilation .

واجب منزلي: باستخدام التعويضات التالية:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \frac{d\nu}{d\lambda} = -\frac{c}{\lambda^2},$$

و

$$u(\lambda) = -u(\nu)\frac{d\nu}{d\lambda} = u(\nu)\frac{c}{\lambda^2}$$

اثبت أن المعادلة (5) تؤول إلي قانون بلانك (انظر المعادلة 1).

تعليقات:

1- عند الترددات المنخفضة $(h\nu << k_B T \quad \Rightarrow \quad \beta h\nu << 1)$ نستخدم التقريب:

$$\left(e^{\beta h\nu} - 1\right) \approx 1 + \beta h\nu - 1 \approx \beta h\nu$$

فنجد أن المعادلة (5) تؤول إلي قانون ريلي- جينز:

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi k_B T}{c^3}\nu^2 d\nu, \qquad (6)$$

2- عند الترددات المرتفعة $(h\nu >> k_B T \quad \Rightarrow \quad \beta h\nu >> 1)$ نستخدم التقريب:

$$\left(e^{\beta h\nu} - 1\right) \approx e^{\beta h\nu}$$

فنجد أن المعادلة (5) تؤول إلي قانون فين:

$$u(\nu)d\nu = \frac{8\pi h}{c^3}\nu^3 e^{-\beta h\nu} d\nu, \qquad (7)$$

3- لإيجاد كثافة الطاقة الكلية نتكامل المعادلة (5) لجميع أنماط التذبذب الممكنة، وهي تأخذ القيم من صفر إلي مالانهاية بالنسبة للأشعة الكهرومغناطيسية، كالأتي:

$$u = \int_0^\infty u(\nu,T)d\nu = \frac{8\pi\hbar}{c^3}\int_0^\infty \frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu} - 1}d\nu, \qquad (8)$$

وباستخدام التعويض $x = \beta h\nu$ ، نجد:

$$u = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3}\left(\frac{k_B T}{\hbar}\right)^4 \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^3}{e^x - 1}dx}_{\frac{\pi^4}{15}} = bT^4, \qquad (9)$$

وهو قانون ستيفان- بولتزمان، حيث:

$$b = \frac{8\pi^5 k_B^4}{15c^3 h^3} = 7.55\times10^{-16}\ \mathrm{J\,m^{-3}K^{-4}}$$

وقد تم التحقق من هذه العلاقة عملياً.

بالطبع، فإن معظم الأجسام المشعة، مثل الشمس والغازات الساخنة لا تعتبر أجسام سوداء مثالية ولهذا فإنهم لا يحققون العلاقات السابقة بدقة.

وبأسلوب حسابي آخر، لن نتعرض له هنا، يمكن استنتاج أن الكثافة الإشعاعية الكلية مرتبطة بالانبعاث الإشعاعي (الانبعاثيه $\Re$) (Radiation emittance) (وهي كمية الطاقة الإشعاعية المنبعثة من وحدة السطوح لجسم تام السواد في الثانية الواحدة) بالعلاقة التالية:

$$\Re = \frac{c}{4}u = \sigma T^4, \qquad (10)$$

حيث $\sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5.67\times10^{-8}\ \mathrm{W\,m^{-1}K^{-4}}$ هو ثابت ستيفان- بولتزمان. وهذه النتيجة أيضاً تتفق مع الحسابات المعملية.

4- الحرارة النوعية للجسم التام السواد تأتي بالتالي عن طريق تفاضل المعادلة (9) لنحصل علي:

$$c_v = 4bT^3, \qquad (11)$$

وهي تؤول للصفر عندما تصل درجة حرارة الجسم للصفر المطلق.والمعادلة (11) تشبه معادلة ديباي للأجسام الصلبة.

واجب منزلي: للفوتونات اثبت الأتي:

$$Z_{photon} = \prod_{i=1}^{\infty} \frac{1}{1-e^{-\beta\varepsilon_i}} \tag{12}$$

$$F = -\frac{1}{3} bVT^4, \tag{13}$$

$$S = \frac{4}{3} bVT^3, \tag{14}$$

$$P = \frac{1}{3} bT^4, \tag{15}$$

$$E = F + TS = bVT^4 \tag{16}$$

II– تكثيف بوز – اينشتين Bose-Einstein Condensation

لنظام يتكون من عدد N من جسيمات البوزون المستقلة والمحدد بوعاء ذو حجم V ودرجة حرارته المطلقة هي T، نجد أن التوزيع الأكثر احتمالاً هو:

$$f(\varepsilon_i) = \frac{N_i^*}{g_i} = \frac{1}{e^{-\beta\mu+\beta\varepsilon_i}-1} \tag{1}$$

حيث الرمز N_i^* يمثل عدد جسيمات البوزون التي لها الطاقة ε_i و g_i هو درجة الانتماء وتعبر عن المستويات التي لها نفس الطاقة ε_i.

ومن شرط ثبوت العدد الكلي للجسيمات داخل النظام المغلق نجد أن:

$$\begin{aligned} N &= \sum_{\substack{i=0 \\ (levels)}}^{\infty} N_i^* = \sum_{\substack{i=0 \\ (levels)}}^{\infty} \frac{g_i}{e^{\beta(\varepsilon_i-\mu)}-1} \\ &= \frac{g_o}{e^{\beta(\varepsilon_o-\mu)}-1} + \frac{g_1}{e^{\beta(\varepsilon_1-\mu)}-1} + \cdots \\ &= N_o + N_1 + \cdots \end{aligned} \tag{2}$$

حيث التجميع يتم بالمعادلة (2) على جميع مناسيب الطاقة. ولكي نحتفظ لكل منسوب بعدد موجب للجسيمات N_i، فيجب أن يتحقق الشرط $\mu \le 0$ أو $e^{-\beta\mu} \ge 1$ لجميع الطاقات ε_i.

دعونا نركز الآن علي عدد الجسيمات بالمستوى الأرضي باعتبارها N_o، حيث طاقة المستوي $\varepsilon_o = 0$، فنجد أن:

$$N_o = f(\varepsilon_o = 0) = \frac{1}{e^{\alpha}-1}$$

بالتأكيد يجب أن تكون القيمة $\alpha > 0$ لنحصل علي عدد موجب ومحدود من الجسيمات. ولنعين علاقة e^{α} مع درجات الحرارة المطلقة، سوف نفترض أنه باقتراب درجة الحرارة الغاز من الصفر المطلق فإن $N_o = N$. لذلك نجد أن:

$$N = \frac{1}{e^{\alpha}-1} \qquad \Rightarrow \quad \alpha = \ln\left(1+\frac{1}{N}\right) \approx \frac{1}{N}$$

وحيث أن N هو عدد فلكي، فإننا نستطيع، وبدون أخطاء حسابية، أن نضع $\alpha = 0$ أو $e^{\alpha} = 1$ بالمعادلة (1) عند درجات الحرارة المنخفضة. لهذا نجد أن المستوي الأرضي يمكن أن يملأ بعدد كبير جداً من الجسيمات الكلية.

والآن لكي نحسب العدد الكلي لجسيمات البوزون بالمستويات المثارة، والذي يتساوي مع العدد الكلي للجسيمات عند درجات الحرارة المرتفعة، دعونا نحسبه كلاسيكياً باستخدام المعادلة:

$$N_e = N = \sum_{\substack{i=0 \\ (levels)}}^{\infty} N_i^* = \int_0^{\infty} \frac{g(\varepsilon)d\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}-1} \tag{2a}.$$

وباستخدام كثافة الشحنات بالصورة $g(\varepsilon) = \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2}\sqrt{\varepsilon}$، نجد أن عدد الجسيمات الكلية هي:

$$\begin{aligned} N_e &= \frac{V}{2\pi^2}\left(\frac{m}{\hbar^2}\right)^{3/2} \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon}{e^{\alpha+\beta\varepsilon}-1} \\ &= \frac{V}{\lambda^3}\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{\infty} \frac{\sqrt{x}\, dx}{z^{-1}e^{x}-1} \end{aligned} \tag{3}$$

حيث استخدمنا $x = \beta\varepsilon$ والبارامترات التالية:

الطول الموجي لدي- برولي $\lambda = \dfrac{h}{\sqrt{2\pi mk_BT}}$

الفعالية المطلقة (Absolute activity) للغاز أو (Fugacity) $z = e^{-\alpha} = e^{\mu\beta} \le 1$

لنا هنا تعليق مهم على المعادلة (3) وهو أن المعامل $\sqrt{\varepsilon}$ بكثافة المستويات يضمن عدم اسهام جسيمات المستوي الأرضي $(\varepsilon = 0)$ بالحسابات، ولذلك نستطيع وضع $z = 1$ حيث أننا أهملنا المستوي الأرضي.

والآن باستخدام التكامل القياسي:

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}dx}{e^x - 1} = 1.306\sqrt{\pi}$$

فإن المعادلة (3) تؤول إلي:

$$N_e = 2.612V \times \left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2} \qquad (4)$$

وكما نعرف، فإن جسيمات البوزون تفضل التجمع في نفس المستوى، وهذا عكس جسيمات الفيرميون. من هنا نجد أنه عندما تصل درجة حرارة الغاز "T" إلي درجة الحرارة الحرجة "T_B" فإن جسيمات البوزون تبدأ في التجمع في المستوي الأرضي، ولكن تظل كثافة جسيمات البوزون بالمستويات المثارة مرتفعة جداً، بمعني أن $N_e \approx N$. وبخفض درجات الحرارة عن "T_B" نجد أن الجسيمات تزداد كثافتها بالمستوى الأرضي، حيث أن $\alpha \propto N^{-1}$. وعندما نصل إلي درجة الصفر المطلق نجد أن جميع جسيمات البوزون تملأ المستوى الأرضي فقط. لذلك عند $T = 0$ نجد أن $N_o = N$. ولحساب درجة الحرارة الحرجة، T_B، نضع T_B بدلاً من T و N بدلاً من N_e بالمعادلة (4) لنحصل على:

$$T_B = \frac{h^2}{2\pi mk_B}\left(\frac{N}{2.612V}\right)^{2/3} \qquad (5)$$

مثال: لمول واحد من غاز He^4 تحت ضغط جوي 1، احسب T_B.

الحل: لمول واحد من الغاز، نعلم أن $N = N_A = 6.02\times10^{23}$ molecules/mol، وحجم الغاز تحت ضغط جوي 1 هو $V = 22.4\times10^{-3}$ m^3 وكتلة الغاز هي $m = 4\times1.66\times10^{-27} = 6.65\times10^{-27}$ kg. وباستخدام المعادلة (5) نجد:

$$T_B = \frac{h^2}{2\pi mk_B}\left(\frac{N}{2.612V}\right)^{2/3}$$

$$= \frac{(6.63\times10^{-34})^2}{2\pi(6.65\times10^{-27})\times1.38\times10^{-23}}\left(\frac{6.02\times10^{23}}{2.612\times22.4\times10^{-3}}\right)^{2/3} = 0.036\ \text{K}.$$

وهي قيمة صغيرةً جداً مقارنةً بالقيمة العملية وهي 4.21 K. وملاحظة عامه، فإن جميع الغازات المثالية تتحول إلي الحالة السائلة قبل أن تصل إلي درجة الحرارة الحرجة "T_B".

واجب منزلي: لمول واحد من غاز H_2 تحت ضغط جوي 1، احسب T_B. قارن النتيجة مع القيمة العملية 14 K.

بقسمة المعادلتين (4) و(5) نحصل علي عدد الجسيمات بالمستويات المثارة كدالة في درجة الحرارة بالمعادلة:

$$N_e = N\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2} \qquad (6)$$

وباقي الجسيمات والتي تتجمع بالمستوى الأرضي تصبح:

$$N_o = N - N_e = N\left[1 - \left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}\right] \qquad (7)$$

ولنا هنا ملاحظة وهي إن عملية التغيير من التجميع إلي التكامل بالمعادلة (2a) عند درجات الحرارة المنخفضة، $T < T_B$، قد أحدثت خطأً جسيماً وذلك نتيجةً إهمالنا للحد $g(\varepsilon = 0) = 0$ بكثافة المستويات. وبإهمال هذا الحد فقد تم إهمال الإسهام الكبير الناتج من المستوى الأرضي. ولقيم صغيرة من z (أو قيم كبيرة من $e^{-\mu\beta}$) فإن إسهام المستويات الأولية يكون منعدماً،

بالتالي فعملية التغيير من تجميع إلي تكامل لا ينشأ عنة أية خطأ جوهري أو محسوس. بينما، عندما تقترب z من الواحد الصحيح (أو تكون $e^{-\mu\beta}$ صغيرة)، فإن المستوى الأرضي يصبح مهماً وإسهامه يجعل تجاهله خطأ جسيماً. ولهذا لا نستطيع تغيير التجميع إلي تكامل عندما نقترب من الصفر المطلق.

وهذا التكثيف السريع للجسيمات يحدث عندما تقل درجة حرارة النظام عن T_B. وتسمي هذه الظاهرة تكثيف بوز – اينشتين. وشكل (3) يوضح مدي تغير $\frac{N_o}{N}$ و $\frac{N_e}{N}$ مع درجة الحرارة المطلقة للغاز.



شكل (3) تغير $\frac{N_o}{N}$ و $\frac{N_e}{N}$ مع درجة الحرارة المطلقه.

ولسنوات عديدة اعتقد الفيزيائيون أن تكثيف بوز- اينشتين ضرب من الخيال ولا يوجد في الطبيعة. ولكن في عام 1995 انتج الباحثون تكثيف بواسطة تبريد بخار من ذرات الروبيديوم لدرجة حرارة 1.3×10^{-7} K. وقد عرف هذا الإنجاز بأنة أهم انجاز في الفيزياء الذرية خلال القرن الماضي. وقد فَتح هذا الإنجاز الباب علي مصراعيه للبحث في مجال جديد.

ملاحظات:

1- تجميع (تكثيف) جسيمات البوزون يحدث فقط في حال الجسيمات التي تحتفظ بعدد ثابت. هذا الشرط يجعل جسيمات الفوتون لا تتكاثف حيث أن لها صفة التخليق والفناء.

2- عند الشرط $T<T_B$ نستطيع أن ننظر إلي النظام علي أنه مزيج من حالتين (طورين) ألا وهما:

أ- حالة غازية تتكون من N_e من الجسيمات والتي تتوزع على المستويات المثارة، حيث $\varepsilon\neq0$.

ب- حالة تكثيف تتكون من N_o من الجسيمات والتي تتجمع في المستوى الأرضي، حيث $\varepsilon=0$

3- نجد أن الطول الموجي عندما $T<T_B$ يعرف من المعادلة

$$N=\frac{V}{\lambda_B^3}\times2.612$$

$$\Rightarrow\quad \lambda_B^3=\frac{2.612}{\rho},\quad \rho=\frac{N}{V} \qquad (7)$$

ولهذا فإن الطول الموجي مرتبط بمتوسط المسافة بين الجسيمات. ولذلك يظهر التداخل بين الدوال الموجية، ولذا تتضح أهمية التأثير الكمي.

4- بالطبع فإن جسيمات البوزون المستقرة بالمستوى الأرضي لا تساهم بالطاقة الداخلية أو الحرارة النوعية للنظام. وذلك لأنه عندما تكون $T<T_B$ فإن عدد جسيمات البوزون المستقرة بالمستوى الأرضي يصبح كبيراً جداً، ولكن طاقة المستوى $\varepsilon=0$. أما في الحالة $T>T_B$ فإن $N_o=0$ في أية حال.

III- خواص غاز البوزون المثالي عند درجات الحرارة المختلفة
The Properties of Ideal Bose-Einstein Gas

من توزيع بوز – أينشتين الأكثر احتمالاً:

$$f(\varepsilon_i)=\frac{1}{e^{-\beta\mu+\beta\varepsilon_i}-1} \qquad (1)$$

نستطيع حساب خواص غاز البوزون المثالي التالية:

i– حساب الطاقة الداخلية

عند درجات الحرارة المرتفعة $T > T_B$، نجد أن قانون ديولنج– بيتي يعطي:

$$U_+ \to \frac{3}{2} N k_B T \tag{2}$$

وعند درجات الحرارة المنخفضة $T < T_B$، نجد أن:

$$U_- = N\varepsilon = \int_0^\infty \frac{g(\varepsilon)\varepsilon d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}-1}$$

$$= 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\varepsilon^{3/2} d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}-1} \tag{3}$$

وبالقرب من المستوي الأرضي نضع $\mu = 0$، واستخدام التعويض $x = \varepsilon / k_B T$ نحصل علي:

$$U_- = \frac{2}{\sqrt{\pi}} k_B T \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \underbrace{\int_0^\infty \frac{x^{3/2} dx}{e^x - 1}}_{1.78} \tag{4}$$

ومن المعادلة $(II.5)$ نجد أن:

$$V = \frac{1}{2.612}\left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T_B}\right)^{3/2}$$

وبالتعويض منها بالمعادلة (4) نحصل على:

$$U_- = 0.77 N k_B T \left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}, \tag{5}$$

وهذا يدل على أن الطاقة الداخلية تتغير كما $T^{5/2}$ عند الدرجات المنخفضة.

ii– حساب الحرارة النوعية

عند درجات الحرارة المرتفعة $T > T_B$، نجد أن الحرارة النوعية تأخذ القيمة الكلاسيكية:

$$C_{V+} = \left(\frac{\partial U_+}{\partial T}\right)_V \approx \frac{3}{2} N k_B \tag{6}$$

أما عند درجات الحرارة المنخفضة $T < T_B$، فنجد:

$$C_{V-} = \left(\frac{\partial U_-}{\partial T}\right)_V \approx 1.92 N k_B \left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2} \tag{7}$$

ويظهر سلوك الحرارة النوعية مع درجة الحرارة بالشكل (4). فعند درجات الحرارة المنخفضة يبدأ المنحني في الازدياد من القيمة صفر عند الصفر المطلق حتى يصل إلي قيمة عظمي، وهي $1.92 N k_B$، وذلك عندما تتساوي درجة الحرارة مع الدرجة الحرجة T_B، بمعني أن $T = T_B$. وبعدها يبدأ ميل المنحنى في التغير مع ارتفاع درجة الحرارة. وعند درجات الحرارة العليا تأخذ الحرارة النوعية القيمة الكلاسيكية وهي $1.5 N k_B$.



شكل (4) تغير الحرارة النوعية تحت حجم ثابت مع درجة الحرارة. BE يرمز إلى إحصاء بوز – أينشتين و MB يرمز إلى إحصاء ماكسويل – بولتزمان.

iii– حساب الإنتروبي

القيمة المطلقة للإنتروبي عند درجات الحرارة المنخفضة تحسب من قانون الحرارة النوعية كالتالي:

$$S = \int_0^T \frac{C_{V-}}{T'} dT' = 1.28 N k_B \left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2} \tag{8}$$

ونجد أن الإنتروبي يؤول للصفر عند $T=0$ ، كما هو معرف بالقانون الثالث للديناميكا الحرارية.

iv– حساب دالة هلمهولتز

تحسب دالة هلمهولتز عند الشرط $(T<T_B)$ كالتالي:

$$F=U-TS$$

$$=0.51N\,k_B\left(\frac{T}{T_B}\right)^{3/2}$$

$$=-1.33\,k_BT\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2}V \qquad (9)$$

v– حساب الضغط

من المعادلة (9) نستطيع أن نحسب الضغط بالعلاقة:

$$P=-\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$

$$=1.33\,k_BT\left(\frac{2\pi mk_BT}{h^2}\right)^{3/2} \qquad (10)$$

ومن المعادلة **(10)** نجد أن الضغط يتناسب مع $T^{5/2}$ عند درجات الحرارة المنخفضة، ولا يعتمد علي الحجم. وعند الصفر المطلق نجد أن جميع جسيمات البوزون تحتل المستوي الأرضي، $\varepsilon=0$ ، ولا يكون لها كمية حركة خطية، وبالتالي ليس لها أي مساهمة في الضغط.

واجب منزلي: اثبت أن الضغط لغاز البوزون يعطي بالعلاقة:

$$P=\frac{2}{3}\frac{U}{V} \qquad (11)$$

وهي شبيهة بمعادلة الغاز المثالي.

الباب الثاني عشر

الحرارة النوعية للأجسام الصلبة

الفصل	العنوان	الصفحة
I	النموذج التقليدي	194
II	نظرية أينشتين	196
III	نظرية ديباي	198
	i عند درجات الحرارة المرتفعة جداً	202
	ii عند درجات الحرارة المنخفضة جداً	203
IV	أمثلة عامة	206

الباب الثاني عشر

الحرارة النوعية للأجسام الصلبة

Specific Heat of Solids

تعرضنا بالباب السابع لحساب الحرارة النوعية للجزيئات ثنائية الذرات، وهنا سوف نتعرض لحساب الحرارة النوعية للأجسام الصلبة (الجوامد) بثلاث طرق مختلفة وهي: النموذج التقليدي، نظرية أينشتين، ونظرية ديباي.

I- النموذج التقليدي (Classical model)

تختلف الجوامد (معظمها معادن) عن الغازات والسوائل، في الافتراضات التقليدية التالية:

1- أن الجسم الصلب (مثل البلورات) تتكون من ذرات تأخذ على أنها متطابقة ومميزة ولها موقع ثابت، ألا وهو نقاط الشبكية (Lattice point).

2- كل ذرة من ذرات الجسم الصلب، الأحادي الذرة، تعتبر مستقلة عن الذرات الأخرى.

3- كل ذرة تتذبذب بحركة توافقية بسيطة لها نفس التردد (ν_E) وتسمى ذبذبات الشبكة (Lattice vibrations).

4- الذبذبات لكل ذرة تنقسم إلى ثلاثة ذبذبات مستقلة باتجاه محاور الإحداثيات (X, Y, Z).

من هذا التصور فإن الجسم الصلب الذي يتكون من عدد N من الذرات يكافئ عدد $3N$ من ذبذبات الحركة التوافقية البسيطة حول مركز الإتزان. هذا التردد بالطبع يتوقف على كتلة الذرة والقوى المؤثرة بين الذرات مثل قوى الإرجاع (Restoring force). من هذا التصور، نجد أن الطاقة الكلية للنظام تُعطى بالمعادلة:

$$E = \sum_{i=1}^{3N} E_i, \qquad E_i = \frac{p_{xi}^2}{2m} + \frac{1}{2} k_i x_i^2 \qquad (1)$$

حيث p_{xi} هي كمية الحركة الخطية للذرة i باتجاه المحور X و x_i هي الإزاحة من وضع الاتزان. إذا افترضنا أن درجات الحرارة مرتفعة بحيث أن الوصف التقليدي يمكن تطبيقه،

فبإمكاننا استخدام نظرية التوزيع المتساوي للطاقة على درجات الحرية بحيث أن الطاقة المتوسطة الكلية (الطاقة الداخلية للبلورة) هي:

$$U = (3N + 3N)\left(\frac{1}{2} k_B T\right)$$

$$= 3N k_B T = 3RT \qquad (2)$$

وذلك إذا اعتبرنا أن $N = N_A$. ولهذا فإن الحرارة النوعية تحت حجم ثابت تصبح على الصورة:

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = 3R \approx 25 \ \text{J mole}^{-1}\text{K}^{-1} \qquad (3)$$

وهذه هي القيمة التقليدية لدولنج - بيتي (Douling-Petit)، والتي توصف بالشكل (1):



شكل (1): تغير الحرارة النوعية (C_P و C_V) مع درجة الحرارة المطلقة للمعادن تحت ضغط جوي واحد.

ولنا هنا وقفة، حيث وجد أن القيمة النظرية $C_V = 3R$ لا تعتمد على درجات الحرارة وتتطابق مع القيم العملية لمواد كثيرة عند درجات الحرارة المرتفعة خاصةً عندما $T >> \theta$، كما بالشكل (1)، أي أن:

$$\lim_{T \to \infty} C_V = 3R \qquad (4)$$

ومن ذلك يمكن تعريف درجة الحرارة θ، تبعاً للنظرية المستخدمة، على أنها درجة الحرارة التي تفصل بين السلوك التقليدي للكميات الفيزيائية عندما $T >> \theta$ والسلوك الكمي عندما

$T << \theta$. وقد وجد أنه عند درجات الحرارة المنخفضة، $T << \theta$، فإن C_V تتناقص مع تناقص درجات الحرارة حتي تصل للصفر عندما $T \to 0$. وهذا التناقص يتم تدريجياً تبع لقانون يعطي السلوك:

$$\lim_{T<<\theta} C_V \propto T^3 \qquad (5)$$

وقد تم التحقق منه عملياً لمعظم الجوامد. وهذا السلوك التناقصي، عند درجات الحرارة المنخفضة، هو ما دفع أينشتين أن يتجه إلى استخدام النظرية الكمية لحساب الحرارة النوعية للجسم الصلب، وهذا ما سنقوم بشرحه بالفصل التالي.

II- نظرية أينشتين (Einstein Theory)

استخدم أينشتين النظرية الكمية لحساب الحرارة النوعية للأجسام الصلبة وافترض أن كل ذرة من ذرات الجسم الصلب تتذبذب بحركة توافقية بسيطة لها نفس التردد (ν_E) أو التردد الزاوي ω_E. ومن معرفتنا لطاقة المستويات للحركة التوافقية البسيطة الكمية والتي تأخذ الشكل العام:

$$\begin{aligned}\varepsilon_n &= (n+\tfrac{1}{2})h\nu_E \\ &= (n+\tfrac{1}{2})\hbar\omega_E, \qquad n = 0,1,2,\cdots \end{aligned} \qquad (1)$$

لذا نجد أن دالة التجميع لجسيم مفرد تحسب كالتالي:

$$Z_{sp} = \sum_n e^{-\beta\varepsilon_n} = \frac{e^{-a}}{1-e^{-2a}} = \frac{1}{e^a - e^{-a}} = (2\sinh a)^{-1}, \qquad (2)$$

حيث $a = \dfrac{\beta\hbar\omega_E}{2}$. وبما أن كل مول من الجسم الصلب له عدد $3N_A$ من درجات الحرية، لذلك فإن دالة التجميع الكلية تصبح:

$$Z = Z_{sp}^{3N_A} = (2\sinh a)^{-3N_A} \qquad (3)$$

ومنها فإن الطاقة الكلية للنظام تصبح:

$$U = 3N_A\hbar\omega_E\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{2a}-1}\right), \qquad (4)$$

والحرارة النوعية:

$$C_V = 3R\left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 \frac{e^{2a}}{\left(e^{2a}-1\right)^2} \qquad (5)$$

حيث Θ_E هي درجة حرارة أينشتين "*Einstein temperature*" وتكتب على الصورة:

$$\Theta_E = \frac{\hbar\omega_E}{k_B} \qquad (6)$$

وهي درجة الحرارة التي تفصل بين السلوك التقليدي للكميات الفيزيائية عندما $T >> \Theta_E$ عن السلوك الكمي عندما $T << \Theta_E$. ولحساب Θ_E يجب أن نعين التردد الطبيعي الاهتزازي للمادة ω_E والتي يمكن تعينها من الوزن الذري ومن معامل المرونة للمادة.

من المعادلة (5) نجد أن سلوك الحرارة النوعية يعرف كالتالي:

$$C_V = \begin{cases} 3R & T >> \Theta_E \\ 3R\left(\dfrac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T} & T << \Theta_E \end{cases} \qquad (7)$$

ومن هنا نجد أن الحرارة النوعية تتفق مع قانون دولنج- بيتي وأيضاً نجد أن:

$$\lim_{T\to 0} C_V \approx 0$$

كما تحقق منه عملياً.

واجب منزلي: اثبت أن المعادلة (5) تؤول إلى الصفر عندما تؤول T إلى الصفر المطلق.

ولنا تعليق هنا، حيث أنه وجد عملياً أن طريقة اقتراب الحرارة النوعية من الصفر عند اقتراب درجة الحرارة من الصفر المطلق يتم بطريقة أبطأ مما كان متوقع بواسطة نظرية أينشتين. السبب هنا يرجع إلى أن أينشتين افترض أن كل ذرة في النظام تتذبذب بنفس التردد الزاوي المميز ω_E، وهذا غير منطقي حتى ولو كانت الذرات متشابهة تماماً. وبالرغم من أن النظرية تعتبر غير مُتقنة، ولكنها حلت مشكلة كانت تعتبر مبهمة. وأعطت أيضاً تعريفاً للمعامل الحراري Θ_E والذي يعتمد على خواص المادة الصلبة.

III– نظرية ديباي (Debye's theory)

عند درجات الحرارة المنخفضة، وعندما يظهر التأثير الكمي بوضوح، نجد أن معظم المواد تكون في الحالة الصلبة. وكما علمنا سابقاً أن الذرات بالبلورة تُأخذ على أنها متطابقة ومميزة ولها موضع ثابت، ألا وهو نقاط الشبكية (Lattice points). وبالتالي فإن أي إزاحة صغيرة عن وضع الاتزان، لإحدى الذرات، سوف يتبعها إزاحة للذرات المجاورة. ونتيجة لهذا التأثير سوف تنتشر موجة، أو موجات (تسمى موجات مرنة) خلال البلورة. وبمعرفتنا بالطبيعة الموجية لحركة الذرات بشبكة البلورة سوف يسهل على نا استخدام النظرية الإحصائية الكمية لدراسة الحرارة النوعية للبلورات. وذلك بالمقارنة بنظرية الأشعة الكهرومغناطيسية داخل تجويف. والمشكلة الرئيسية تكمن هنا في أن شبكة البلورة غير متصلة وبالتالي فإن جميع أنوع الاهتزازات تصبح ممكنة. وبناءاً عليه يجب أن نتعامل مع جميع الاهتزازات للبلورة ككل، انظر الشكل (2).

شكل (2): بعض من الموجات المستعرضة في اتجاه واحد لبلورة

وقد افترض ديباي أنه إذا كانت المسافات البينية لذرات الجسم الصلب أصغر من أطوال الموجات المرنة، فإننا نستطيع أن نعتبر أن الجسم الصلب كجسم مائع، وهذا من وجهة نظر النظرية الموجية، واعتماداً على هذه الفكرة، فإن ديباي أقام نظريته على الفرضيات التالية:

1- تتأثر حركة كل ذرة نتيجة حركة الذرات المجاورة لها.

2- التردد الوحيد لذرات الجسم الصلب والمفترض بواسطة أينشتين سوف يتم الاستعاضة عنه بطيف من الترددات الاهتزازية والتي لها قيمة عظمى ν_D، وتسمى ν_D بتردد ديباي.

3- بالمقارنة بنظرية الموجات الكهرومغناطيسية داخل تجويف (حيث استخدمت الفوتونات بدلاً من الموجات) ، فإن الجسم الصلب يُنظر إليه على أنه غاز ذو جسيمات مستقلة (تسمى فونون، وهي كمة الطاقة للموجات المرنة) داخل الحجم V ، وهو حجم الجسم الصلب. والفرق الجوهري بين الفوتون والفونون هو أن الفوتون له اتجاهان مستعرضان للاستقطاب، أما الفونون فله ثلاث اتجاهات للاستقطاب. اثنين مستعرضان والثالث طولي.

ومن خلال الفرضيات السابقة فإن عدد الأنماط (مستويات طاقة الفونونات) المتواجدة بين قيمتي التردد ν و $\nu+d\nu$ تعطى من العلاقة:

$$g(\nu)d\nu = 4\pi V\left(\frac{2}{v_t^3}+\frac{1}{v_l^3}\right)\nu^2 d\nu \qquad (1)$$

حيث تم استخدام العددين "2" و"1" في بسط المعادلة (1) نتيجة لاتجاهات السرعة الموجية المرنة (موجتين مستعرضتين متعامدتين على بعضهما ولهما سرعتان متساويتين v_t وموجة طولية لها سرعة v_l).

ويظهر الفرق بين الكثافة $g(\nu)$ في تقريب ديباي وأينشتين في الشكل($3.a$). الشكل($3.b$) يوضح الكثافة $g(\nu)$ لبلورة حقيقية، وفيه نجد أن $g(\nu)$ تبدأ في ازدياد يتناسب مع ν^2 للترددات المنخفضة، ويظهر عدم الاستمرارية (عدم الانتظام) مع زيادة التردد.



شكل (3) كثافة الأنماط الاهتزازية كدالة في التردد
(a) تقريب ديباي واينشتين (b) الكثافة لبلورة حقيقية

ولحساب القيمة العظمى للتردد المسموح (Cut-off frequency) ν_D، فقد ساوى ديباي الأنماط الكلية للتذبذب بالقيمة $3N$ من خلال المعادلة:

$$\int_0^{\nu_D} g(\nu)d\nu = 3N,$$

وبالتعويض من المعادلة (1) نحصل على:

$$4\pi V\left(\frac{2}{\mathrm{v}_t^3}+\frac{1}{\mathrm{v}_l^3}\right)\int_0^{\nu_D}\nu^2 d\nu = 3N \qquad (1.a)$$

وبإجراء التكامل بالمعادلة (1.a) نجد:

$$\nu_D^3 = \frac{9N}{4\pi V}\left(\frac{2}{\mathrm{v}_t^3}+\frac{1}{\mathrm{v}_l^3}\right)^{-1} \approx \frac{3N}{4\pi V}\mathrm{v}_s^3 \qquad (2)$$

حيث v_s هي سرعة الصوت المتوسطة في المادة، وقد استخدمنا التقريب $\frac{1}{\mathrm{v}_t^3}\approx\frac{1}{\mathrm{v}_l^3}=\frac{1}{\mathrm{v}_s^3}$.

لذلك فإن:

$$\nu_D \propto \left(\frac{N}{V}\right)^{1/3} = \rho^{1/3}$$

وتتعين بالقيمة المتوسطة للمسافة الداخلية بين الذرات. لذلك فإن التركيب البلوري يضع حداً سفلياً للطول الموجي، بمعنى:

$$\lambda_{\min} \propto \rho^{-1/3}$$

من هذا الوصف نجد أن الترددات المرتفعة، $\nu \geq \nu_D$، لا تعطي أنماط جديدة للاهتزازات الذرية. وبناءً على هذا نضع (بعد التعويض من (2) في (1)):

$$g(\nu) = \begin{cases} 9N\,\dfrac{\nu^2}{\nu_D^3} & \text{for } \nu \leq \nu_D \\ 0 & \text{for } \nu \geq \nu_D \end{cases} \qquad (3)$$

وقانون التوزيع لبوز- أينشتين للفونون (وهو مشابه للفوتون) يعطى بالشكل:

$$dn = \frac{g(\nu)d\nu}{e^{\beta h\nu}-1} \qquad (4)$$

ومن المعادلتين (3) و (4) نجد أن:

$$\frac{dn}{V} = \begin{cases} \dfrac{9N}{\nu_D^3}\dfrac{\nu^2}{e^{\beta h\nu}-1}d\nu, & \nu \leq \nu_D \\ 0, & \nu \geq \nu_D \end{cases} \qquad (5)$$

وبضرب المعادلة (5) بطاقة الفونون $E = h\nu$ فإننا نحصل على الطاقة الداخلية لوحدة الحجوم، أو كثافة الطاقة بالشكل:

$$du = \frac{dU}{V} = \frac{9Nh}{\nu_D^3}\frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu}-1}d\nu \qquad (6)$$

وبتعريف درجة الحرارة لديباي "*Debye temperature*" بالصورة:

$$\Theta_D = \frac{h\nu_D}{k_B} \qquad (7)$$

وهي درجة الحرارة التي تفصل بين سلوك الكميات الفيزيائية، مثل الحرارة النوعية، كلاسيكياً عندما ($T >> \Theta_D$) وكمياً عندما ($T << \Theta_D$). وكما ذكرنا سابقاً، فإنه لحساب Θ_D يجب أن نعين التردد الطبيعي الاهتزازي للمادة ν_D والتي يمكن تعينها من حساب سرعة الصوت في المادة المطلوبة (انظر الأمثلة المحلولة). وحيث أن Θ_D هي المعامل الوحيد في النظرية، لذلك إذا رسمنا الحرارة النوعية لمواد صلبة مختلفة كدالة في المتغير $\frac{T}{\Theta_D}$، فسوف نجد أن جميع نقاط النتائج العملية تقع على منحنى وحيد.

ولحساب كثافة الطاقة الكلية سوف نستخدم التعويض التالي:

$$x = \frac{h\nu}{k_B T}, \qquad (8)$$

$$x_D = \frac{h\nu_D}{k_B T} \equiv \frac{\Theta_D}{T}, \qquad (9)$$

لنحصل على:

$$u-u_0=\int_0^{\nu_D}du=\frac{9Nh}{\nu_D^3}\int_0^{\nu_D}\frac{\hbar\nu^3}{e^{\beta h\nu}-1}d\nu$$

$$=\frac{9Nk_BT}{x_D^3}\int_0^{x_D}\frac{x^3}{e^x-1}dx \qquad (10)$$

حيث u_0 تعبر عن طاقة نقطة الصفر، وهي كمية ثابتة لا تؤثر في حساب الحرارة النوعية.

والحرارة النوعية تحسب من المعادلة:

$$C_V=\left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_V=\frac{9Nh}{\nu_D^3}\frac{\partial}{\partial T}\int_0^{\nu_D}\frac{\nu^3}{e^{\beta h\nu}-1}d\nu$$

$$=\frac{9Nh}{\nu_D^3}\frac{h\nu}{k_BT^2}\int_0^{\nu_D}\frac{\nu^4e^{\beta h\nu}}{\left(e^{\beta h\nu}-1\right)^2}d\nu$$

$$=\frac{9Nk_B}{x_D^3}\int_0^{x_D}\frac{x^4e^x}{\left(e^x-1\right)^2}dx \qquad (11)$$

دعونا الآن نحسب هذه الكميات الفيزيائية عند درجات الحرارة "T" المرتفعة جداً $T>>\Theta_D$ والمنخفضة جداً $T<<\Theta_D$.

i- عند درجات الحرارة المرتفعة جداً $T>>\Theta_D$

في المدى $0\le x\le x_D$ حيث $x_D<<1$ نستطيع في المعادلتين (10) و(11) أن نضع في البسط $e^x\approx 1$ وفي المقام $e^x-1\approx x$. ولهذا نجد أن الطاقة الكلية من المعادلة (10) تعطي:

$$u-u_0=\frac{9Nk_BT}{x_D^3}\int_0^{x_D}\frac{x^3}{e^x-1}dx$$

$$=\frac{9Nk_BT}{x_D^3}\int_0^{x_D}x^2dx=3Nk_BT \qquad (12)$$

والحرارة النوعية من المعادلة (11) هي:

$$C_V\simeq\frac{9Nk_B}{x_D^3}\int_0^{x_D}x^2dx=3Nk_B \qquad (13)$$

وهما يتطابقان مع النظرية التقليدية. وبتطابق نظريتي أينشتين وديباي مع النظرية التقليدية عند درجات الحرارة المرتفعة، فإن ذلك يعني أن السلوك الكمي للجسيمات غير متواجد.

ii- عند درجات الحرارة المنخفضة جداً $T<<\Theta_D$

في المدى $0\le x\le x_D$ حيث $x_D>>1$ نستطيع أن نغير نهاية التكامل من x_D إلى ∞، ولهذا نجد أن كثافة الطاقة لكلية:

$$u-u_0=\frac{9Nk_BT}{x_D^3}\int_0^{\infty}\frac{x^3}{e^x-1}dx$$

$$\approx\frac{9Nk_BT}{x_D^3}\underbrace{\int_0^{\infty}x^3e^{-x}dx}_{\frac{\pi^4}{15}}=\frac{3\pi^4}{5}Nk_BT\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \qquad (14)$$

أي تناسب كثافة الطاقة الكلية مع "T^4" وهي مشابهه لقانون ستيفان لإشعاع الجسم الأسود. ومن هذا يتضح أن كلا الفوتون والفونون بإتباعهم لنفس الإحصاء يظهرون نفس السلوك لكثافة الطاقة الكلية. الفرق هنا أن الفوتون يتبع قانون "T^4" لكل درجات الحرارة ولكن الفونون يتبع نفس القانون، فقط، عند درجات الحرارة المنخفضة جداً.

ومن المعادلة (11)، أو (14)، نجد أن الحرارة النوعية هي:

$$C_V=\frac{9Nk_B}{x_D^3}\underbrace{\int_0^{\infty}\frac{x^4e^x}{\left(e^x-1\right)^2}dx}_{\frac{4\pi^4}{15}}=\frac{12\pi^4}{5}Nk_B\left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3 \qquad (15)$$

ومن المعادلة (15) يتضح أن الحرارة النوعية تتناسب طردياً مع "T^3" وهو قانون ديباي المعرف بقانون $\left(T^3-\text{law}\right)$ والذي تم التحقق منه عملياً عند درجات الحرارة المنخفضة $\left(T\le\frac{\Theta_D}{10}\right)$. و يوضح الشكل (4) الفرق بين النظرتين.



شكل (4) الفرق بين الحرارة النوعية لنظريتي أينشتين وديباي.

الجدول (1) يعرف درجة حرارة ديباي $\Theta_D(\mathrm{K})$ لبعض المواد. من الجدول، يتضح لنا أنه عند درجة حرارة الغرفة $T = 300\,\mathrm{K}$، نستطيع أن نتعامل مع المواد مثل الرصاص والزئبق والفضة بالقوانين التقليدية. وللمواد الأخرى مثل النحاس والحديد والماس فإن التعامل معهم لا يتم إلا بواسطة قوانين ميكانيكا الكم.

المادة Substance	درجة حرارة ديباي $\Theta_D(\mathrm{K})$
رصاص Lead	88
زئبق Mercury	97
فضة Silver	215
نحاس Copper	315
حديد Iron	453
ماس Diamond	1860

جدول (1): درجة حرارة ديباي لبعض المواد الصلبة

وبالرغم من نجاح نظرية ديباي في تفسير الاختلاف عند درجات الحرارة المنخفضة، فقد ظهرت أيضاً بعض الاعتراضات المهمة على نموذج ديباي، ألا وهي:

1- هذا النموذج يتحقق فقط للأطوال الموجية الطويلة، أي الترددات المنخفضة التي تنشط بالمواد الصلبة.
2- الأنماط الكلية للتذبذب قد افترضت أنها تساوي $3N$. وهذا الافتراض لا نستطيع تبريره حيث أن الجسم الصلب اعتبر أنه جسم مرن وبالتالي يمتلك مالانهاية من الذبذبات.
3- الذبذبة العظمى ν_m افترضت أنها متساوية للموجات الطولية والمستعرضة. وهذا الفرض أيضاً غير مبرر حيث أن السرعات المختلفة للموجات الطولية والمستعرضة تتطلب ذبذبات مختلفة لكل منهما.
4- تبعاً لنظرية ديباي فإن Θ_D لا تعتمد على درجات الحرارة، ولكن وُجد أنها تتغير مع تغير درجات الحرارة بما يقارب 10% أو أكثر.
5- النظرية طُبقت على البلورات وحيدة الذرة ولا يمكن تطبيقها على البلورات متعددة الذرات.
6- النظرية أهملت تماماً التفاعل بين الذرات وأيضاً مشاركة الإلكترونات في الحرارة النوعية.

وقد ركزت الأبحاث الحديثة على دراسة سلوك الجوامد عند درجات الحرارة المنخفضة جداً. وأظهرت النتائج المعملية للمواد الصلبة، غير البلورية (Amorphous materials) مثل الزجاج، أن كثافة المستويات لها تأخذ أشكالاً غير منتظمة وتتركز عند الترددات المنخفضة. ولهذا السبب لا ينطبق عليها قانون ديباي ولا عند درجة الحرارة المنخفضة مثل $0.01\,\Theta_D$.
فسبحان الله، ما أُتينا من العلم إلا قليلا.

IV- أمثلة عامة

مثال 1: أوجد الحرارة النوعية للماس عند درجة الحرارة 200 K باستخدام نظريتي أينشتين وديباي، وذلك بمعلومية كل من $\Theta_E = 1450\ \mathrm{K}$ و $\Theta_D = 1860\ \mathrm{K}$. وقارنهما بالقيمة العملية للحرارة النوعية عند هذه الدرجة وهي $2.5\times10^{3}\ \mathrm{J\cdot kilomole^{-1}\cdot K^{-1}}$.

الحل

الحرارة النوعية باستخدام نظرية ديباي تحسب كالتالي:

$$C_V\,(\text{Debye}) = \frac{12\pi^4}{5} R \left(\frac{T}{\Theta_D}\right)^3$$

$$= \frac{12\pi^4}{5} 8.314 \left(\frac{200}{1860}\right)^3 = 2.4\times10^{3}\ \mathrm{J\cdot kilomole^{-1}\cdot K^{-1}}$$

ولأينشتين تحسب كالتالي:

$$C_V\,(\text{Einstein}) = 3R \left(\frac{\Theta_E}{T}\right)^2 e^{-\Theta_E/T}$$

$$= 3\times8.314 \left(\frac{1450}{200}\right)^2 e^{-1450/200} = 9.3\times10^{2}\ \mathrm{J\cdot kilomole^{-1}\cdot K^{-1}}$$

وتقترب قيمة ديباي النظرية من القيمة العملية المعطاة.

مثال 2:

أ- أثبت أن درجة حرارة ديباي "Θ_D" يمكن تعيينها من حساب سرعة الصوت في المادة المطلوبة من خلال إثبات أن:

$$\Theta_D = \frac{h\,\mathrm{v_s}}{k_B} \left(\frac{3N_A\rho}{4\pi M}\right)^{1/3}$$

حيث $\mathrm{v_s}$ هي سرعة الصوت المتوسطة في المادة.

ب- احسب Θ_D لمعدن النحاس بمعلومية كثافته $\rho = 8.95\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}$ وكتلته الذرية $M = 63.6\ \mathrm{amu}$ وسرعة الصوت المتوسطة في النحاس هي $\mathrm{v_s} = 2.24\times10^{3}\ \mathrm{ms^{-1}}$.

الحل

أ- باستخدام المعادلة:

$$\nu_D^3 = \frac{9N}{4\pi V}\left(\frac{2}{\mathrm{v}_t^3} + \frac{1}{\mathrm{v}_l^3}\right)^{-1}$$

$$= \frac{3N}{4\pi V}\mathrm{v}_s^3 = \frac{3}{4\pi\rho}\mathrm{v}_s^3$$

لذلك نجد:

$$\Theta_D = \frac{h\nu_D}{k_B} = \frac{h\,\mathrm{v_s}}{k_B}\left(\frac{3N_A\rho}{4\pi M}\right)^{1/3}$$

ب- لحساب Θ_D لمعدن النحاس نستخدم العلاقة:

$$\Theta_D = \frac{h\,\mathrm{v}}{k_B}\left(\frac{3N_A\rho}{4\pi M}\right)^{1/3}$$

$$= \frac{\left(6.63\times10^{-34}\ \mathrm{Js}\right)\times\left(2.24\times10^{3}\ \mathrm{ms^{-1}}\right)}{\left(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}\right)}\left(\frac{3\times6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}\times8.95\times10^{3}\ \mathrm{kg/m^3}}{4\pi\times63.6}\right)^{1/3}$$

$$= 293\ \mathrm{K}$$

واجب منزلي: احسب Θ_D لمعدن الذهب بمعلومية أن كثافته $\rho = 1.93\times10^{4}\ \mathrm{kg/m^3}$ وكتلته الذرية $M = 197\ \mathrm{amu}$ وسرعة الصوت المتوسطة به هي $\mathrm{v_s} = 2.1\times10^{3}\ \mathrm{ms^{-1}}$.

مثال 3: درجة حرارة ديباي "Θ_D" للماس هي 1800 K. وبمعلومية أن كثافة الماس هي $\rho = 1.5\times10^4$ kg/m^3 وكتلته الذرية $M = 12$ amu:

أ- احسب سرعة الصوت المتوسطة في الماس،

ب- إذا عُلم أن المسافات البينية المتوسطة للذرات هي 1.54 Å، احسب التردد النمطي التذبذبي المهيمن للشبكة.

الحل

أ- باستخدام المعادلة:

$$\Theta_D = \frac{h\nu_D}{k_B} = \frac{h\,\mathrm{v_s}}{k_B}\left(\frac{3N_A\rho}{4\pi M}\right)^{1/3}$$

$$\Rightarrow \mathrm{v_s} = \frac{k_B\Theta_D}{h}\left(\frac{4\pi M}{3N_A\rho}\right)^{1/3}$$

لذلك:

$$\mathrm{v_s} = \frac{k_B\Theta_D}{h}\left(\frac{4\pi M}{3N_A\rho}\right)^{1/3}$$

$$= \frac{\left(1.38\times10^{-23}\ \mathrm{JK^{-1}}\right)\times1800\ \mathrm{K}}{\left(6.63\times10^{-34}\ \mathrm{Js}\right)}\left(\frac{4\pi\times12}{3\times3\times6.02\times10^{23}\ \mathrm{mol^{-1}}\times1.5\times10^4\ \mathrm{kg/m^3}}\right)^{1/3}$$

$$= 1.2\times10^4\ \mathrm{m/s}$$

$$\lambda_D \approx \left(\frac{\Theta_D}{T}\right)a = \left(\frac{1800}{298}\right)1.54\times10^{-10}\ \mathrm{m} = 1.03\times10^{-9}\ \mathrm{m}$$

والتردد النمطي التذبذبي المهيمن للشبكة هو:

$$\nu_D = \frac{\mathrm{v_s}}{\lambda_D} = \left(\frac{1.2\times10^4}{1.03\times10^{-9}}\right) = 1.16\times10^{13}\ \mathrm{Hz}$$

الباب الثالث عشر

خصائص جسيمات فيرمي – ديراك المثالية

الفصل	العنوان	الصفحة
I	دالة فيرمي	210
II	غاز ذو مستويات منفصلة تماماً	213
	i حساب الطاقة الداخلية	215
	ii حساب الإنتروبي	216
	iii حساب معادلة الحالة	216
	iv حساب الضغط	216
III	غاز ذو مستويات منفصلة جزئياً	216
	i حساب الحرارة النوعية	219
	ii حساب الإنتروبي	221
	iii حساب دالة هلمهولتز	221
	iv حساب الضغط	222
IV	تطبيقات إحصاء فيرمي – ديراك	223
	i الانبعاث الالكتروني الحراري	224

الباب الثالث عشر

خصائص جسيمات فيرمي – ديراك المثالية

Ideal Fermi – Dirac Gases

I – دالة فيرمي

كما ذكرنا سابقاً بالباب العاشر أن جسيمات فيرمي– ديراك المثالية هي جسيمات غير مميزة ولها حركة مغزلية تساوي أنصاف أعداد صحيحة فردية من القيمة $\hbar$ وتخضع لقانون الاستثناء لباولي. وينص قانون الاستثناء لباولي على أنه لا يجوز لأكثر من جسيم واحد إشغال أي مستوى طاقة. وتعتبر الجسيمات مثالية إذا أهملنا طاقة التفاعل بينهما. وجسيمات الفيرميون تتبع توزيع فيرمي– ديراك الأكثر احتمالاً وهو:

$$f(\varepsilon_i)=\frac{n_i^*}{g_i}=\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon_i-\mu)}+1} \qquad (1)$$

حيث الرمز n_i^* يمثل عدد جسيمات الفيرميون التي لها الطاقة ε_i و g_i هي درجة الإنتماء وتعبر عن عدد المستويات المتناظرة التي تنتمي لنفس الطاقة ε_i.

ولدالة مستمرة فإن المعادلة (1) تأخذ الصورة:

$$f(\varepsilon)=\frac{n(\varepsilon)}{g(\varepsilon)}=\frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1}, \qquad (2)$$

$f(\varepsilon)$ تسمى "دالة فيرمي" وتعطينا احتمالية أن أي مستوى طاقة، محـدد بالقيمـة ε، سوف يُملأ بجسيم واحد من الفيرميون. مع وجود الشرط $0\le f(\varepsilon)\le 1$.

ملاحظات مهمة:

1- نظراً لوجود $+1$ في مقام المعادلتين (1) و(2) فإنه لا يوجد شروط معينة على قيم μ. لذلك فإن μ تأخذ القيم الموجبة أو السالبة.

2- إذا كانت $\varepsilon=\mu$ فإن الدالة $f(\varepsilon)$ تأخذ القيمة $\frac{1}{2}$ لأي درجة حرارة.

3- μ هي الجهد الكيميائي، وهي دالة في درجة الحرارة للنظام. وقيمتها عند درجة حرارة الصفر المطلق تعرف بالرمز $\mu(0)$، وتساوي طاقة فيرمي ε_F. $\mu(0)$ تكتب أيضاً برموز مختلفة منها μ_o أو ε_F. وطاقة فيرمي تعبر عن أعلى مستوى طاقة يتم إشغالها بواسطة جسيمات فيرمي عند درجة الصفر المطلق، بالتالي فهي لا تعتمد على درجة الحرارة للنظام.

4- عند درجة حرارة الصفر المطلق، $T=0$، نجد أن:

$$\frac{\varepsilon-\mu(0)}{k_BT}=\begin{cases}-\infty & \text{if} \quad \varepsilon<\mu(0)\\ \infty & \text{if} \quad \varepsilon>\mu(0)\end{cases}$$

ولذلك يعبر عن دالة فيرمي بالصورة الرياضية، انظر الشكل (1):

$$f(\varepsilon)=\begin{cases}1 & \text{if} \quad \varepsilon<\mu(0)\\ 0 & \text{if} \quad \varepsilon>\mu(0)\end{cases} \qquad (3)$$



شكل (1) دالة فيرمي عند درجة الصفر المطلق.

الشكل (1) يوضح المعادلة (3)، والتي تخبرنا بأنه عند درجة الصفر المطلق فإن جميع مستويات الطاقة ε، حيث $0<\varepsilon\le\mu(0)$، سوف تُملأ تماماً بجسيمات الفيرميون. وجميع المستويات ذات الطاقة $\varepsilon>\mu(0)$ سوف تصبح فارغة. وكما ينص قانون الاستثناء لباولي على أنه لا يجوز لأكثر من جسيم واحد إشغال أي مستوى طاقة، فإن الجسيمات وعددها N سوف ترص بالترتيب في أقل مستويات للطاقة وعددها N. وبالتالي فإن غاز الفيرميون سوف يصبح له طاقة حتى عند درجة الصفر المطلق.

وإذا رفعنا درجة الحرارة عن الصفر المطلق فإن جسيمات فيرمي القليلة والقريبة من مستوى طاقة فيرمي سوف تكتسب طاقة حرارية تجعلها ترتفع إلى المستويات الأعلى الفارغة والقريبة من مستوى طاقة فيرمي، كما بالشكل (2). من هذا نجد أن عدداً قليلاً من الإلكترونات سوف تتأثر بارتفاع درجة الحرارة، وهذا يجعل التغيرات الفيزيائية لا تتأثر كثيراً بارتفاع درجة الحرارة.



شكل (2) دالة فيرمي عند ثلاث درجات حرارة مختلفة.

5- إذا كانت $\mu\beta << 0$ فإن $e^{\beta(\varepsilon-\mu)} >> 1$، وتؤول دالة فيرمي إلى دالة التوزيع التقليدية لماكسويل، انظر شكل (2).

بالتالي فإن عدد جسيمات الفيرميون الكلية بالنظام يمكن حسابها كالتالي:

$$N = \begin{cases} \int_0^{\mu_o} g(\varepsilon)d\varepsilon & \text{if } T = 0 \\ \int_0^{\mu_o} g(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon & \text{if } T \neq 0 \end{cases} \qquad (4)$$

حيث كثافة المستويات $g(\varepsilon)$ يعبر عنها بالمعادلة:

$$g(\varepsilon) = g_s 2\pi V \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2} \sqrt{\varepsilon},$$
$$= G_s V \sqrt{\varepsilon}, \qquad (5)$$

حيث استخدمنا $G_s = g_s 2\pi \left(\frac{2m}{h^2}\right)^{3/2}$. وتعبر g_s عن درجة الانتماء. في حالة الإلكترونات نجد أن $s = \frac{1}{2}$ و $g_s = (2s+1) = 2$.

ومن تغيير درجات الحرارة نستطيع أن نصل إلى التصنيف التالي:

$$T = \begin{cases} 0 & \mu(0) > 0,\ \varepsilon < \mu(0) & \text{Very low temperature} & \text{Completely degenerate} \\ T << T_F & \mu(0) > 0 & \text{Low temperature} & \text{Strongly degenerate} \\ T \approx T_F & \mu(0) = 0 & \text{Intermediate temperature} & \text{Slightly degenerate} \\ T \cdots T_F & \mu(0) < 0 & \text{High temperature} & \text{Classical limit} \end{cases}$$

بالنسبة للحالة الأخيرة، وهي عندما $T >> T_F$، فإن توزيع فيرمي سوف يؤول إلى توزيع ماكسويل- بولتزمان التقليدي، ولا داعي هنا لعرضه مرة أخرى. ولهذا سوف نستعرض هنا خواص جسيمات الفيرميون في الحالات الأخرى المهمة وهي:

II – غاز ذو مستويات منفصلة تماماً $T = 0$

(Completely degenerate gas)

عند درجة حرارة الصفر المطلق $(T = 0)$ نجد أن جميع المستويات تصبح منفصلة تماماً. وفي هذه الحالة فإن العدد الكلي لجسيمات الفيرميون يحسب باستخدامنا للمعادلتين (3) و(4) كالتالي:

$$N = \int_0^{\mu_o} g(\varepsilon)f(\varepsilon)d\varepsilon$$
$$= G_s V \int_0^{\mu_o} \sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon = \frac{2\pi}{3} G_s V\, \mu_o^{3/2}$$
$$\Rightarrow \boxed{N = \frac{2\pi}{3} G_s V\, \mu_o^{3/2}} \qquad (6)$$

ومنها نجد أن طاقة فيرمي هي:

$$\boxed{\mu_o \equiv \varepsilon_F \equiv \mu(0) = \frac{h^2}{2m}\left(\frac{3}{4\pi g_s}\frac{N}{V}\right)^{2/3}} \qquad (7)$$

من المعادلة (7) يتضح أن طاقة فيرمي لا تعتمد على حجم العينة فقط أو شكلها ولكن يعتمد على الكثافة الحجمية ($\frac{N}{V}$) للجسيمات والتي تدل على مدى تزاحم الجسيمات بجوار بعضها البعض داخل المادة. ومن الملائم أيضاً أن نُعرف درجة حرارة فيرمي "T_F" بالعلاقة $T_F = \frac{\varepsilon_F}{k_B}$. وهي درجة الحرارة التي تفصل بين السلوك التقليدي للكميات الفيزيائية لجسيمات الفيرميون عندما $T >> T_F$ والسلوك الكمي عندما $T << T_F$. ويمكن التعبير عنها كالتالي:

$$\boxed{T_F = \frac{\mu_o}{k_B} = \frac{h^2}{2mk_B}\left(\frac{3}{4\pi g_s}\frac{N}{V}\right)^{2/3}} \qquad (8)$$

مثال: احسب μ_o و T_F وسرعة الإلكترونات v_F لعنصر البوتاسيوم إذا علمت أن كثافته هي $\rho = 0.86\times10^3\ \text{kg/m}^3$ ووزنه الذري هو $M = 39\ \text{kg/kmole}$. ملحوظة: اعتبر أنه يوجد إلكترون حر لكل ذرة أحادية التكافؤ (كذرة البوتاسيوم) .

الحل: باعتبار أنه يوجد إلكترون حر لكل ذرة أحادية التكافؤ، فإن الكثافة تحسب من العلاقة:

$$\frac{N}{V} = \frac{N_a\rho}{M} = \frac{(6.02\times10^{26}\ \text{electrons/kmole})(0.86\times10^3\ \text{kg/m}^3)}{39\ \text{kg/kmole}}$$
$$= 1.33\times10^{28}\ \text{electrons/m}^3,$$

ومن المعادلة (5) نجد أن طاقة فيرمي للإلكترونات ($g_s = 2$) هي:

$$\mu_o = \frac{h^2}{8m}\left(\frac{3}{\pi}\frac{N}{V}\right)^{2/3}$$
$$= \frac{(6.62\times10^{-34}\ \text{J.s})^2}{8(9.11\times10^{-31}\ \text{kg})}\left(\frac{3}{\pi}\times1.33\times10^{28}\ \frac{\text{electronss}}{\text{m}^3}\right)^{2/3}$$
$$= 3.28\times10^{-19}\ \text{J} = 2.05\ \text{eV}$$

ولذلك فإن درجة حرارة فيرمي هي:

$$T_F = \frac{\mu_o}{k_B} = \frac{2.05\ \text{eV}}{8.617\times10^{-5}\ \frac{\text{eV}}{\text{K}}} = 2.3\times10^4\ \text{K}$$

ودرجة الحرارة المرتفعة هذه تَعني أننا يجب أن نتعامل مع معدن البوتاسيوم بقوانين ميكانيكا الكم حتى عند درجة حرارة الغرفة.

ولحساب سرعة الإلكترونات، نستخدم العلاقة:

$$\mu_o = \frac{p_f^2}{2m} \Rightarrow p_F^2 = 2m\mu_o \Rightarrow (mv_F)^2 = 2m\mu_o$$

فنجد أن:

$$v_F^2 = \frac{2\mu_o}{m} = \frac{2\mu_o c^2}{mc^2} = \frac{2(2.05\ \text{eV})\times(3.0\times10^8\ \text{m/s})^2}{(0.511\times10^6\ \text{eV})}$$
$$= 7.22\times10^{11}\ \text{m}^2/\text{s}^2$$
$$\Rightarrow v_F = 8.5\times10^5\ \text{m/s}$$

من هنا نلاحظ أن سرعة الإلكترونات عند درجة الصفر المطلق تصل إلى أكثر من عشرة أضعاف سرعة الصوت في المعادن.

وسوف نستعرض بالتالي أهم الخواص الفيزيائية للمستويات المنفصلة تماماً وهي:

i – حساب الطاقة الداخلية

تحسب الطاقة الداخلية كالتالي:

$$U_o = \int_0^{\mu_o} \varepsilon g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon$$
$$= G_s V \int_0^{\mu_o} \varepsilon^{3/2}\, d\varepsilon = \frac{2}{5}\underbrace{G_s V\, \mu_o^{3/2}}_{=\frac{3}{2}N \text{ from eq.(4)}}\mu_o$$
$$= \frac{3}{5}N\mu_o$$
$$\Rightarrow \boxed{U_o = \frac{3}{5}N\mu_o} \qquad (9)$$

ii – حساب الإنتروبي

$$S_o = 0, \tag{10}$$

iii – حساب معادلة الحالة

$$\Omega_o = -PV = U_o - S_o - \mu_o N = -\frac{2}{5}\mu_o N, \tag{11}$$

iv – حساب الضغط

$$P = -\frac{\Omega_o}{V} = \frac{2}{5}\mu_o\left(\frac{N}{V}\right)$$
$$= 2.71\times10^7\,\rho \text{ (atm for electrons)} \tag{12}$$

من هنا نجد أن جسيمات الفيرميون تمارس ضغطاً كبيراً بداخل المعدن، $\left(\approx 10^6 \text{ atm}\right)$، حتى عند درجة الصفر المطلق. بمعرفة هذا الضغط الهائل، يجب هنا أن نُدرك ونُقدر دور جهد السطح الذي يَحولِ دون هروب (تبخر) الإلكترونات من المعدن. وبمعنى آخر فإن قوة كولوم الجاذبة بين الأيونات سوف تعادل ضغط الجسيمات. مع ملاحظة أنه عند درجة حرارة الصفر المطلق تكون قيمة μ_o موجبة وكبيرة.

III – غاز ذو مستويات منفصلة جزئياً $(T << T_F)$

(Strongly degenerate gas)

في هذه الحالة نجد أن بعض المستويات ليست منفصلة تماماً، ولذلك فإن العدد الكلي لجسيمات الفيرميون يحسب باستخدامنا للمعادلتين (2) و(5) كالتالي:

$$N = \int_0^\infty g(\varepsilon) f(\varepsilon) d\varepsilon = G_s V \int_0^\infty \frac{\sqrt{\varepsilon}\, d\varepsilon}{e^{(\varepsilon-\mu(T))/k_B T}+1}$$
$$= G_s V \left(k_B T\right)^{3/2} \int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\, dx}{e^{(x-x_o)}+1} \tag{13}$$

حيث استخدمنا التعويضات $x = \varepsilon/k_B T$ و $x_o = \varepsilon/k_B T$. وهدفنا الآن هو الحصول على علاقة لحساب $\mu(T)$ كدالة في درجة الحرارة المطلقة. ويمكن حساب $\mu(T)$ بطريقتين: الأولى بإجراء التكامل عددياً، والثانية هي باستخدام تكامل سمرفيلد (انظر الملحق (A)) حيث:

$$\int_0^\infty \frac{\sqrt{x}\, dx}{e^{(x-x_o)}+1} = \frac{2}{3}x_0^{3/2}\left[1+\frac{\pi^2}{8x_0^2}+\cdots\right] = \frac{2}{3}\left(\frac{\mu}{k_B T}\right)^{3/2}\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu}\right)^2+\cdots\right]$$

فنجد أن العدد الكلي لجسيمات فيرمي يأخذ الشكل:

$$N = \frac{2}{3}G_s V\,\mu^{3/2}\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu}\right)^2+\cdots\right] \tag{14}$$

وباستخدام المعادلة (4) نجد أن:

$$N = \frac{2}{3}G_s V\,\mu_o^{3/2} \tag{15}$$

وبالتعويض من (15) في (14) نجد أن:

$$\mu_o^{3/2} = \mu^{3/2}(T)\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu}\right)^2+\cdots\right] \tag{16}$$

وكتقريب أولي، وعند درجات الحرارة المنخفضة، نضع $\mu = \mu_o$ بالقوس المربع فنجد أن:

$$\mu_o^{3/2} = \mu^{3/2}(T)\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu_o}\right)^2+\cdots\right]$$

وباستخدام التعويض $\mu_o = k_B T_F$ نحصل على:

$$\mu_o^{3/2} = \mu^{3/2}(T)\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2+\cdots\right]$$

والآن نستطيع حساب $\mu(T)$ بدلالة μ_o كالتالي:

$$\because \mu^{3/2}(T) = \mu_o^{3/2}\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{k_B T}{\mu_o}\right)^2 + \cdots\right]^1$$

$$\therefore \quad \mu(T) = \mu_o\left[1+\frac{\pi^2}{8}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \cdots\right]^{2/3}$$

$$\approx \mu_o\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \cdots\right] \qquad (17)$$

وقد استخدامنا مفكوك ذات الحدين بالخطوة الأخيرة.

مثال: احسب $\mu(T)$ لمعدن البوتاسيوم عند درجة حرارة 3.0×10^3 K.

الحل: وجدنا لمعدن البوتاسيوم أن $T_F = 2.3\times10^4$ K و $\mu_o = 2.05$ eV ، لذلك:

$$\mu(T) = \mu_o\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \cdots\right]$$

$$= 2.05\left[1-\frac{\pi^2}{12}\left(\frac{3.0\times10^3}{2.3\times10^4}\right)^2 + \cdots\right]$$

$$= 2.05\times0.986 \approx 2.02 \text{ eV}$$

ومن هذا المثال نلاحظ أن التغير بقيمة $\mu(T)$ هو تغير طفيف نظراً لارتفاع درجة حرارة فيرمي T_F. ولذلك بالإمكان اعتبار $\mu(T) = \mu_o$ حتى في درجات الحرارة الاعتيادية.

واجب منزلي: باستخدام تكامل سمرفيلد (انظر الملحق (A)) اثبت أن الطاقة الداخلية تعطى:

$$U \approx \underbrace{\frac{3}{5}N\mu_o}_{U_o}\left[1+\frac{5\pi^2}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \frac{\pi^4}{16}\left(\frac{T}{T_F}\right)^4 - \cdots\right] \qquad (18)$$

وكما هو متوقع، فإن المعادلة (18) تدل على أن الطاقة الداخلية للنظام تزداد بزيادة درجة الحرارة، وذلك ناتج من انتقال جسيمات الفيرميون إلى المستويات ذات الطاقات الأعلى.

i – حساب الحرارة النوعية

تحسب الحرارة النوعية الإلكترونية كالتالي:

$$C_{V,e} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V = \frac{5\pi^2}{12}U_o\left(\frac{T}{T_F^2}\right)+\cdots$$

$$\approx \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{Nk_B}{T_F}\right)T \qquad (19)$$

المعادلة (19) توضح أنه عندما $T << T_F$ فإن الحرارة النوعية لجسيمات فيرمي تتغير خطياً مع تغير درجة الحرارة. ولهذا فإن الحرارة النوعية الكلية للمعدن يمكن وضعها على الصورة:

$$(C_V)_{total} = C_{V,e} + C_V \text{ (Debye)}$$

$$= AT + BT^3 \qquad (20)$$

حيث الحد الأول الخطي يعبر عن الحرارة النوعية نتيجة للإلكترونات الحرة، والحد الثاني نتيجة نظرية ديباي لشبكية الجوامد، انظر الشكل (3) .



شكل (3) الحرارة النوعية للمعدن كدالة في درجة الحرارة.

ومن المعادلة (20) نجد أن الحد الأول هو السائد عند درجات الحرارة المنخفضة جداً، ويهمل مع ارتفاع درجات الحرارة. ولقد كان الاعتقاد السائد سابقاً، وكان لغزاً حير العلماء، أن الحرارة النوعية للمعادن عند درجات الحرارة المرتفعة تساوي القيمة

($3Nk_B$)، كما للجسم الصلب، مضافاً إليها الحرارة النوعية للإلكترونات الحرة وهي($\frac{3}{2}Nk_B$) والمرتبطة بدرجات الحرية الانتقالية الثلاث. ولكن المثال التالي يوضح لنا أن مشاركة الإلكترونات الحرة للحرارة النوعية الكلية هي كمية مهملة عند درجات الحرارة المرتفعة.

مثال: احسب الحرارة النوعية الإلكترونية للبوتاسيوم عند درجة حرارة الغرفة $T = 3.0\times10^{2}\ \mathrm{K}$، مع العلم أن $T_F = 2.3\times10^{4}\ \mathrm{K}$ للبوتاسيوم.

الحل: الحرارة النوعية الإلكترونية للبوتاسيوم تحسب من القانون:

$$C_{V,e} = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{Nk_B}{T_F}\right)T = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{T}{T_F}\right)Nk_B$$
$$= 4.93\times\left(\frac{3.0\times10^{2}\ \mathrm{K}}{2.3\times10^{4}\ \mathrm{K}}\right)Nk_B$$
$$= 6.44\times10^{-2}\ Nk_B$$

وهذه القيمة الصغيرة، مقارنةً بالقيمة $3Nk_B$ عند درجة حرارة الغرفة، قد أوجدت تفسيراً للغز الذي حير العلماء فترة طويلة من الزمن.



شكل (4) العلاقة بين $\frac{(C_V)_{total}}{T}$ و T^2 لحساب الثوابت A, B.

ولحساب الثوابت A, B عملياً، فإنه بقياس الحرارة النوعية الكلية $(C_V)_{total}$ عند درجات الحرارة المختلفة، ثم رسم العلاقة بين $\frac{(C_V)_{total}}{T}$ و T^2، كما في الشكل (4) نحصل على علاقة خطية. ومن تقاطع الخط المستقيم مع المحور الرأسي نوجد الثابت A وميل الخط المستقيم يعطي الثابت B. ومن العلاقة $A = \frac{\pi^2}{2}\left(\frac{Nk_B}{T_F}\right)$ نستطيع إيجاد درجة حرارة فيرمي T_F، ومنها نوجد طاقة فيرمي باستخدام $\varepsilon_f = k_B T_F$.

ii – حساب الإنتروبي

يحسب الإنتروبي كالتالي:

$$S = \int_0^T \frac{C_{V,e}}{T}\,dT$$
$$= \frac{\pi^2}{2}Nk_B\left[\left(\frac{T}{T_F}\right) - \frac{\pi^2}{10}\left(\frac{T}{T_F}\right)^3 + \cdots\right] \qquad (21)$$

ومنها نجد أن $S = 0$ عند $T = 0$، كما يجب أن تكون، وهي مطابقة للقانون الثالث للديناميكا الحرارية.

iii – حساب دالة هلمهولتز

تحسب دالة هلمهولتز كالتالي:

$$F = U - TS$$
$$= Nk_B T_F\left[\frac{3}{5} - \frac{\pi^4}{4}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \frac{\pi^4}{80}\left(\frac{T}{T_F}\right)^4 + \cdots\right] \qquad (22)$$

iv – حساب الضغط

يحسب الضغط كالتالي:

$$P = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_{T,N}$$
$$= \frac{2}{5}\frac{Nk_BT_F}{V}\left[1+\frac{5\pi^4}{12}\left(\frac{T}{T_F}\right)^2 + \frac{\pi^4}{80}\left(\frac{T}{T_F}\right)^4 + \cdots\right]$$
$$= \frac{2}{3}\frac{U}{V} \qquad (23)$$

والشكل (5) يوضح الفرق بين الحرارة النوعية لكل من التوزيعات الإحصائية الثلاثة.



شكل (5) مقارنة للحرارة النوعية تحت حجم ثابت $(\frac{C_V}{Nk_B})$ للتوزيعات الإحصائية الثلاثة: ماكسويل – بولتزمان (MB) بوز– أينشتين (BE)، فيرمي – ديراك (FD).

IV– تطبيقات إحصاء فيرمي – ديراك

لقد تم إثبات صحة إحصاء فيرمي – ديراك عن طريق تطبيقه على مسائل متعددة في الفيزياء، ومنها المواد الموصلة وشبه الموصلة وفائقة التوصيل. على سبيل المثال الفيزيائي إلكترونات التوصيل بالمعادن. تاريخياً فإن النظرية الإلكترونية للمعادن والتي تم تطويرها بواسطة العالمان درود ولورينتز حيث اعتبرا أن الإلكترونات كغاز داخل المعادن تخضع لقوانين الإحصاء التقليدي (ماكسويل– بولتزمان). ولقد نجح هذا النموذج النظري في تفسير بعض الظواهر مثل الخواص الكهربائية والحرارية للمعادن. ولكنه فشل في التفسير الكمي لبعض الخواص الفيزيائية، كما ذُكر سابقاً، مثل الحرارة النوعية للمعادن. حيث وجد أن الحرارة النوعية للمعادن عند درجة حرارة الغرفة هي $(3R)$ وليست $(\frac{9}{2}R)$. وقد تم حَل هذا اللغز بواسطة العالم سمرفيلد الذي افترض أن إلكترونات المعادن تخضع لقوانين إحصاء فيرمي – ديراك. وهناك أيضاً بعض الظواهر الخلابة والتي تُظهر خواص إلكترونات التوصيل بالمعادن مثل ظاهرتي الانبعاث الالكتروني الحراري والانبعاث الكهربائي الضوئي (Photoelectric emission). وذلك ناتج من أنه عند درجة حرارة الغرفة لا يوجد انبعاث تلقائي للإلكترونات، لذلك نستطيع القول أن الإلكترونات داخل المعدن تصبح حبيسة لجهد التجاذب مع الأيونات. وتصبح الإلكترونات حبيسة حائل جهد بئري ارتفاعه ε، انظر الشكل (6). ولا يستطيع أي من الإلكترونات الهرب من الحائل إلا إذا كانت طاقتها الكلية أكبر من ε. وبالرغم من أن ظاهرتي الانبعاث الالكتروني الحراري والانبعاث الكهربائي الضوئي يعتبران ظواهر غير متزنة حرارياً، فإننا نستطيع حساب كثافة التيار الإلكتروني بفرض أن إلكترونات المادة في حالة اتزان شبه ساكن.



شكل (6) دالة الشغل ϕ لمعدن تمثل ارتفاع السطح عن طاقة فيرمي.

i- الانبعاث الالكتروني الحراري (Thermoionic Emission)

يتم تعريف الانبعاث الالكتروني الحراري على أنه: "عملية تحرر إلكترونات المادة (معادن وفلزات وأشباه الموصلات) من سطوحها نتيجة لاكتسابها طاقة حرارية". ولتتحرر الإلكترونات من الأسطح يجب إعطائها طاقه "ε" أكبر من $\varepsilon_f + \phi$. ويعتبر هذا الشرط ضرورياً ولكنه غير كاف، حيث يمكننا إعطاء طاقة كافية للجسيم ولكنه يتحرك باتجاه مضاد لاتجاه خروجه من السطح. ولحساب كثافة تيار الإلكترونات المحررة من المعدن فإننا نستطيع تطبيق إحصاء فيرمي. ولاستخدامه نلاحظ أولاً: أنه وبالرغم من الضغط الكبير الواقع على سطح المعدن نتيجة حركة الإلكترونات، كما رأينا سابقاً، إلا أنها تصبح حبيسة ولا تستطيع الهرب من سطح المعدن نتيجة التجاذب الكولومي بين الإلكترونات والأيونات داخل المعدن. وبارتفاع درجة الحرارة عن الصفر المطلق، نجد أن بعض الإلكترونات القريبة من طاقة فيرمي تكتسب هذه الطاقة الحرارية وتصعد لمستويات أعلى من مستوى طاقة فيرمي. وهذا يعني أن أقل طاقة لازمة لتحرير إي إلكترون من المعدن عند درجة الحرارة، وتُعطى بالعلاقة:

$$\phi = \varepsilon - \mu(T) + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m}, \qquad (1)$$

حيث ϕ هي دالة الشغل (Work function) للمعدن وتُعرف بأنها أقل طاقة يكتسبها الإلكترون للتحرر من سطح المعدن، وبالطبع فهي تعتمد على طبيعة المعدن. والدالة ϕ أيضاً تعبر عن ارتفاع سطح المعدن بالنسبة إلى مستوى طاقة فيرمي. و ε هي الطاقة المطلوبة لتحرير إلكترون المستوى الأرضي للمعدن (وتسمى طاقة الترابط "Binding energy").

ولحساب كثافة تيار الإلكترونات المحررة، يجب أن نعرف عددهم. ولذلك دعونا نأخذ اتجاه الانبعاث هو الاتجاه الموجب للمحور السيني، $x-axis$، العمودي على سطح المعدن. وسوف نفترض التالي:

1- سطح الانبعاث سنأخذه مستوياً.

2- الإلكترونات التي تنجح في الهروب من سطح المعدن، $x = 0$، نتيجة التسخين هي تلك التي لها كمية حركة خطية بحيث: $\frac{p_x^2}{2m} > \varepsilon$

عدد الإلكترونات التي تتحرر من سطح المعدن لوحدة الحجوم، وباتجاه المحور السيني، هي:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{1}{V}\int g(p) f(p) dp \qquad (2)$$

حيث $f(p)$ هي دالة فيرمي و

$$g(p)dp = \frac{2V}{h^3}dp \qquad (3)$$

لذلك:

$$n = \frac{N}{V} = \frac{2}{h^3}\int \frac{1}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} dp \qquad (4)$$

وبمعلومية أن حجم العينة:

$$V = Al_x = A\mathrm{v}_x t \qquad (5)$$

حيث A هي مساحة سطح المعدن و l_x هي ارتفاعه، v_x هي سرعة الإلكترون في اتجاه المحور السيني، و t هو الزمن اللازم للإلكترون للتحرك مسافة l_x، نجد أن عدد الإلكترونات التي تتحرر من سطح المعدن، باتجاه المحور السيني، لوحدة السطوح والزمن تعطى بالعلاقة:

$$n' = n\,\mathrm{v}_x = \frac{2}{h^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{\sqrt{2m\varepsilon}}^{\infty} \frac{\mathrm{v}_x}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} dp_x dp_y dp_z, \qquad (6)$$

ومن التعويض $\varepsilon = \frac{p^2}{2m}$ نجد أن:

$$d\varepsilon = \frac{\partial \varepsilon}{\partial p_x} dp_x = \mathrm{v}_x dp_x \qquad (7)$$

ولذلك فإن:

$$n' = \frac{2}{h^3}\int \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} dp_y dp_z ,$$

$$= \frac{2}{h^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{\varepsilon'}^{\infty} \frac{d\varepsilon}{e^{\beta(\varepsilon-\mu)}+1} dp_y dp_z$$

$$= \frac{2}{\beta h^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} \ln\left[1+e^{\beta(\varepsilon'-\varepsilon_f)}\right] dp_y dp_z \qquad (8)$$

ومن المعادلة:

$$\varepsilon' - \varepsilon_f = \phi + \frac{p_y^2 + p_z^2}{2m}, \qquad (9)$$

وباستخدام مفكوك اللوغاريتم $\ln[1-x] \approx x$ **في الحالة** $x << 1$ **نجد أن:**

$$n' = \frac{2}{\beta h^3}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\phi-\beta\left(\frac{p_y^2+p_z^2}{2m}\right)} dp_y dp_z$$

$$= \frac{2}{\beta h^3} e^{-\beta\phi} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\left(\frac{p_y^2}{2m}\right)} dp_y}_{2\times\frac{1}{2}\times\sqrt{2\pi m/\beta}} \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\beta\left(\frac{p_z^2}{2m}\right)} dp_z}_{2\times\frac{1}{2}\times\sqrt{2\pi m/\beta}}$$

$$= \frac{4\pi m}{\beta^2 h^3} e^{-\beta\phi} \qquad (10)$$

وتعرف الكثافة التياريه المنبعثة J_x **باتجاه المحور** x **بالعلاقة:**

$$J_x = en' = \frac{4\pi me}{h^3}\left(k_B T\right)^2 e^{-\beta\phi}$$

$$= aT^2 e^{-\phi/k_B T}, \qquad (11)$$

حيث:

$$a = \frac{4\pi m e k_B^2}{h^3} = 1.2\times10^6 \ \ \mathrm{A\,m^{-2}K^{-2}}$$

وتّعرف المعادلة (11) بصيغة رتشاردسون- دخمان Richardson – Dushman formula .

ولم نأخذ في هذا الاشتقاق احتمال انعكاس الإلكترونات من سطح المعدن.



شكل (7) العلاقة بين $\ln[\frac{J_x}{T^2}]$ و $\frac{1}{T}$ لصيغة رتشاردسون- دخمان

ولحساب دالة الشغل ϕ **عملياً، فإنه بقياس** J_x **عند درجات الحرارة المختلفة، ثم رسم العلاقة بين** $\ln[\frac{J_x}{T^2}]$ **و** $\frac{1}{T}$**، كما في الشكل (7) نحصل على علاقة خطية. وميل الخط المستقيم يعبر عن قيمة الثابت** $-\frac{\phi}{k_B}$ **.**

الملاحق

Appendices

الملحق	العنوان	الصفحة
A	بعض الدوال والصيغ الرياضية	230
	i صيغة استيرلنج	230
	ii مجموع المتوالية الهندسية	231
	iii دالة جاما	231
	iv دالة الخطأ	232
	v دالة زيتا	233
	vi تكامل سمرفيلد	233
	vii دالة دلتا لديراك	234
	viii جدول للتفاضلات البسيطة	235
	ix متطابقات رياضية عامة	236
	x تكاملات مهمة	237
B	التباديل والتوافيق والاحتمالات	239
	i التباديل	239
	ii التوافيق	243
	iii الاحتمالات	244
	iv توزيع ذي الحدين	245
C	معاملات لاجرانج الغير معينة	246
D	الدوال الزائدية	248

ملحق (A)

بعض الدوال والصيغ الرياضية

Some Mathematical Functions and Formulae

i- صيغة استيرلنج (Stirling's Formula)

نظراً لتعاملنا مع الأجسام غير المميزة في الفيزياء الإحصائية نجد أننا نتعامل مع قيم بالصيغة $\ln(n!)$، حيث n عدد صحيح موجب. ونحن نُعرف رياضياً الصيغة $n!$ بالشكل:

$$n! = 1\times 2\times 3\times\cdots\times n \qquad (1)$$

ومن المعادلة (1) واستخدام التعريف التالي:

$$(n+1)! = n!(n+1) \qquad (2)$$

نجد أن

$$1! = 0! = 1 \qquad (3)$$

ومن المعادلة (1) نجد أن:

$$\ln(n!) = \sum_{k=1}^{n} \ln k \qquad (4)$$

و لقيم كبيرة للعدد n نستطيع، كنوع من التقريب، أن نغير التجميع إلي تكامل ونحصل على:

$$\ln(n!) \simeq \int_{1}^{n} \ln x\,dx = \left[x\ln x - x\right]_{1}^{n}$$

$$\approx n\ln n - n \qquad (5)$$

المعادلة (5) هي صيغة استيرلنج، وهي تعتبر تقريب ممتاز لقيم n الكبيرة، مثلاً $n > 30$. وحيث أننا نتعامل مع أعداد كبيرة مثل عدد أفوجادرو، فإن هذا التقريب يصبح متحقق.

وبالإمكان أيضاً كتابة المعادلة (5) بالصورة:

$$n! \approx n^n e^{-n} \qquad (6)$$

وهناك صيغ أخرى كثيرة، ولكن هذا ما نحتاجه لهذا المنهج.

ii- مجموع المتوالية الهندسية (Sum of a Geometric Series)

في الفيزياء الإحصائية كثيراً ما يظهر لنا جمع المتوالية الهندسية:

$$S_n = c + cf + cf^2 + \cdots + cf^n \qquad (1)$$

بضرب طرفي المعادلة (1) في f ، نحصل على:

$$fS_n = cf + cf^2 + \cdots + cf^n + cf^{n+1} \qquad (2)$$

وبطرح المعادلتين (1) و (2)، ينتج:

$$S_n = c\left(\frac{1-f^{n+1}}{1-f}\right) \qquad (3)$$

فإذا كان $|f| < 1$ والمتوالية غير منتهية، بمعني أن $n \to \infty$ ، فإن المتولية سوف تكون تقاربية ومجموعها يؤول إلي:

$$S = \frac{c}{1-f} \qquad (4)$$

iii- دالة جاما (Gamma Function Γ(n))

إذا بدأنا بالتكامل المعرف:

$$\int_0^\infty e^{-qx}dx = q^{-1} \qquad (1)$$

وبتفاضل الطرفان بالنسبة للقيمة الثابتة q لعدد n من المرات، فسوف نجد أن:

$$\int_0^\infty x^n e^{-qx}dx = (n!)q^{-(n+1)} \qquad (2)$$

وبوضع الثابت $q = 1$، نجد أننا سوف نحصل علي تعريفاً للقيمة $n!$ بواسطة التكامل التالي:

$$n! = \int_0^\infty x^n e^{-x}dx \qquad (3)$$

ومنه سوف نعرف دالة جاما بالعلاقة:

$$\Gamma(n+1) \equiv \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dq \qquad (4)$$

ومن (4) نحصل على:

$$\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$$

$$\Gamma(1) = \Gamma(2) = 1;$$

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi},$$

$$\Gamma(\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

iv – دالة الخطأ (Error Function)

استخدمت دالة الخطأ بالباب السابع عند دراستنا لتوزيع ماكسويل الكلاسيكي وعرفت بالعلاقة:

$$\mathrm{erf}(q) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^{q} e^{-q^2} dq \qquad (1)$$

وبالجدول التالي بعض القيم لدالة الخطأ:

q	$\mathrm{erf}(q)$	q	$\mathrm{erf}(q)$
0	0	1.2	0.9103
0.4	0.4284	1.6	0.9763
0.8	0.7421	2.0	0.9953
1.0	0.8427	2.2	0.9981

v – دالة زيتا (Zeta Function)

تعرف دالة زيتا بالعلاقة:

$$\zeta(q) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-q} \qquad (1)$$

وبالجدول التالي بعض القيم لدالة زيتا:

q	$\zeta(q)$	q	$\zeta(q)$
1	∞	3/2	2.612
2	$\pi^2/6 = 1.645$	5/2	1.341
3	1.202	7/2	1.127
4	$\pi^4/90 = 1.082$	9/2	1.055

vi – تكامل سمرفيلد (Sommerfield's Integral)

هو تكامل يأخذ بالشكل:

$$\int_0^{\infty} f(x - x_o) x^s dx = \frac{x_o^{s+1}}{s+1}\left[1 + \frac{\pi^2}{6}\frac{s(s+1)}{x_o^2} + \cdots\right],$$

وبأخذ الدالة $f(x - x_o) = \frac{1}{e^{(x-x_o)} + 1}$ و $s = \frac{1}{2}$ ، نحصل علي التكامل:

$$\int_0^{\infty} \frac{x^{1/2}}{e^{(x-x_o)} + 1} dx = \frac{2}{3} x_o^{3/2}\left[1 + \frac{\pi^2}{6x_o^2} + \cdots\right]$$

vii – دالة دلتا لديراك (Dirac Delta Function)



هذه ليست دالة بالمعنى المتعارف عليه رياضياً، ولهذا فهي تسمى توزيعاً وأيضاً دالة نبضية (Impulse function). وهي تستخدم للدوال المتصلة وتعرف كالتالي:

$$\delta(x-a)=\begin{cases}0, & x\neq a\\ \\ \infty, & x=a\end{cases}, \qquad (1)$$

لها الخواص التالية (في بعد واحد):

$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(x-a)dx=1 \qquad (2)$$

ومن المعادلة (2) نستطيع حساب التكامل:

$$\int_{-\infty}^{\infty}f(x)\delta(x-a)dx=f(a) \qquad (3)$$

وتأخذ الدالة دلتا صوراً وأشكالاً أخرى ولكن المعادلات 1،2،3 تكفي لدراستنا.

viii – جدول للتفاضلات البسيطة (Table of Simple Derivatives)

في الجدول التالي الحروف u و v تستخدم كدوال في المتغير x. الحروف $a,b,\cdots$ و $m,n,\cdots$ تستخدم كثوابت و $i=\sqrt{-1}$.

$\frac{da}{dx}=0$	$\frac{d}{dx}\cos(u)=-\sin(u)\frac{du}{dx}$
$\frac{dx}{dx}=1$	$\frac{d}{dx}\cos(ax)=-a\sin(ax)$
$\frac{d}{dx}(au)=a\frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}\ln(u)=\frac{1}{u}\frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}(uv)=u\frac{dv}{dx}+v\frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}e^{u}=e^{u}\frac{du}{dx}$
$\frac{d}{dx}ax^{n}=nax^{n-1}$	$\frac{d}{dx}e^{ax}=ae^{ax}$
$\frac{d}{dx}\sin(u)=\cos(u)\frac{du}{dx}$	$\frac{d}{dx}e^{ax^{2}}=2axe^{ax^{2}}$
$\frac{d}{dx}\sin(ax)=a\cos(ax)$	

ix – متطابقات رياضية عامة (General Mathematical Identities)

$\sin\theta \pm \sin\varphi = 2\left[\sin(\frac{\theta\pm\varphi}{2})\cos(\frac{\theta\mp\varphi}{2})\right]$	$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 1 - 2\sin^2\theta$
$\sin\theta + \cos\varphi = 2\left[\cos(\frac{\theta+\varphi}{2})\cos(\frac{\theta-\varphi}{2})\right]$	$= 2\cos^2\theta - 1$
$\cos\theta - \cos\varphi = -2\left[\sin(\frac{\theta+\varphi}{2})\sin(\frac{\theta-\varphi}{2})\right]$	$e^{\pm i\theta} = \cos\theta \pm i\sin\theta, \quad i = \sqrt{-1}$
$\sin\theta\sin\varphi = \frac{1}{2}[\cos(\theta-\varphi) - \cos(\theta+\varphi)]$	$\sin\theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}, \quad \cos\theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2}$
$\cos\theta\cos\varphi = \frac{1}{2}[\cos(\theta-\varphi) + \cos(\theta+\varphi)]$	$e^{\lvert a\rvert} = \sum_n \frac{\lvert a\rvert^n}{n!}$
$\sin\theta\cos\varphi = \frac{1}{2}[\sin(\theta-\varphi) + \sin(\theta+\varphi)]$	$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \cdots, \quad \lvert x\rvert <$
$\sin(\theta\pm\varphi) = \sin\theta\cos\varphi \pm \cos\theta\sin\varphi$	$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots, \quad \lvert x\rvert < 1$
$\cos(\theta\pm\varphi) = \cos\theta\cos\varphi \mp \sin\theta\sin\varphi$	$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \cdots, \quad \lvert x\rvert < 1$
$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$	
$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$	

x – تكاملات مهمة (Important Integrals)

في الجداول التالية يجب إضافة ثابت التكامل لجميع التكاملات الغير محددة.

$\int dx = x$	$\int \frac{1}{x}dx = \int x^{-1}dx = \ln(x)$
$\int a dx = ax$	$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}, \qquad n \neq -1$
$\int a.f(x)dx = a\int f(x)dx$	$\int e^x dx = e^x$
$\int (u+v)dx = \int udx + \int vdx$	$\int e^{ax}dx = \frac{1}{a}e^{ax}$
$\int udv = u\int dv - \int vdu = uv - \int vdu$	$\int b^{ax}dx = \frac{1}{a\ln(b)}b^{ax}; \qquad b > 0$
$\int \cos(a\theta)d\theta = \frac{1}{a}\sin\theta$	$\int \ln(x)dx = x\ln(x) - x$
$\int \sin(a\theta)d\theta = -\frac{1}{a}\cos\theta$	$\int a^x \ln(a)dx = a^x; \qquad a > 0$

$$\int_0^\infty x^n e^{-ax}dx = \frac{n!}{a^{n+1}}, \qquad a > 0$$

$$\int_0^\infty x^{2n+1}e^{-ax^2}dx = \frac{n!}{2a^{n+1}}, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} x^{2n+1}e^{-ax^2}dx = 0,$$

$$\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}dx = \frac{1.3.5....(2n-1)}{2^{n+1}a^n}\sqrt{\frac{\pi}{a}}, \qquad n = 0,1,2,3,\cdots, \quad a > 0$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{s-1}}{e^x - 1}dx = \Gamma(s)\zeta(s), \qquad s > 0.$$

$$\int_0^\infty \frac{x^{1/2}}{e^x-1}dx = 1.306\sqrt{\pi},\quad \int_0^\infty \frac{x^{3/2}}{e^x-1}dx = 1.78,\quad \int_0^\infty \frac{x^3}{e^x-1}dx = \frac{\pi^4}{15},$$

$$\int_0^\infty \frac{e^x}{\left(e^x-1\right)^2}dx = \frac{1}{2},\quad \int_0^\infty \frac{x^2e^x}{\left(e^x-1\right)^2}dx = \frac{\pi^2}{6},\quad \int_0^\infty \frac{x^4e^x}{\left(e^x-1\right)^2}dx = \frac{4\pi^4}{15}$$

$$\int_0^\infty x^2\ln(1-e^{-x})\,dx = -\frac{\pi^2}{45}$$

ملحق (B)

التباديل والتوافيق والاحتمالات

Permutations, Combinations and Probability

i – التباديل (Permutations)

التبديلات هي كل الترتيبات الممكنة والتي من الممكن الخروج بها لمجموعة من الأشياء، مع إهمال التكرار. وتتبع التباديل القاعدة الأولي وهي:

"*عدد التبديلات لعدد n من الأشياء المميزة* (Distinct objects) هو $n!$".

حيث $n!$ يقال عنها مضروب n، ورياضياً $n!=n\times(n-1)\times(n-2)\times\cdots\times2\times1$.

مثال: ما هو عدد تبديلات الحروف A,B,C ؟

الحل: لحساب التبديلات نتبع الخطوات التالية:

1- نتخيل وجود عدد 3 من الغرف الفارغة، وهو نفس العدد من الحروف.

2- نبدأ بملأ الغرفة الأولي بأحد الحروف، إما A أو B أو C، فنجد أنه يوجد 3 طرق لملآها.

3- نملأ الغرفة الثانية بأحد الحروف المتبقية، وهم اثنين، فنجد أنه يوجد طريقتين لملآها.

4- ونجد أن الغرفة الأخيرة تملأ بالحرف الأخير المتبقي.

لذلك نجد أن عدد التبديلات هي $3!=3\times2\times1=6$ كالتالي:

ABC BCA CAB

ACB BAC CBA



Fig. 5.1. Possible words made from the letters A, B and C.

بالتأكيد أن هذه الطريقة يمكن استخدامها لعدد أكبر من الحروف أو الأشياء. خذ مثال لذلك 10 أحرف فنجد أننا نبحث عن عشر غرف فارغة وعشر خطوات للحل ونحصل علي عدد التبديلات وهو

$$10! = 10\times 9\times 8\times 7\times 6\times 5\times 4\times 3\times 2\times 1 = 3{,}628{,}800$$

ولكن يختلف الأمر إذا أخذنا التبديلات ثنائيات أو ثلاثيات ..... أو عدد r في كل مرة.

مثال: ما هو عدد تبديلات الحروف A, B, C إذا أخذنا 2 فقط كل مرة؟

الحل: لحساب التبديلات نجد أنهم:

$$AB \quad AC \quad BC$$

وهذا ينتج من القاعدة الثانية وهي:

"عدد التبديلات لعدد n من الأشياء المميزة مأخوذ منهم r ، $r \le n$ ، من الأشياء كل مرة هو $_nP_r = \dfrac{n!}{(n-r)!}$ حيث الرمز $_nP_r$ يمثل هذه التبديلات".

القاعدة الثالثة وهي:

" عدد التبديلات لعدد n من الأشياء يتكرر فيها شئ n_1 مرة ويتكرر فيها شئ أخر n_2 مرة و شئ ثالث n_3 مرة حتى k من الأشياء بتكرار n_k هو:

$$\omega = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!\cdots n_k!} \quad \text{حيث} \quad \sum_{i=1}^{k} n_i = n ."$$

القاعدة السابقة تسري أيضاً على مسألة تسمي مسألة التقسيم (التوزيع) وتنص على التالي:

نظرية: مع وجود الشرط $N = \sum_i n_i$ فإن عدد الطرق لتوزيع عدد N من الجسيمات المميزة علي عدد j من المستويات بحيث يوضع n_1 من الجسيمات في المستوي الأول، و n_2 من الجسيمات في المستوي الثاني، وهكذا حتى نصل إلي وضع n_j من الجسيمات في المستوي الأخير j هو:

$$\omega\{n_i\} = \frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_j!} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{j} n_i!} \qquad (B.1)$$

الإثبات: نبدأ أولاً بالمستوي الأول، فنجد أن عدد الطرق لاختيار n_1 من N ووضعهم في هذا المستوي هو

$$\omega_1 = \binom{N}{n_1} = \frac{N!}{n_1!(N-n_1)!}$$

وبالمستوي الثاني، نجد أن عدد الطرق لاختيار n_2 من $(N-n_1)$ ووضعهم في هذا المستوي هو

$$\omega_2 = \binom{N-n_1}{n_2} = \frac{(N-n_1)!}{n_2!(N-n_1-n_2)!}$$

وبالمستوي الثالث، نجد أن عدد الطرق لاختيار n_3 من $(N-n_1-n_2)$ ووضعهم في هذا المستوي هو

$$\omega_3 = \binom{N-n_1-n_2}{n_3} = \frac{(N-n_1-n_2)!}{n_3!(N-n_1-n_2-n_3)!}$$

ونظل علي هذا النمط حتي نصل للمستوي الأخير. وحيث أن هذه الاختيارات عمليات منفصلة فإن العدد الكلي يصبح:

$$\omega\{n_i\} = \omega_1\times\omega_2\times\omega_3\times\cdots\times\omega_j = \frac{N!}{n_1!n_2!\cdots n_j!} = \frac{N!}{\prod_{i=1}^{j} n_i!}$$

حيث الرمز $\prod$ يدل علي مضروب الأعداد، بمعني أن $\prod_{i=1}^{r} n_i! = n_1!\times n_2!\cdots\cdots\times n_n!$.

وهذا هو المطلوب.

مثال: في تجربة عشوائية من رمي أربع عملات معدنية مميزة: ماهي عدد الطرق للحصول علي عُملتين صورتيهما "H" لأعلي وعُملتين كتابتيهما "T" لأعلي؟

الحل: نجد هنا أن عدد العملات هو $N=4$ والحدث $N_1=N_2=2$ لذلك فإن:

$$\omega=\frac{N!}{N_1!N_2!}=\frac{4!}{2!2!}=\frac{4\times3\times2\times1}{(2\times1)(2\times1)}=6$$

وترتيبهم كما بالجدول التالي:

N_1	N_2	العمله 1	العمله 2	العمله 3	العمله 4	ω
2	2	H	H	T	T	6
		T	T	H	H	
		H	T	H	T	
		T	H	T	H	
		H	T	T	H	
		T	H	H	T	

انظر الجدول بالباب الثالث.

مثال: أراد 10 طلاب إضافة مادة الفيزياء 102 وكان هناك 4 شعب مفتوحة بحيث يمكن إضافة:

2 طلبة للشعبة الأولي

3 طلبة للشعبة الثانية

4 طلبة للشعبة الثالثة

1 طالب للشعبة الرابعة

ماهي عدد الطرق لإضافة هؤلاء الطلاب العشرة إلي هذه الشعب؟

الحل: نجد هنا أن $N=10$ و $N_1=2,N_2=3,N_3=4,N_4=1$ وباستخدام القانون:

$$\omega=\frac{N!}{N_1!N_2!N_3!N_4!}=\frac{10!}{2!3!4!1!}=12600$$

ii – التوافيق (Combinations)

توافيق مجموعة منتهية من العناصر هو اختيار لبعض أو كل هذه العناصر دون اعتبار للترتيب الذي ترتب به هذه العناصر أو الإحلال. وفى حالة التقسيم إلى خليتين فقط واحدة بها r من العناصر والثانية بها $(n-r)$ من العناصر فإن عدد الطرق يسمي فى هذه الحالة بالتوافيق وتعطي الرمز $\binom{n}{r}$ أو ${}^nC_r$.

وتنص القاعدة على أن:

"عدد التوافيق لعدد n من الأشياء المتميزة بأخذ r ، $r\le n$، من الأشياء كل مرة هو:

$${}^nC_r=\binom{n}{r}=\frac{n!}{r!(n-r)!}$$

وكذلك $\binom{n}{r}$ تمثل عدد المجموعات الجزئية المكونة من r من العناصر من مجموعة بها n من العناصر.

مثال: لدينا 8 رجال و 6 سيدات:

1- ماهو عدد الطرق التي يتم فيها تكوين فريق من 5 أشخاص؟ دون إحلال وعدم مراعاة للترتيب.

2- ماهو عدد الطرق التي يتم فيها تكوين فريق يشمل 3 رجال وسيدتين؟ دون إحلال وعدم مراعاة للترتيب.

الحل:

1- نجد هنا أن $N=8+6=14$ و $r=5$ وباستخدام القانون:

$${}^{14}C_5=\binom{14}{5}=\frac{14!}{5!(14-5)!}=2002$$

2- تكوين أي فريق يتم من خلال عمليتين متتاليتين وهما:

الأولي اختيار 3 رجال من بين 8 رجال، وتتم بطرق عددها:

$$^8C_3 = \binom{8}{3} = \frac{8!}{3!(8-3)!} = 56$$

والثانية اختيار سيدتين من بين 6 سيدات، وتتم بطرق عددها:

$$^6C_2 = \binom{6}{2} = \frac{6!}{2!(6-2)!} = 15$$

ومن مبدأ العد نجد:

$$^8C_3 \times ^6C_2 = 56 \times 15 = 840$$

iii- الاحتمالات (Probability)

تعرف التجربة العشوائية بأنها التجربة التي يمكن توقع جميع نواتجها الممكنة قبل إجرائها، ولكن لا يمكن تحديد أي من هذه النواتج سيتحقق فعلاً بإجراء التجربة. مثال علي ذلك عند إلقاء عملة معدنية حقيقية بالهواء. وعند سقوط العملة علي الأرض بحرية، نعلم مسبقاً أننا سوف نحصل على الحدث صورة (H) أو الحدث كتابة (T). والاحتمال هو 50% لأي من الحدثين وهذا ناتج من أنه إذا افترضنا أن احتمال الحصول على الحدث صورة هو $P(H)$ واحتمال الحصول على الحدث كتابة هو $P(T)$ فإننا نعلم مسبقاً أن:

$$P(H) + P(T) = 1$$

ولذلك فإن

$$P(H) = P(T) = \frac{1}{2}$$

ولكننا لا نستطيع تحديد أي من هذين الحدثين سيظهر فعلاً عند إجراء عملية الرمي، إلا طبعاً إذا رميت بطريق غير أمينة.

بالطبع الاحتمال 50% لأي من الحدثين لا يتأتي بإجراء التجربة لعدد محدود من العملات، أو رمي القطعة الواحدة لعدد محدود من المرات. لذلك سنلجأ لإجراء التجربة لعملة واحدة عدد لانهائي من المرات أو رمي عدد هائل من العملات مرة واحدة.

iv- توزيع ذي الحدين

يسمى غالباً التوزيع الاحتمالي المنفصل بتوزيع ذي الحدين. إذا كانت (p) احتمال وقوع حدث ما (احتمال النجاح) و $(q = 1-p)$ احتمال عدم وقوع الحدث (احتمال الفشل). فإذا كان احتمال وقوع الحدث (X) من (N) من المحاولات، فإن (X) نجاح و $(N - X)$ فشل، وبالتالي فإن احتمال ذي الحدين يعطى من خلال :

$$P(X) = \frac{N!}{X!(N-X)!} p^X q^{N-X} \qquad \text{(B.2)}$$

مثال: احسب قيم احتمالات وقوع كل الأحداث المختلفة التي تقع عند الرمي العشوائي لأربع عملات معدنية متماثلة وغير مميزة.

الحل: نجد أن كل عملة عند الرمي العشوائي تظهر احدي الوجهين (حدثين):

رسو العملة بالصورة إلى الأعلى هو حدث أول ويقع باحتمالية (p)

رسو العملة بالكتابة إلى الأعلى هو حدث ثان ويقع باحتمالية $(q = 1-p)$

وحيث أننا افترضنا تماثل كل العملات وانتظام شكلها وعلى ذلك تتساوي كل من الاحتمالين.

بالتعويض في المعادلة (B.2) : حيث $(N = 4)$ نحصل:

$$P(0) = P(4) = \frac{4!}{0!(4-0)!}\left(\frac{1}{2}\right)^0\left(\frac{1}{2}\right)^{4-0} = \frac{1}{16}$$

$$P(1) = P(3) = \frac{4!}{1!(4-1)!}\left(\frac{1}{2}\right)^1\left(\frac{1}{2}\right)^{4-1} = 4 \times \frac{1}{16} = \frac{1}{4}$$

$$P(2) = \frac{4!}{2!(4-2)!}\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(\frac{1}{2}\right)^{4-2} = 6 \times \frac{1}{16} = \frac{3}{8}$$

ونجد أن:

$$\sum_{m=0}^{4} P(m) = \frac{1}{16} + \frac{1}{4} + \frac{3}{8} + \frac{1}{4} + \frac{1}{16} = 1$$

انظر الجدول بالباب الثالث.

ملحق (C)

معاملات لاجرانج الغير معينة

Undetremined Lagrange multipliers

نحن نعلم من خلال دراستنا الرياضية أنه لإيجاد النهاية العظمي لدالة مثل $f(x,y)$، وللتبسيط سوف نتعامل مع دالة في متغيرين (x,y) فقط، فيجب على الدالة $f(x,y)$ أن تحقق العلاقة التالية:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = 0 \qquad (1)$$

وإذا كان المتغيرات dx و dy مستقلان، فإننا نستطيع أن نستنتج أن:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \qquad (2)$$

ولكن إذا كان المتغيران dx و dy مرتبطان و مقيدان بالشرط:

$$\phi(x,y) = \text{ثابت} \qquad (3)$$

بحيث ينتج من تفاضلها أن:

$$d\phi = \frac{\partial \phi}{\partial x}dx + \frac{\partial \phi}{\partial y}dy = 0 \qquad (4)$$

فإنه من (1) و (4) ينتج أن:

$$\frac{\frac{\partial f}{\partial x}}{\frac{\partial \phi}{\partial x}} = \frac{\frac{\partial f}{\partial y}}{\frac{\partial \phi}{\partial y}} \qquad (5)$$

إذا جعلنا النسبة العامة (5) تتساوي مع قيمة ثابتة، نسميها $-\alpha$، فسوف نصل إلي المعادلتين:

$$\begin{aligned} \frac{\partial f}{\partial x} + \alpha\frac{\partial \phi}{\partial x} &= 0, \\ \frac{\partial f}{\partial y} + \alpha\frac{\partial \phi}{\partial y} &= 0 \end{aligned} \qquad (6)$$

المعادلتان (6) يمكن الحصول عليهما من خلال إيجاد النهاية العظمي للدالة $f + \alpha\phi$ وبدون الرجوع للشرط (1). بالطبع فإن استخدام هذه الطريقة أضافت مجهول جديد للمعادلة، يسمي معامل لاجرانج، وهذا علي حساب إهمال الشرط (1).

بالطبع فإن تطبيق هذه الطريقة علي دالة في عدد n من المتغيرات، هو تطبيق مباشر. اعتبر علي سبيل المثال الدالة:

$$f = f(x_1, x_2, \cdots, x_n) \qquad (7)$$

مع الشرط:

$$\phi = \phi(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \text{ثابت} \qquad (8)$$

وباستخدام شرطي النهاية العظمي، $df = 0$ و $d\phi = 0$ ، فإن الطريقة سوف تعطينا فئة المعادلات:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \alpha\frac{\partial \phi}{\partial x_i} = 0, \qquad i = 1,2,3,\cdots,n. \qquad (9)$$

هذه المعادلات، بالإضافة إلي المعادلة (8)، يكونون فئة من المعادلات عددها $n+1$، نستطيع من حيث المبدأ أن نحلهم لإيجاد قيم المتغيرات $(x_1, x_2, \cdots, x_n)$ والثابت α.

إذا وجد أكثر من قيد شرطي، علي سبيل المثال قانوني حفظ الطاقة وعدد الجسيمات في نظام معزول، مثلاً:

$$\phi = \phi(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \text{ثابت} \qquad (10)$$

$$\psi = \psi(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \text{ثابت} \qquad (11)$$

فيجب أن نستخدم ثابتين، مثل α و β. وفي هذه الحالة سوف نحصل على فئة من المعادلات عددها $n+2$، معادلتين يعبران عن القيدين الشرطيين و عدد n من المعادلات بالشكل:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} + \alpha\frac{\partial \phi}{\partial x_i} + \beta\frac{\partial \psi}{\partial x_i} = 0, \qquad i = 1,2,3,\cdots,n. \qquad (12)$$

بالتالي فإن المسألة تم تعريفها وحلها تماماً. الثوابت α و β تسمي معاملات لاجرانج الغير معينين (Undetremined Lagrange multipliers)، ولكننا يمكن إيجاد قيمهم (أنظر الباب الرابع).

ملحق (D)
الدوال الزائدية
Hyperbolic Functions

نتعامل بدراستنا بدوال مثلثيه بالصورة:

$$\cos\theta=\frac{e^{i\theta}+e^{-i\theta}}{2},\quad \sin\theta=\frac{e^{i\theta}-e^{-i\theta}}{2i},\quad \tan\theta=\frac{\sin\theta}{\cos\theta} \tag{1}$$

ومن المفيد أحياناً أن نستخدم صور أخري للدوال مثل:

$$\sec\theta=\frac{1}{\cos\theta},\quad \operatorname{cosec}\theta=\frac{1}{\sin\theta},\quad \cot\theta=\frac{1}{\tan\theta} \tag{2}$$

وفي دراستنا للفيزياء الإحصائية نتعامل مع دوال أخري مثل الدوال المثلثة الزائدية والتي تعرف كالتالي:

$$\cosh\theta=\frac{e^{\theta}+e^{-\theta}}{2},\quad \sinh\theta=\frac{e^{\theta}-e^{-\theta}}{2},\quad \tanh\theta=\frac{\sinh\theta}{\cosh\theta} \tag{3}$$

وأيضاً

$$\operatorname{sech}\theta=\frac{1}{\cosh\theta},\quad \operatorname{cosech}\theta=\frac{1}{\sinh\theta},\quad \coth\theta=\frac{1}{\tanh\theta} \tag{4}$$

ومن التعريفات السابقة من السهل أن نستنتج التفاضلات:

$$\frac{d\cosh\theta}{d\theta}=\sinh\theta,\quad \frac{d\sinh\theta}{d\theta}=\cosh\theta,\quad \frac{d\tanh\theta}{d\theta}=\operatorname{sech}^2\theta \tag{5}$$

وغالباً ما تظهر لنا القيم الفيزيائية، مثل دالة التجميع والطاقة ألخ، في صور دوال معقدة من الصعب التعامل معها ودراستها. بالتالي فإن ما نصبو إلية هو البحث عن صيغة تقريبية ومبسطة للدالة المعقدة بحيث نستطيع دراسة خواص النظام. لذا فنحن نلجأ إلي دراسة القيم الفيزيائية عند حدود (قيم) المتغير θ الصغيرة والكبيرة لهذه الدوال. بالرغم من أننا نعلم أنه عندما $\theta\to 0$ فإن $\sinh\theta\to 0$، لكن هذا مالا نبحث عنه. ببساطة نحن نبحث عن سلوك الدالة عندما تقترب من الحدود.

ولقيم صغيرة من θ، نجد أنه باستخدام المفكوك $e^{\theta}=1+\theta+\frac{1}{2}\theta^2+\cdots$ نحصل على:

$$\sinh\theta\xrightarrow{\theta\to 0}\theta,\quad \tanh\theta\xrightarrow{\theta\to 0}\theta,\quad \cosh\theta\xrightarrow{x\to 0}1+\frac{1}{2}\theta^2 \tag{6}$$

الحدود النهائية للدالة $\cosh\theta$ غالباً ما تسبب لنا بعض المشاكل، إن احتفظنا بحدود θ^2 اعتماداً علي المشكلة الفيزيائية، فإننا نستطيع أن ننظر للحل عدما نقترب من الصفر أو مالانهاية. ومن المهم أن نتذكر التقريب:

$$\cosh\theta\xrightarrow{x\to 0}1 \qquad \text{but} \qquad \cosh\theta-1\xrightarrow{x\to 0}\frac{1}{2}\theta^2 \tag{7}$$

هذا أيضاً ينطبق علي المفكوك:

$$e^{\theta}\xrightarrow{x\to 0}1 \qquad \text{but} \qquad e^{\theta}-1\xrightarrow{x\to 0}\frac{1}{2}\theta^2 \tag{8}$$

كمثال نجد أنه في بعض المسائل المعينة نجد أن طاقة النظام هي:

$$\langle E\rangle=\frac{\hbar\omega}{e^{\hbar\omega\beta}-1} \tag{9}$$

فإذا استخدمنا بسذاجة التقريب للدالة $e^{\hbar\omega\beta}$ عند درجات الحرارة العليا، أي بمعني أن $\beta\to 0$، نجد أن المقام يؤول للصفر وبالتالي فإن الطاقة تؤول إلي مالانهاية. ولكن إذا طورنا تفكيرنا فسوف نجد أن المقام يؤول إلي $\hbar\omega\beta$ وبالتالي نجد أن $\langle E\rangle=\frac{1}{\beta}=k_BT$. هذا التقريب تظهر أهميته حيث أنة يمكن التحقق منه عملياً.

عند الحدود العلياً للمتغير θ، نجد أن $e^{-\theta}\to 0$ ولذا فإن:

$$\sinh\theta\xrightarrow{\theta\to\infty}\frac{1}{2}e^{\theta},\qquad \cosh\theta\xrightarrow{\theta\to\infty}\frac{1}{2}e^{\theta},$$

$$\tanh\theta\xrightarrow{\theta\to 0}0,\qquad \tanh\theta\xrightarrow{\theta\to\infty}1 \tag{10}$$

مثال: أوجد مفكوك الدالة $\coth x$ إلي الحد x.

الحل: باستخدام المفكوك $e^x = 1+x+\frac{1}{2}x^2+\cdots$ نجد أن:

$$\coth x = \frac{e^x+e^{-x}}{e^x-e^{-x}} = \frac{e^{2x}+1}{e^{2x}-1} \approx \frac{1+(2x)+\frac{1}{2!}(2x)^2+\cdots+1}{1+(2x)+\frac{1}{2!}(2x)^2+\frac{1}{3!}(2x)^3+\cdots-1}$$

$$= \frac{2+2x+2x^2+\cdots}{2x+2x^2+4x^3/3+\cdots} = \frac{1}{x}\left(1+x+x^2+\cdots\right)\left(1+x+\frac{2x^2}{3}+\cdots\right)^{-1}$$

$$= \frac{1}{x}\left(1+x+x^2+\cdots\right)\left(1-x+\frac{x^2}{3}+\cdots\right)$$

$$= \frac{1}{x}\left(1+x-x+x^2-x^2+\frac{x^2}{3}+\cdots\right)$$

$$= \frac{1}{x}\left(1+\frac{x^2}{3}+\cdots\right) = \frac{1}{x}+\frac{x}{3}$$

المراجع
References

English:

1- R. K. Pathria's, "Statistical Mechanics"
2- K. Huang, "Statistical Mechanics", 2nd Ed., Wiley, 1987.
3- F. Mandl, "Statistical physics", 2nd ed. , (John Wiley, 1989).
4- J. Seddon and J. Gale, "Thermodynamics and statistical mechanics", (Royal society of chemistry, 2001).
5- F. Reif, "Fundamental of Statistical Mechanics and Thermal Physics", (McGraw-Hill, New York, 1965).
6- M. Glazer and J. Wark, "Statistical Mechanics a survival guides", (Oxford, 2001).
7- R. Kubo, " Statistical Mechanics ", (North-Holand, 1965).
8- A. Carter, "Classical and Statistical Thermodynamics", (Prentice Hall, 2001).
9- D. Schroeder, "Thermal physics", (Addison Wesley Longman, 2000).

1- "أساسيات فيزياء الجوامد" تأليف رأفت كامل واصف الناشر: دار النشر للجامعات، مصر 1994.
2- "الكيمياء الفيزيائية" ترجمة احمد محمد عزام، تأليف جوردن باور الناشر: الدار الدولية للنشر والتوزيع، 1998.
3- "النظرية الحركية للغازات والحرارة الديناميكية" تأليف إبراهيم إبراهيم شريف الناشر: دار الراتب الجامعية، بيروت.
4- "المنهج الدراسي الأول لميكانيكا الكم" تأليف إبراهيم ناصر وعفاف السيد عبد الهادي – الناشر: مكتبة النهضة المصرية 2003.
5- "قاموس العلوم الرياضية" تأليف معروف سمحان، عند الرحمن أبو عمه، فوزي الذكير– الناشر: جامعة الملك سعود، النشر العلمي والمطابع، 2001.

6- "الفيزياء التطبيقية الحديثة" تأليف علاء الدين النعيمي، قاسم محمود علي و إبراهيم محمد علي الجوادي-الناشر:دار الجيل-بيروت (1999).
7- "المعجم الشامل لمصطلحات مجمع اللغة العربية في العلوم التقنية والهندسية" تأليف نبيل عبد السلام هارون-الناشر:دار الجيل-بيروت (1991).
8- "الاحتمالات النظرية والتطبيق" تأليف مجدي الطويل الناشر: دار النشر للجامعات، مصر 2000.

قاموس المصطلحات العلمية

Scientific Dictionary

إنجليزى- عربى

A

Absolute	مطلق
Absorption	امتصاص
Activity	فعالية
Amorphous	غير بلوري
Annihilation	إفناء
Antiparallel	متضادي التوازي
Approximation	تقريب
Approximation methods	طرق تقريبية
Associate	مرتبط

B

Binding energy	طاقة الترابط
Boundary conditions	شروط حدودية
Bounded	محدودة
Bound state	حالة مرتبطة
Brackets	أقواس
Bulk modulus	معامل المرونة الحجمى

C

Cartizian coordinates	إحداثيات كرتيزية
Classical	تقليدي
Center of mass	مركز الثقل
Closed	مغلق
Coefficient, modulus	معامل
Condensation	تكثيف
Continuous	متصل، مستمر
Continuous functions	دوال متصلة

Continuity	استمرارية
Continuous states	مستويات متصلة
Converge	تقاربية
Creation	خلق
Critical temperature	درجة حرجة
Crystal	بلورة
Cycle	دورة

D

Degenerate	متعددة الانتماء – تناظر
Degenerate states	مستويات متعدد الانتماء (متناظرة)
Density	كثافة
Density of states	كثافه المستويات
Discrete states	مستويات منفصلة (متقطعة)
Disorder	غير مرتب، عشوائي
Displacement	إزاحة
Duality	ازدواجية
Dipole	ثنائي القطب
Diverge	تباعدي
Discrete functions	دوال منفصلة
Disorder	فوضى، عشوائي، غير منظم
Distribution	توزيع

E

Effect	أثر (ظاهرة)
Effective charge	شحنة مؤثرة
Eigen	مميز
Eigenfunction	دالة مميزة
Eigen-value	قيمة مميزة
Electric dipole moment	عزم ثنائي القطب الكهربي
Electric field	مجال كهربي
Emission	انبعاث
Emissivity	انبعاثية

Empirical	تجريبي، استقرائي
Enclosure	تجويف
Extensive properties	خواص شمولية

F

Fine structure	تركيب دقيق
Finite, bounded	محدودة
Frequency	تردد
Fusion, Melting	انصهار

G

Gauge	مقياس
Ground state	مستوى أرضي
Cyclic process	عملية دائرية (مغلقة)

H

Harmonic	توافقي، متناغم
Harmonic oscillator	متذبذب توافقي
Heat	حرارة
Heat capacity	سعة حرارية
Heterogeneous	غير متجانس
Homogeneous	متجانس

I

Incompressible	غير قابل للانضغاط
Inhomogeneous magnetic field	مجال مغناطيسي غير متجانس
Intensive properties	خواص مركزة
Isobaric	ضغط ثابت
Isolated	معزول
Isochoric	حجم ثابت
Isothermal	درجة حرارة ثابتة

K

Kinetic energy	طاقة حركة

L

Latent heat	حرارة كامنة
Lattice points	نقاط الشبكية

Linear combination	تجميع خطي
Linear (discontinuous) spectrum	طيف خطي
Linear momentum	كمية حركة خطية p
Lower limits	النهايات الصغرى
Lowering Operators	مؤثر تنازلي L_-
Linear operator	مؤثر خطي
L-S coupling	اقتران مداري مغزلي
M	
Macroscopic system	نظام عيني
Magnetic field	مجال مغناطيسي
Magnetic quantum number	عدد كمي مغناطيسي m
Magnetic saturation	التشبع المغناطيسي
Magnetization	التمغنط
Mean life time	متوسط العمر الزمني
Microscopic system	نظام مجهري
Multiplicity	تعددية
Multiple values	متعددة القيم
N	
Non-Degenerate states	مستويات وحيدة الانتماء (منفردة)
Normalized	مُعاير
Normalized constant	ثابت المُعايرة
Normalized function	دالة مُعايرة
Nonrigid	غير ثابت ، متحرك
O	
Operator	مؤثر
Orbital angular momentum	كمية حركة زاوية دورانية L
Orbital quantum number	عدد كمي مداري l
Order	منظم، مرتب
Orthogonal	متعامد
Operator theory	نظرية المؤثرات
Optimum	مثالي

Optimum value	قيمة مثالية
P	
Parallel	متوازيين
Partial derivative	تفاضل جزئي
Permeable	يسمح بالنفاذ
Phase	طور
Phase transformation	تغير في الطور
Photoelectric emission	الانبعاث الكهربائي الضوئي
Polynomial	متعددة الحدود
Potential energy	طاقة جهد
Principle quantum number	عدد كمي رئيسي n
Probability	احتمال
Properties	خواص
Q	
Qualitative	كيفي، نوعي
Quantitative	كمي
Quantized energy	طاقة مكممة
Quantum	كمى (جمع كمة)
Quantum mechanics	ميكانيكا الكم
Quantum number	عدد كمي
Quantum State	حالة كمية أو (مستوى كمي)
Quasi-static process	عملية شبه ساكنة
R	
Real	حقيقي
Resonance frequency	تردد رنيني
Restoring force	قوى الإرجاع
Reversible process	عملية عكسية
Rigid	صلب، ثابت
Rigid Rotator	جسم جاسئ دوراني
S	
Second order correction	تصحيح من الدرجة الثانية

Selection rules	قواعد الاختيار
Series	متسلسلة
Singular point	نقطة متفردة
Specific Heat	حرارة نوعية
Spherical harmonic function	دالة توافقية كروية $Y_{l,m}(\theta,\varphi)$
Spherical polar coordinates	إحداثيات قطبية كروية
Spin	دوران مغزلي (دُرور)
Spinor	مغزل
Spin angular momentum	كمية حركة زاوية مغزلية S
Spin space	فراغ مغزلي
Split	انقسام
Spontaneous emission	انبعاث تلقائي
State	مستوى – حالة
State function	دالة الحالة
Step potential	جهد درجي (سُلمي)
Stimulated absorption	امتصاص محثوث (قسري)
Stimulated emission	انبعاث محثوث (قسري)
Superposition principle	مبدأ التراكم
Surrounding medium	بيئة محيطة
Susceptibility	القابلية
Symmetry	تماثل

T

Theory of relativity	نظرية النسبية
Thermal	حراري
Thermoionic Emission	الانبعاث الالكتروني الحراري
Total angular momentum	كمية حركة زاوية كلية J

U

Ultra-violet catastrophe	الكارثة الفوق بنفسجية
Uncertainity	عدم الدقة (عدم التحديد، عدم التيقن)

W

Wave function	دالة موجية
Work	شغل
Work function	دالة شغل

V

Variable	متغير
Vector	متجه
Vibration	نبذبه

Z

Zero point energy	طاقة نقطة الصفر

مبادئ أساسية في الفيزياء الإحصائية

تأليف

أ.د. إبراهيم محمود أحمد ناصر

E-mail: imnasser@kfupm.edu.sa
URL: http://faculty.kfupm.edu.sa/PHYS/imnasser/

تصويبات

الصفحة	السطر	الخطأ	التعليق
95	9,10	$\varepsilon_1 = \varepsilon$ $\varepsilon_o = 0$	تتغير إلى $\varepsilon_2 = \varepsilon$ $\varepsilon_1 = 0$
96	12	$Z_2^{\backslash} = \sum_{i=1}^{4} e^{-\beta\varepsilon_i}$ $e^{-\beta\varepsilon_3} + e^{-\beta\varepsilon_4}$	تتغير إلى $Z_2^{\backslash} = \sum_{i=1}^{3} e^{-\beta\varepsilon_i}$ تتغير إلى $e^{-\beta\varepsilon_3}$
213	11	غاز ذو مستويات منفصلة تماماً	في تصنيف فيرمي للمستويات فإن الانتماء (Degenerate) ليس له علاقة بانتماء المستويات لنفس الطاقة